

定理8.6. 若随机向量 $X = (X_1, X_2, \dots, X_k) \sim Dir(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k)$, 设 $\tilde{\alpha} = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k$ 和 $\tilde{\alpha}_i = \alpha_i / \tilde{\alpha}$, 则

$$E[X_i] = \tilde{\alpha}_i \quad \text{和} \quad Cov(X_i, X_j) = \begin{cases} \frac{\tilde{\alpha}_i(1-\tilde{\alpha}_i)}{\tilde{\alpha}+1} & i = j, \\ -\frac{\tilde{\alpha}_i\tilde{\alpha}_j}{\tilde{\alpha}+1} & i \neq j. \end{cases}$$

Proof. 根据期望的定义有

$$\begin{aligned} E[X_i] &= \frac{\int \int_{\sum_i x_i=1, x_i \geq 0} x_1^{\alpha_1-1} x_2^{\alpha_2-1} \dots x_k^{\alpha_k-1} \cdot x_i dx_1 \dots dx_k}{Beta(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k)} \\ &= \frac{Beta(\alpha_1, \dots, \alpha_i+1, \dots, \alpha_k)}{Beta(\alpha_1, \dots, \alpha_i, \dots, \alpha_k)} = \frac{\alpha_i}{\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k} = \tilde{\alpha}_i. \end{aligned}$$

若 $i = j$, 则有

$$Cov(X_i, X_i) = E[X_i^2] - (E[X_i])^2 = \frac{Beta(\alpha_1, \dots, \alpha_i+2, \dots, \alpha_k)}{Beta(\alpha_1, \dots, \alpha_i, \dots, \alpha_k)} - (\tilde{\alpha}_i)^2 = \frac{\tilde{\alpha}_i(1-\tilde{\alpha}_i)}{\tilde{\alpha}+1}.$$

若 $i \neq j$, 则有

$$\begin{aligned} Cov(X_i, X_j) &= E[X_i X_j] - E[X_i]E[X_j] = \frac{Beta(\alpha_1, \dots, \alpha_i+1, \dots, \alpha_j+1, \dots, \alpha_k)}{Beta(\alpha_1, \dots, \alpha_i, \dots, \alpha_j, \dots, \alpha_k)} - \tilde{\alpha}_i \tilde{\alpha}_j \\ &= \frac{\alpha_i \alpha_j}{\tilde{\alpha}(\tilde{\alpha}+1)} - \tilde{\alpha}_i \tilde{\alpha}_j = -\frac{\tilde{\alpha}_i \tilde{\alpha}_j}{\tilde{\alpha}+1}. \end{aligned}$$

□

8.4 正态总体抽象分布定理

8.4.1 χ^2 分布

定义8.9. 若 X_1, X_2, \dots, X_n 是来自总体 $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ 的一个样本, 称 $Y = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$ 为服从自由度为 n 的 χ^2 分布, 记 $Y \sim \chi^2(n)$.

根据 $X_1^2 \sim \Gamma(1/2, 1/2)$ 和 Γ 函数的可加性可得 $Y \sim \Gamma(n/2, 1/2)$. 于是有随机变量 Y 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{(\frac{1}{2})^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(n/2)} y^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{y}{2}} & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases}$$

下面研究 χ^2 分布的性质:

定理8.7. 若随机变量 $X \sim \chi^2(n)$, 则 $E(X) = n$ 和 $Var(X) = 2n$; 若随机变量 $X \sim \chi^2(m)$ 和 $Y \sim \chi^2(n)$ 相互独立, 则 $X + Y \sim \chi^2(m+n)$;

Proof. 若随机变量 $X \sim \chi^2(n)$, 则有 $X = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$, 其中 X_1, X_2, \dots, X_n 是总体为 $X' \sim \mathcal{N}(0, 1)$ 的一个样本. 我们有

$$\begin{aligned} E[X] &= E[X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2] = nE[X_1^2] = n, \\ Var(X) &= nVar(X_1^2) = n[E(X_1^4) - (E(X_1^2))^2] = n(E(X_1^4) - 1). \end{aligned}$$

计算

$$E(X_1^4) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^4}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = - \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^3}{\sqrt{2\pi}} de^{-\frac{x^2}{2}} = 3 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 3$$

可得 $\text{Var}(X) = 2n$. □

若随机变量 $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, 则

$$E(X^k) = \begin{cases} (k-1)!! & k \text{ 为偶数} \\ 0 & k \text{ 为奇数} \end{cases}$$

其中 $(2k)!! = 2k \cdot (2k-2) \cdots 2$ 和 $(2k+1)!! = (2k+1) \cdot (2k-1) \cdots 1$.

例8.4. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自于总体 $\mathcal{N}(0, 4)$ 的样本, 以及 $Y = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2$. 求 a, b 取何值时, Y 服从 χ^2 分布, 并求其自由度.

解. 根据正态分布的性质有 $X_1 - 2X_2 \sim \mathcal{N}(0, 20)$ 和 $3X_3 - 4X_4 \sim \mathcal{N}(0, 100)$, 因此

$$\frac{X_1 - 2X_2}{2\sqrt{5}} \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad \frac{3X_3 - 4X_4}{10} \sim \mathcal{N}(0, 1),$$

所以当 $a = \frac{1}{2\sqrt{5}}, b = \frac{1}{10}$ 时有 $Y \sim \chi^2(2)$ 成立. □

分布可加性:

- 如果 $X \sim \mathcal{N}(\mu_1, a_1^2)$ 和 $Y \sim \mathcal{N}(\mu_2, a_2^2)$, 且 X 与 Y 独立, 那么 $X \pm Y \sim \mathcal{N}(\mu_1 \pm \mu_2, a_1^2 + a_2^2)$;
- 如果 $X \sim B(n_1, p)$ 和 $Y \sim B(n_2, p)$, 且 X 与 Y 独立, 那么 $X + Y \sim B(n_1 + n_2, p)$;
- 如果 $X \sim P(\lambda_1)$ 和 $Y \sim P(\lambda_2)$, 且 X 与 Y 独立, 那么 $X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$;
- 如果 $X \sim \Gamma(\alpha_1, \lambda)$ 和 $Y \sim \Gamma(\alpha_2, \lambda)$, 且 X 与 Y 独立, 那么 $X + Y \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$.
- 如果 $X \sim \chi(m)$ 和 $Y \sim \chi(n)$, 且 X 与 Y 独立, 那么 $X + Y \sim \chi(m + n)$.

8.4.2 t 分布 (student distribution)

定义8.10. 随机变量 $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ 和 $Y \sim \chi^2(n)$ 相互独立, 则随机变量

$$T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

服从自由度为 n 的 t -分布, 记 $T \sim t(n)$.

随机变量 $T \sim t(n)$ 的概率密度为

$$f(x) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})\sqrt{n\pi}} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}} \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

由此可知 t -分布的密度函数 $f(x)$ 是偶函数. 当 $n > 1$ 为偶数时有

$$\frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})\sqrt{n\pi}} = \frac{(n-1)(n-3)\cdots 5\cdot 3}{2\sqrt{n}(n-2)(n-4)\cdots 4\cdot 2};$$

当 $n > 1$ 为奇数时有

$$\frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})\sqrt{n\pi}} = \frac{(n-1)(n-3)\cdots 4\cdot 2}{\pi\sqrt{n}(n-2)(n-4)\cdots 5\cdot 3}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 随机变量 $T \sim t(n)$ 的概率密度

$$f(x) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

因此当 n 足够大时, $f(x)$ 可被近似为 $\mathcal{N}(0, 1)$ 的密度函数.

8.4.3 F 分布

定义8.11. 设随机变量 $X \sim \chi^2(m)$ 和 $Y \sim \chi^2(n)$ 相互独立, 称随机变量

$$F = \frac{X/m}{Y/n}$$

服从自由度为 (m, n) 的 F -分布, 记 $F \sim F(m, n)$.

随机变量 $F \sim F(m, n)$ 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\Gamma(\frac{m+n}{2})\Gamma(\frac{m}{2})^{\frac{m}{2}} x^{\frac{m}{2}-1}}{\Gamma(\frac{m}{2})\Gamma(\frac{n}{2})(1+\frac{mx}{n})^{\frac{m+n}{2}}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

若随机变量 $F \sim F(m, n)$, 则 $\frac{1}{F} \sim F(n, m)$.

课题练习:

- 独立同分布随机变量 X_1, X_2, \dots, X_n 满足 $X_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2)$, 求 $\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_i)^2 / \sigma_i^2$ 的分布.
- 设 X_1, X_2, \dots, X_9 和 Y_1, Y_2, \dots, Y_9 是分别来自总体 $\mathcal{N}(0, 9)$ 的两个独立样本, 求 $(X_1 + X_2 + \dots + X_9) / \sqrt{Y_1^2 + Y_2^2 + \dots + Y_9^2}$ 的分布.
- 设 X_1, X_2, \dots, X_{2n} 来自总体 $\mathcal{N}(0, \sigma_2)$ 的样本, 求 $(X_1^2 + X_3^2 + \dots + X_{2n-1}^2) / (X_2^2 + X_4^2 + \dots + X_{2n}^2)$ 的分布.

8.4.4 正态分布的抽样分布定理

定理8.8. 设 X_1, X_2, \dots, X_n 是来自总体 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 则有

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \frac{\sigma^2}{n}), \quad \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

定理8.9. 设 X_1, X_2, \dots, X_n 是来自总体 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 其样本均值和修正样本方差分别为

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^n X_i/n \quad \text{和} \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

则有 \bar{X} 和 S^2 相互独立, 且

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

此定理证明参考书的附件.

定理8.10. 设 X_1, X_2, \dots, X_n 是来自总体 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 其样本均值和修正样本方差分别为

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^n X_i/n \quad \text{和} \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

则有

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1).$$

Proof. 根据前面两个定理可知 $(\bar{X} - \mu)/\sigma\sqrt{n} \sim \mathcal{N}(0, 1)$ 和 $(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$, 于是有

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \bigg/ \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2(n-1)}} \sim t(n-1).$$

□

定理8.11. 设 X_1, X_2, \dots, X_m 和 Y_1, Y_2, \dots, Y_n 分别来自总体 $\mathcal{N}(\mu_X, \sigma^2)$ 和 $\mathcal{N}(\mu_Y, \sigma^2)$ 的两个独立样本, 令其样本均值分别 \bar{X} 和 \bar{Y} , 修正样本方差分别为 S_X^2 和 S_Y^2 , 则

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{\frac{(m-1)S_X^2 + (n-1)S_Y^2}{m+n-2}} \sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2).$$

Proof. 根据正太分布的性质有 $\bar{X} \sim \mathcal{N}(\mu_X, \sigma^2/m)$ 和 $\bar{Y} \sim \mathcal{N}(\mu_Y, \sigma^2/n)$, 以及

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim \mathcal{N}\left(\mu_X - \mu_Y, \left(\frac{1}{m} + \frac{1}{n}\right)\sigma^2\right),$$

进一步有

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_X - \mu_Y)}{\sigma\sqrt{\frac{1}{m} + \frac{1}{n}}} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$

根据定理 8.9 有 $\frac{(m-1)S_X^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(m-1)$ 和 $\frac{(n-1)S_Y^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 由此得到

$$\frac{(m-1)S_X^2 + (n-1)S_Y^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(m+n-2).$$

从而完成证明.

□

定理8.12. 设 X_1, X_2, \dots, X_m 和 Y_1, Y_2, \dots, Y_n 分别来自总体 $\mathcal{N}(\mu_X, \sigma_X^2)$ 和 $\mathcal{N}(\mu_Y, \sigma_Y^2)$ 的两个独立样本, 令其修正样本方差分别为 S_X^2 和 S_Y^2 , 则有

$$\frac{S_X^2/\sigma_X^2}{S_Y^2/\sigma_Y^2} \sim F(m-1, n-1).$$

Proof. 根据定理 8.9 有 $\frac{(m-1)S_X^2}{\sigma_X^2} \sim \chi^2(m-1)$ 和 $\frac{(n-1)S_Y^2}{\sigma_Y^2} \sim \chi^2(n-1)$, 由此得到

$$\frac{\frac{(m-1)S_X^2}{\sigma_X^2}/(m-1)}{\frac{(n-1)S_Y^2}{\sigma_Y^2}/(n-1)} \sim F(m-1, n-1).$$

□

课堂习题:

- 若随机变量 $X \sim t(n)$, 求 $Y = X^2$ 的分布.
- 设 X_1, X_2, \dots, X_5 是来自总体 $\mathcal{N}(0, 1)$ 的样本, 令 $Y = c_1(X_1 + X_3)^2 + c_2(X_2 + X_4 + X_5)^2$. 求常数 c_1, c_2 使 Y 服从 χ^2 分布.
- 设 X_1, X_2 是来自总体 $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 的样本, 求 $\frac{(X_1+X_2)^2}{(X_1-X_2)^2}$ 的分布.

8.4.5 分位数(点)

定义8.12. 对给定 $\alpha \in (0, 1)$ 和随机变量 X , 称满足 $\Pr(X > \lambda_\alpha) = \alpha$ 的实数 λ_α 为上侧 α 分位数(点).

对正态分布 $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$, 给定 $\alpha \in (0, 1)$, 满足 $\Pr(X > \mu_\alpha) = \int_{\mu_\alpha}^{\infty} f(x)dx = \alpha$ 的点 μ_α 称为正态分布上侧 α 分位点, 由对称性可知 $\mu_{1-\alpha} = -\mu_\alpha$.

对 $\chi^2(n)$ 分布 $X \sim \chi^2(n)$, 给定 $\alpha \in (0, 1)$, 满足 $\Pr(X \geq \chi_\alpha^2(n)) = \alpha$ 的点 $\chi_\alpha^2(n)$ 称为 $\chi^2(n)$ 分布上侧 α 分位点. 当 $n \rightarrow \infty$ 时有 $\chi_\alpha^2(n) \approx \frac{1}{2}(\mu_\alpha + \sqrt{2n-1})^2$, 其中 μ_α 表示正态分布上侧 α 分位点.

对 t -分布 $X \sim t(n)$, 给定 $\alpha \in (0, 1)$, 满足 $\Pr(X > t_\alpha(n)) = \alpha$ 的点 $t_\alpha(n)$ 称为 $t(n)$ -分布上侧 α 分位点. 由对称性可知 $t_{(1-\alpha)}(n) = -t_\alpha(n)$.

对 F -分布 $X \sim F(m, n)$, 给定 $\alpha \in (0, 1)$, 满足 $\Pr[X > F_\alpha(m, n)] = \alpha$ 的点 $F_\alpha(m, n)$ 称为 $F(m, n)$ 分布上侧 α 分位点.

对于 F -分布, 有如下性质:

引理8.4. 对 F 分布的分位点有

$$F_{(1-\alpha)}(m, n) = \frac{1}{F_\alpha(n, m)}.$$

Proof. 设 $X \sim F(m, n)$, 根据定义有

$$1 - \alpha = \Pr(X > F_{1-\alpha}(m, n)) = \Pr\left(\frac{1}{X} < \frac{1}{F_{1-\alpha}(m, n)}\right) = 1 - \Pr\left(\frac{1}{X} \geq \frac{1}{F_{1-\alpha}(m, n)}\right).$$

再根据 $1/X \sim F(n, m)$, 结合上式有

$$\alpha = \Pr\left(\frac{1}{X} \geq \frac{1}{F_{1-\alpha}(m, n)}\right) = \Pr\left(\frac{1}{X} > \frac{1}{F_{1-\alpha}(m, n)}\right)$$

于是有 $F_\alpha(n, m) = 1/F_{1-\alpha}(m, n)$. □

课堂习题:

- 设 X_1, X_2, \dots, X_{10} 是总体 $\mathcal{N}(\mu, 1/4)$ 的样本, i) 若 $\mu = 0$, 求 $\Pr(\sum_{i=1}^{10} X_i^2 \geq 4)$; ii) 若 μ 未知, 求 $\Pr(\sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2 \geq 2.85)$.
- 设 X_1, X_2, \dots, X_{25} 是总体 $\mathcal{N}(12, \sigma^2)$ 的样本, i) 若 $\sigma = 2$, 求 $\Pr(\sum_{i=1}^{25} X_i/25 \geq 12.5)$; ii) 若 σ 未知但知道修正样本方差为 $S^2 = 5.57$, 求 $\Pr(\sum_{i=1}^{25} X_i/25 \geq 12.5)$.

9 参数估计

设总体 X 的分布函数为 $F(X, \theta)$, 其中 θ 为未知参数(也可向量为向量). 现从总体中抽取一样本 X_1, X_2, \dots, X_n , 如何依据样本估计参数 θ , 或 θ 的函数 $g(\theta)$, 此类问题称为参数估计问题. 内容包括: 点估计, 估计量标准, 区间估计.

9.1 点估计

9.1.1 矩估计法

总体 X 的 k 阶矩: $a_k = E[X^k]$

样本 k 阶矩: $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$

用相应的样本矩去估计总体矩, 求解参数 θ 的方法称为 **矩估计法**. 矩估计法的理论基础是大数定理: X_1, X_2, \dots, X_n 为 i.i.d. 的随机变量, 若 $E(X) = \mu$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时有

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu.$$

推论: 若 $E[X^k] = a_k$ 存在, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时有

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \xrightarrow{P} a_k = E[X^k].$$

还可利用中心矩进行估计:

总体 X 的 k 阶中心矩: $b_k = E[(X - E(X))^k]$

样本 k 阶中心矩: $B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$

矩估计方法: 总体 X 的分布函数 F 包含 m 个未知参数 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m$,

- 1) 求总体 X 的 k 阶矩: $a_k = a_k(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m) = E[X^k]$, $k \in [m]$ (a_k 一般为 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m$ 的函数).
- 2) 计算样本的 k 阶矩: $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$.
- 3) 令样本矩等于总体矩 $A^k = a^k = a^k(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m)$ ($k = 1, 2, \dots, m$), 得到 m 个关于 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m$ 的方程组.
- 4) 求解方程组得到估计量 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_m$.

例9.1. 设总体 X 的概率密度函数

$$f(x) = \begin{cases} (\alpha + 1)x^\alpha & x \in (0, 1) \\ 0 & \text{其它,} \end{cases}$$

设 X_1, X_2, \dots, X_n 是来自总体 X 的样本, 求参数 α 的矩估计.

解. 首先计算总体 X 的期望

$$E[X] = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^1 x(\alpha + 1)x^{\alpha+1}dx = \frac{\alpha + 1}{\alpha + 2}.$$

样本 X 的均值 $\bar{X} = \sum_{i=1}^n X_i/n$. 样本矩等于总体矩有

$$E(X) = \frac{\alpha + 1}{\alpha + 2} = \bar{X},$$

求解可得 $\alpha = (2\bar{X} - 1)/(1 - \bar{X})$. □

例9.2. 设 X_1, X_2, \dots, X_n 是来自总体 X 的样本, 且总体 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \theta e^{-(x-\mu)\theta} & x \geq \mu \\ 0 & \text{其它}, \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$, 求 μ, θ 的矩估计.

解. 设随机变量 $Y = X - \mu$, 则 Y 服从参数为 θ 的指数分布, 有

$$E(Y) = 1/\theta \quad \text{和} \quad \text{Var}(Y) = 1/\theta^2.$$

由此可得 $E(X) = \mu + 1/\theta$ 和 $\text{Var}(X) = 1/\theta^2$. 计算对应的样本矩

$$A_1 = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad B_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

求解方程组

$$\mu + \frac{1}{\theta} = A_1, \quad \frac{1}{\theta^2} = B_2,$$

解得 $\mu = \bar{X} - \sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2/n}$ 和 $\theta = 1/\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2/n}$. □

课堂习题:

- 求正态总体 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 的 μ, σ^2 的矩估计法.
- 求总体 $X \sim \mathcal{U}(a, b)$ 中 a, b 的矩估计法.

9.1.2 最大似然估计法

设 X_1, X_2, \dots, X_n 是来自总体 X 的一个样本. 若 X 为离散型随机变量, 其分布列为 $\Pr(X = x) = \Pr(X = x; \theta)$, 则样本 X_1, X_2, \dots, X_n 的分布列为

$$L(\theta) = L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n \Pr(x_i; \theta).$$

这里 $L(\theta)$ 表示样本 $X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n$ 发生的概率.

若 X 为连续型随机变量, 其概率密度为 $f(x; \theta)$, 则 $X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n$ 的联合概率密度为 $\prod_{i=1}^n f(x_i; \theta)$, 记

$$L(\theta) = L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta).$$

根据概率密度定义可知 $L(\theta)$ 越大, 样本 (X_1, X_2, \dots, X_n) 落入 (x_1, x_2, \dots, x_n) 的邻域内概率越大.

综合上述离散和连续两种随机变量, 统称 $L(\theta)$ 为样本 X_1, X_2, \dots, X_n 的似然函数, 可以发现 $L(\theta)$ 是 θ 的函数. 若

$$\hat{\theta} = \arg \max_{\theta} L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta),$$

则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的最大似然估计量. 直觉而言: 最大似然估计量 $\hat{\theta}$ 是使观测值 $X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n$ 出现的概率最大.

求解最大化似然估计的步骤如下:

- 1) 写出对数似然函数 $\log(L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta))$;
- 2) 对对数似然函数的参数 θ 求一阶导数或一阶偏导, 令其导数等于0;
- 4) 求解方程组得到最大似然估计量 $\hat{\theta}$.

例9.3. 设 X_1, X_2, \dots, X_n 是取自总体 $X \sim B(1, p)$ 的一个样本, 求参数 p 的极大似然估计.

解. 首先计算似然函数

$$L(p) = \prod_{i=1}^n p^{X_i} (1-p)^{1-X_i} = p^{\sum_{i=1}^n X_i} (1-p)^{n-\sum_{i=1}^n X_i},$$

以及对数似然函数

$$\ln L(p) = \sum_{i=1}^n X_i \ln p + \left(n - \sum_{i=1}^n X_i \right) \ln(1-p),$$

设

$$0 = \frac{d \ln L(p)}{dp} = \frac{1}{p} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{1-p} \left(n - \sum_{i=1}^n X_i \right).$$

由此可得 $p = \sum_{i=1}^n X_i / n = \bar{X}$. [验证矩估计法]

□

例9.4. 设 X_1, X_2, \dots, X_n 为总体 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 求 μ 和 σ^2 的最大似然估计.

解. 根据正态分布可知 X 的概率密度函数为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$. 样本 X_1, X_2, \dots, X_n 的似然函数为

$$L(\mu, \sigma^2) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi}\sigma)^n} \exp \left(- \sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{2\sigma^2} \right).$$

其对数似然函数为 $\ln L(\mu, \sigma^2) = -n \ln(2\pi)^{\frac{1}{2}} - n \ln \sigma - \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 / 2\sigma^2$. 对参数 μ 求导计算可得

$$\frac{d \ln L(\mu, \sigma^2)}{d\mu} = \sum_{i=1}^n (X_i - \mu) = 0 \implies \mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X},$$

对 σ 求导计算可得

$$\frac{d \ln L(\mu, \sigma^2)}{d\sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 = 0 \implies \sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

□

前面两例中的矩估计和最大似然估计完全一样.

例9.5. 设总体 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} (\alpha + 1)x^\alpha & x \in (0, 1) \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

设 X_1, X_2, \dots, X_n 是总体 X 的样本, 求 α 的极大似然估计.

解. 首先得到似然函数为

$$L(\alpha) = (\alpha + 1)^n \prod_{i=1}^n X_i^\alpha = (\alpha + 1)^n (X_1 X_2 \cdots X_n)^\alpha,$$

以及其对数似然函数 $\ln L(\alpha) = n \ln(\alpha + 1) + \alpha \ln(X_1 X_2 \cdots X_n)$. 求导并令导数为零有

$$\frac{d \ln L(\alpha)}{d\alpha} = \frac{n}{\alpha + 1} + \ln(X_1 X_2 \cdots X_n) = 0,$$

求解得

$$\alpha = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln(\frac{1}{X_i})} - 1 = \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(\frac{1}{X_i})} - 1.$$

□

对上例, 矩估计值为 $\alpha = (2\bar{X} - 1)/(1 - \bar{X})$, 因此矩估计值与极大似然估计值可能不同.

例9.6. 总体 $X \sim U(a, b)$, 求 a, b 的极大似然估计.

解. 首先得到 X 的密度函数为 $f(x) = 1/(b - a)$ ($x \in [a, b]$), 其它为零, 因此似然函数为

$$L(a, b) = \begin{cases} \frac{1}{(b-a)^n} & a \leq X_1, X_2, \dots, X_n \leq b \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

直接求导无法解出 a 与 b 的估计, 此时可以从极大似然定义出发, 最大化 $L(a, b)$, 应使得 b 尽可能小、 a 尽可能大, 但需满足 $a \leq X_1, X_2, \dots, X_n \leq b$, 因此极大似然估计量为:

$$b = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\} \quad a = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}.$$

□

极大似然估计不可变性: 设 $\hat{\theta}$ 为 θ 的极大似然估计, 设 $\mu(\theta)$ 为 θ 的函数, 且存在反函数 $\theta = \theta(\mu)$, 则 $\hat{\mu} = \mu(\hat{\theta})$ 是 μ 的极大似然估计.

例9.7. 设 X_1, X_2, \dots, X_n 是总体 X 的样本, 以及总体的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \theta e^{-(x-\mu)\theta} & x \geq \mu \\ 0 & \text{其它}, \end{cases}$$

求 μ, θ 的极大似然估计.

解. 首先得到似然函数为

$$L(\theta, \mu) = \begin{cases} \theta^n e^{-\theta \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)} & X_i \geq \mu \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

进一步得到对数似然函数为

$$\ln L(\theta, \mu) = n \ln \theta - \theta \sum_{i=1}^n (X_i - \mu).$$

求偏导、并令偏导等于零有

$$\frac{\ln L(\theta, \mu)}{d\theta} = \frac{n}{\theta} - \sum_{i=1}^n (X_i - \mu) = 0 \quad \Rightarrow \quad \theta = \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)},$$

另一方面有

$$\frac{\ln L(\theta, \mu)}{d\mu} = n\theta = 0 \quad \Rightarrow \quad \theta = 0,$$

此时无法求解 θ, μ 的极大似然估计.

回到似然函数的定义

$$L(\theta, \mu) = \begin{cases} \theta^n e^{-\theta \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)} & X_1, X_2, \dots, X_n \geq \mu \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

可以发现 μ 越大似然函数 $L(\theta, \mu)$ 越大, 但须满足 $X_i \leq \mu$ ($i \in [n]$). 由此可得极大似然估计

$$\hat{\mu} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\},$$

进一步求解可得

$$\hat{\theta} = \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \hat{\mu})}.$$

□