

# §8. 线性空间的同构

一、同构映射的定义

二、同构的有关结论

## 引入

我们知道，在数域 $P$ 上的 $n$ 维线性空间 $V$ 中取定一组基后， $V$ 中每一个向量  $\alpha$  有唯一确定的坐标

$(a_1, a_2, \dots, a_n)$ ，向量的坐标是 $P$ 上的 $n$ 元数组，因此属于 $P^n$ 。这样一来，取定了 $V$ 的一组基  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$  对于 $V$ 中每一个向量  $\alpha$ ，令  $\alpha$  在这组基下的坐标  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$  与  $\alpha$  对应，就得到 $V$ 到 $P^n$ 的一个单射

$$\sigma: V \rightarrow P^n, \alpha \mapsto (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

反过来，对于 $P^n$ 中的任一元素  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$   $\alpha = \varepsilon_1 a_1 + \varepsilon_2 a_2 + \dots + \varepsilon_n a_n$  是 $V$ 中唯一确定的元素，并且  $\sigma(\alpha) = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ ，即 $\sigma$ 也是满射。因此， $\sigma$ 是 $V$ 到 $P^n$ 的一一对应。

这个对应的重要性表现在它与运算的关系上.

任取  $\alpha, \beta \in V$ , 设

$$\alpha = a_1 \varepsilon_1 + a_2 \varepsilon_2 + \cdots + a_n \varepsilon_n, \quad \beta = b_1 \varepsilon_1 + b_2 \varepsilon_2 + \cdots + b_n \varepsilon_n$$

$$\text{则 } \sigma(\alpha) = (a_1, a_2, \cdots, a_n), \quad \sigma(\beta) = (b_1, b_2, \cdots, b_n)$$

$$\begin{aligned} \text{从而 } \sigma(\alpha + \beta) &= (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \cdots, a_n + b_n) \\ &= (a_1, a_2, \cdots, a_n) + (b_1, b_2, \cdots, b_n) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta) \end{aligned}$$

$$\sigma(k\alpha) = (ka_1, ka_2, \cdots, ka_n) \quad \forall k \in P$$

$$= k(a_1, a_2, \cdots, a_n) = k\sigma(\alpha),$$

这就是说,  $V$  中的向量用  $P^n$  中的坐标表示后, 它们的运算可以归结为它们的坐标的运算.

# 一、同构映射的定义

设  $V, V'$  都是数域  $P$  上的线性空间，如果映射  $\sigma: V \rightarrow V'$  具有以下性质：

- i)  $\sigma$  为双射
- ii)  $\sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta), \quad \forall \alpha, \beta \in V$
- iii)  $\sigma(k\alpha) = k\sigma(\alpha), \quad \forall k \in P, \forall \alpha \in V$

则称  $\sigma$  是  $V$  到  $V'$  的一个**同构映射**，并称线性空间  $V$  与  $V'$  **同构**，记作  $V \cong V'$ 。

**例1、**  $V$ 为数域 $P$ 上的 $n$ 维线性空间,  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 为 $V$ 的一组基, 则前面 $V$ 到 $P^n$ 的一一对应

$$\sigma: V \rightarrow P^n,$$

$$\alpha \mapsto (a_1, a_2, \cdots, a_n) \quad \forall \alpha \in V$$

这里 $(a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 为 $\alpha$ 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 基下的坐标,

就是一个 $V$ 到 $P^n$ 的同构映射, 所以  $V \cong P^n$ .

## 二、同构的有关结论

1、数域 $P$ 上任一 $n$ 维线性空间都与 $P^n$ 同构.

2、设 $V, V'$ 是数域 $P$ 上的线性空间,  $\sigma$ 是 $V$ 到 $V'$ 的同构映射, 则有

$$1) \quad \sigma(0) = 0, \quad \sigma(-\alpha) = -\sigma(\alpha).$$

$$2) \quad \sigma(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_r\alpha_r) \\ = k_1\sigma(\alpha_1) + k_2\sigma(\alpha_2) + \cdots + k_r\sigma(\alpha_r),$$

$$\alpha_i \in V, \quad k_i \in P, \quad i = 1, 2, \cdots, r.$$

- 3)  $V$  中向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$  线性相关 (线性无关) 的充要条件是它们的象  $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \dots, \sigma(\alpha_r)$  线性相关 (线性无关) .
- 4)  $\dim V = \dim V'$  .
- 5)  $\sigma: V \rightarrow V'$  的逆映射  $\sigma^{-1}$  为  $V'$  到  $V$  的同构映射.
- 6) 若  $W$  是  $V$  的子空间, 则  $W$  在  $\sigma$  下的象集

$$\sigma(W) = \{\sigma(\alpha) \mid \alpha \in W\}$$

是的  $V'$  子空间, 且  $\dim W = \dim \sigma(W)$  .

证: 1) 在同构映射定义的条件iii)  $\sigma(k\alpha) = k\sigma(\alpha)$

中分别取  $k = 0$  与  $k = -1$ , 即得

$$\sigma(0) = 0, \quad \sigma(-\alpha) = -\sigma(\alpha)$$

2) 这是同构映射定义中条件ii)与iii)结合的结果.

3) 因为由  $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_r\alpha_r = 0$

可得  $k_1\sigma(\alpha_1) + k_2\sigma(\alpha_2) + \cdots + k_r\sigma(\alpha_r) = 0$

反过来, 由  $k_1\sigma(\alpha_1) + k_2\sigma(\alpha_2) + \cdots + k_r\sigma(\alpha_r) = 0$

可得  $\sigma(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_r\alpha_r) = 0$ .



而  $\sigma$  是一一对应, 只有  $\sigma(0) = 0$ .

所以可得  $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_r\alpha_r = 0$ .

因此,  $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$  线性相关 (线性无关)

$\Leftrightarrow \sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \cdots, \sigma(\alpha_r)$  线性相关 (线性无关).

4) 设  $\dim V = n$ ,  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$  为  $V$  中任意一组基.

由 2) 3) 知,  $\sigma(\varepsilon_1), \sigma(\varepsilon_2), \cdots, \sigma(\varepsilon_n)$  为  $\sigma$  的一组基.

所以  $\dim V' = n = \dim V$ .

5) 首先  $\sigma^{-1}: V' \rightarrow V$  是1-1对应, 并且

$$\sigma \circ \sigma^{-1} = I_{V'}, \quad \sigma^{-1} \circ \sigma = I_V, \quad I \text{ 为恒等变换.}$$

任取  $\alpha', \beta' \in V'$ , 由于  $\sigma$  是同构映射, 有

$$\begin{aligned} \sigma(\sigma^{-1}(\alpha' + \beta')) &= \sigma \circ \sigma^{-1}(\alpha' + \beta') = \alpha' + \beta' \\ &= \sigma \circ \sigma^{-1}(\alpha') + \sigma \circ \sigma^{-1}(\beta') = \sigma(\sigma^{-1}(\alpha')) + \sigma(\sigma^{-1}(\beta')) \\ &= \sigma(\sigma^{-1}(\alpha') + \sigma^{-1}(\beta')) \end{aligned}$$

再由  $\sigma$  是单射, 有  $\sigma^{-1}(\alpha' + \beta') = \sigma^{-1}(\alpha') + \sigma^{-1}(\beta')$

同理, 有  $\sigma^{-1}(k\alpha') = k\sigma^{-1}(\alpha'), \quad \forall \alpha' \in V', \forall k \in P$

所以,  $\sigma^{-1}$  为  $V'$  到  $V$  的同构映射.

6) 首先,  $\sigma(W) \subseteq \sigma(V) = V'$

且  $\because 0 = \sigma(0) \in \sigma(W), \therefore \sigma(W) \neq \emptyset$

其次, 对  $\forall \alpha', \beta' \in \sigma(W)$ , 有  $W$  中的向量  $\alpha, \beta$   
使  $\sigma(\alpha) = \alpha', \sigma(\beta) = \beta'$ .

于是有  $\alpha' + \beta' = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta) = \sigma(\alpha + \beta)$

$$k\alpha' = k\sigma(\alpha) = \sigma(k\alpha), \quad \forall k \in P$$

由于  $W$  为子空间, 所以  $\alpha + \beta \in W, k\alpha \in W$ .

从而有  $\alpha' + \beta' \in \sigma(W), k\alpha' \in \sigma(W)$ .

所以  $\sigma(W)$  是  $V'$  的子空间.

显然,  $\sigma$  也为  $W$  到  $\sigma(W)$  的同构映射, 即

$$W \cong \sigma(W)$$

故  $\dim W = \dim \sigma(W)$ .

注

由2可知, 同构映射保持零元、负元、线性组合及线性相关性, 并且同构映射把子空间映成子空间.

### 3、两个同构映射的乘积还是同构映射.

证：设  $\sigma: V \rightarrow V'$ ,  $\tau: V' \rightarrow V''$  为线性空间的同构映射，则乘积  $\tau \circ \sigma$  是  $V$  到  $V''$  的1—1对应.

任取  $\alpha, \beta \in V, k \in P$ , 有

$$\begin{aligned}\tau \circ \sigma(\alpha + \beta) &= \tau(\sigma(\alpha) + \sigma(\beta)) \\ &= \tau(\sigma(\alpha)) + \tau(\sigma(\beta)) = \tau \circ \sigma(\alpha) + \tau \circ \sigma(\beta)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tau \circ \sigma(k\alpha) &= \tau(\sigma(k\alpha)) = \tau(k\sigma(\alpha)) \\ &= k\tau(\sigma(\alpha)) = k\tau \circ \sigma(\alpha)\end{aligned}$$

所以，乘积  $\tau \circ \sigma$  是  $V$  到  $V''$  的同构映射.

## 注

同构关系具有：

反身性：  $V \stackrel{I_V}{\cong} V$

对称性：  $V \stackrel{\sigma}{\cong} V' \Rightarrow V' \stackrel{\sigma^{-1}}{\cong} V$

传递性：  $V \stackrel{\sigma}{\cong} V', V' \stackrel{\tau}{\cong} V'' \Rightarrow V \stackrel{\tau \circ \sigma}{\cong} V''$

4、数域P上的两个有限维线性空间  $V_1, V_2$  同构

$$\Leftrightarrow \dim V_1 = \dim V_2.$$

证: " $\Rightarrow$ " 若  $V_1 \cong V_2$ , 由性质2之4) 即得

$$\dim V_1 = \dim V_2.$$

" $\Leftarrow$ " 若  $\dim V_1 = \dim V_2$ ,

由性质1, 有  $V_1 \cong P^n, V_2 \cong P^n$

$$\therefore V_1 \cong V_2.$$

**例2、把复数域看成实数域 $\mathbf{R}$ 上的线性空间，**

**证明：  $C \cong R^2$**

**证：证维数相等.**

**首先， $\forall x \in C$ ， $x$ 可表成  $x = a1 + bi$ ， $a, b \in R$**

**其次，若  $a1 + bi = 0$ ，则  $a = b = 0$ .**

**所以， $1, i$ 为 $C$ 的一组基，  $\dim C = 2$ .**

**又，  $\dim R^2 = 2$**

**所以，  $\dim C = \dim R^2$ . 故，  $V_1 \cong V_2$ .**



**例3、全体正实数 $R^+$  关于加法 $\oplus$ 与数量乘法 $\circ$ ：**

$$a \oplus b = ab, \quad k \circ a = a^k$$

作成实数域 $R$ 上的线性空间.

把实数域 $R$ 看成是自身上的线性空间.

证明：  $R^+ \cong R$ ，并写出一个同构映射.

证：作对应  $\sigma : R^+ \rightarrow R, \sigma(a) = \ln a, \forall a \in R^+$

易证  $\sigma$  为  $R^+$  到  $R$  的1-1对应.

且对  $\forall a, b \in R^+, \forall k \in R$ , 有

$$\sigma(a \oplus b) = \sigma(ab) = \ln ab = \ln a + \ln b = \sigma(a) + \sigma(b)$$

$$\sigma(k \circ a) = \sigma(a^k) = \ln a^k = k \ln a = k \sigma(a)$$

所以,  $\sigma$  为  $R^+$  到  $R$  的同构映射. 故  $R^+ \cong R$ .

方法二: 作对应  $\tau: R \rightarrow R^+, \tau(x) = e^x, \forall x \in R$

易证:  $\tau$  为  $R$  到  $R^+$  的1-1对应, 而且也为同构映射.

事实上,  $\tau$  为  $\sigma$  的逆同构映射.