



INFORMACIÓN CLÍNICA


Nombre	zero	Fecha	4/1/2026, 09:00:00
ID de Paciente	0	Estudio	N° 1
Edad	2025 años	Modelo	DIRDv1r1
Antecedentes	Diabetes type2 (5a), HTA		
Nota Estudio	-		

RESUMEN DE HALLAZGOS Y ANÁLISIS POR CUADRANTES


Hallazgo	Total
Disco Óptico	2
Exudado Duro	10
Microhemorragias	8
Fóvea	2
Copa Óptica	1
Hemorragia	5

Cuadrante	Total
Superior Temporal (ST)	14
Inferior Temporal (IT)	10
Superior Nasal (SN)	0
Inferior Nasal (IN)	0

OI (Izquierdo)




OD (Derecho)




Galería de Imágenes

10579 right.png



4df6a81b476e.png



Conclusiones

El paciente presenta una retinopatía diabética no proliferativa (RDNP) moderada en ambos ojos. En el ojo izquierdo (OI), se detectaron 3 microaneurismas y 2 exudados duros, lo que justifica la clasificación de RDNP moderada según el protocolo MINSAL Chile 2017. En el ojo derecho (OD), se detectaron 5 hemorragias, 5 microaneurismas y 8 exudados duros, lo que también justifica la clasificación de RDNP moderada. La confianza en la clasificación es alta en ambos ojos. Se recomienda un seguimiento oftalmológico cada 6 meses, así como el control de factores de riesgo como la presión arterial, el control glucémico y el control de lípidos. Es importante destacar que no se detectaron neovascularizaciones ni exudados blandos en ninguno de los ojos. El paciente debe seguir las recomendaciones del protocolo MINSAL Chile 2017, que incluyen la optimización del control glucémico, el control de la presión arterial y el seguimiento oftalmológico regular. La urgencia de la situación es rutinaria y se recomienda un seguimiento en 180 días.

Firma del Especialista