列印日期: 2024/09/16 臺中榮民總醫院護理衛教


護理衛教 / 一般外科

乳癌術後病人淋巴水腫的預防與照護(含影片)

長度: 14:15, 制訂日期: 2016-03-09, 最近修訂: 2024-03-19, 編號: GS-016·103-W85-02



乳癌術後淋巴水腫之復健運動




播放影片: https://ihealth.vghtc.gov.tw/media/642

【學習重點】

- 1. 乳癌術後造成淋巴水腫的因素:淋巴結摘除範圍、放射線治療、傷口情形。
- 2. 淋巴水腫症狀:皮膚變緊、腫脹、沉重感、手壓皮膚有凹窩、肢體不好活動。
- 3. 淋巴水腫的運動預防:術後手臂復健運動,若發現腫脹問題,諮詢復健科或醫師協助。

乳癌術後「淋巴水腫」是因開刀側的淋巴結被摘除、或局部感染,導致淋巴回流受損或阻塞,使得液體累積於組織,造成局部腫脹的現象。



一、那些人容易造成淋巴水腫?

乳癌術後「淋巴水腫」是因開刀側的淋巴結被摘除、或局部感染,導致淋巴回流受損或阻塞,使得液體累積於組織,造成局部腫脹的現象。

淋巴結摘除範圍大、數目多 放射線治療 傷口情形 1. 傷口癒合慢、積液時間長。 2. 感染。 3. 腫瘤復發。

二、淋巴水腫有那些症狀呢?

- 1. 皮膚變緊、腫脹、沉重感,手壓皮膚有凹窩。
- 2. 肢體不好活動。



三、預防淋巴水腫發生的照護事項

1. 穿著篇







2. 皮膚保護篇



3. 活動篇



爬高山時穿壓 力袖套、使用 彈性繃帶



4. 預防淋巴水腫運動

- A. 活動原則:術後儘早執行手臂復健運動,與醫師討論運動內容,勿過度使用患肢,活動後若感到疼痛,先休息,將患肢抬高。
- B. 術後第一天:執行梳頭、刷牙、手部抓握【注意:動作不高於肩膀(不可大於90度)】。
- C. 手臂運動原則:引流管拔除前,動作不可高於肩膀(小於90度);引流管拔除後2週,醫師許可下,可高於肩膀(大於90度)。
- D. 恢復期:建議緩和、漸進式的有氧、伸展、阻力運動(手臂搖擺,爬牆,舉桿,拉繩,太極,瑜珈,踏青,游泳,散步)。若發現有腫脹問題時請諮詢復健科或醫師,協助消退腫脹、規畫健康新生活、改善生活品質。



四、結語

淋巴水腫發生時間點不一定,可能於術後立即或術後好幾年才發生,出院後只要遵照醫師及護理師提供的照護守則及配合上述衛教內容,則可預防淋巴水腫的發生,維持正常的生活。

五、參考資料

- 1. 蔡佩倚、施登堯(2021)·運動對乳癌患者創傷的效益·中原體育學報,(16),42-50。
- 2. Temur, K., &Kapucu,S.(2019). The effectiveness of lymphedema self-management in the prevention of breast cancer-related lymphedema and quality of life: A randomized controlled trial. European Journal of Oncology Nursing,40, 22-35. https://doi.10.1016/j.ejon. 2019.02.006
- 3. 圖片來源:授權於 Yiling-Shing.

1.	傷口處留有一引流管,	為避免組織液及血水淤積。	, 宜注意保持管子通暢	,勿牽扯扭折 。	·維持引流管於負壓狀態(扁
	狀)。				

- 是 否 不知道
- **2.** 手術後當天開始執行患肢握球運動,術後**24**小時使用患側手吃飯、梳頭及盥洗,梳頭時尤其要注意保持頭頸部挺直。
 - 是 否 不知道
- **3.** 保持傷口清潔乾燥,若攜帶引流管返家者,則每日觀察並記錄引流液的量及顏色,引流管拔除後可馬上開始洗澡。
 - 是 否 不知道
- 4. 患側手臂有水腫或傷口有發炎現象(紅、腫、熱、痛)時,或血腫時應立即回診。
 - 是 否 不知道
- 5. 進行淋巴廓清之病人於引流管拔除及無淋巴積液後,經醫師評估再開始執行復健運動。
 - 是 否 不知道

評語

公公公公公

臺中榮民總醫院 407219臺中市西屯區臺灣大道四段1650號 總機: (04)2359-2525

全人智慧 醫療典範 愛心品質 創新當責

本站內容為臺中榮民總醫院所有·未經允許請勿任意轉載、複製或做商業用途 臺中榮民總醫院護理部 著作權所有