

肺腫瘤化學治療副作用及居家照護

制訂日期: 2006-12-06, 最近修訂: 2024-03-19, 編號: CM-003

【學習重點】

1. 施打化學治療藥物前、中、後注意事項。
2. 化學治療的過程通常會伴隨許多副作用如:食慾不振、倦怠、噁心、嘔吐、口乾、口腔黏膜發炎或潰瘍、白血球降低，病人、家屬與醫療人員共同參與照護，藉由良好的照護可以減輕副作用，緩解身體不適。

一、治療時需要注意的變化

1. 注射部位的變化：靜脈注射化學藥物時，注射部位如有發紅、疼痛感、腫脹情形，請即刻告知醫護人員處理。
2. 身體不適：不同的藥物會有不同的身體不適，程度也不同。常見的不適有噁心、嘔吐、發燒...等，當發生這些不適時請儘快告知醫護人員，可即早處理，減輕不適。
3. 過敏症狀，如：皮膚癢、蕁麻疹、呼吸困難、胸悶。

二、化學治療常見的副作用及處理方法

1. 食慾不振、倦怠:療中胃口會變不好，吃不下或東西變不好吃，此時可以少量多餐，於兩餐間增加點心。選擇病人喜愛的食物增加飲食攝取。高蛋白、高熱量的食物也可增加，但不要過油、過鹹。如仍無法進食以致體重下降，建議至門診或急診尋求專科醫師協助，適當給予點滴補充。
2. 噁心、嘔吐:噁心及嘔吐起始時間因人而異，針對容易導致噁心及嘔吐的藥物，醫師會先給予預防性止吐用藥，並且開立藥物返家使用，如出現噁心感，可立即服用，預防嘔吐情形發生。通常症狀約3-5天開始，會有輕度噁心感，爾後伴隨著嘔吐的情形發生，約10-14天後症狀會逐漸改善。
 - A. 進食應採少量多餐，選擇清淡易消化的食物，細嚼慢嚥，勿於進食過程同時進食湯水水的食物，避免產生過度飽滿感。如出現噁心、嘔吐情形，暫時不要吃東西，待症狀緩解後再進食。
 - B. 因噁心嘔吐症狀會影響病人食慾、進食量減少下營養需求不足，建議於平時可提供高熱量、高蛋白的食物，避免甜、油、炸、過鹹及辛辣的食物
 - C. 出現輕度噁心感時，可做些活動轉移注意力，例如看電視或報紙、與他人聊天、聆聽音樂等。
 - D. 進食後的1-2小時勿立即平躺，因容易產生嘔吐、嗆咳情形。
 - E. 不慎出現嘔吐情形時，應行口腔清潔，避免口腔衛生不佳引起噁心感。
 - F. 如化療後出現噁心嘔吐，可記錄症狀產生的時間及頻率，於返診時與醫師討論。
3. 口乾、口腔黏膜發炎或潰瘍:口腔黏膜約5-14天開始出現黏膜破損而有疼痛感，破損範圍擴大即演變為潰瘍，此時容易影響進食、造成感染，因此更應注意預防口腔黏膜損傷。
 - A. 於三餐飯後、睡前及早上起床刷牙、漱口，保持口腔清潔衛生。
 - B. 避免吃刺激性食物，如辛辣、油炸，選擇容易吞嚥的食物。
 - C. 每天於口腔清潔後，以鏡子自我檢查口腔的黏膜，包含口腔內雙頰、舌頭、上顎處，觀察有無刺激感、破損或是白色點狀，黏膜發炎時，使用軟毛牙刷清潔口腔，若情況嚴重、出現疼痛問題，應告知醫護人員，適時使用藥物如殺菌漱口水、口內膏、止痛藥物，以緩解症狀。
4. 白血球降低、抵抗力減弱:化學治療後7至14天體內白血球容易降至最低點，此時身體抵抗力也開始降低，容易出現感染的問題，所以平常即要做到保護自己避免遭受感染。
 - A. 洗手是最有效預防感染的措施，使用肥皂、洗手乳洗手兩分鐘，可消除手上殘留的細菌。吃飯前、上廁所後以及觸碰到有灰塵的地方時一定要洗手。
 - B. 外出時戴上口罩，避免產生呼吸道感染。
 - C. 保持身體乾淨、黏膜完整，包含洗澡、洗頭、修剪指甲。

- D. 使用軟毛牙刷刷牙，避免傷害牙齦。
 - E. 食物一定要煮熟，絕對禁止吃生的食物(生菜沙拉、生魚片、半熟蛋、半生熟的肉品等)，選擇可以削皮的水果，如：蘋果、橘子、葡萄、香蕉等，治療期間增加蛋白質攝取(如：蛋、豆、魚、肉類)。
 - F. 可適當使用益生菌幫助腸胃蠕動，避免飲用優酪乳。
 - G. 盡量避免前往公共場所，遠離感冒及具感染力之病人。如需前往公共場所，可佩戴口罩、穿著保暖衣物，不隨意接觸較骯髒的環境，避免遭受感染
5. 腎臟功能遭受到破壞:因肺腫瘤病人初次行化學治療時，因藥物作用，造成腎臟細胞受損，產生壞死，導致出現急性的腎臟功能損傷，此影響可藉由照護措施來預防。
- A. 平時增加水分攝取，每日至少2000毫升以上，保持腎臟的循環。
 - B. 每一天觀察排尿量及排尿次數有無減少，如排尿有灼熱感或疼痛、持續頻尿、尿急感、紅色或粉紅色的尿液、或無尿時，應告知醫師。
 - C. 定期返診抽血監測腎臟功能及尿液常規變化。
6. 脫髮:掉髮一種暫時性現象，於結束藥物治療的數月後大多可恢復，治療期間可以選擇適當的修剪頭髮，於外出時佩戴帽子、頭巾或是假髮來保護頭部。
7. 周邊神經病變:因藥物副作用導致出現周邊神經症狀如：疼痛、肢體麻木、感覺喪失、反射動作遲鈍等，如果有相關症狀應立即告知醫護人員。小心使用尖銳物品(刀、剪刀)，避免意外發生，保持手腳暖和(可戴手套、穿襪子)。藉由適當補充維他命B群來改善症狀。

三、其他化學治療相關居家注意事項

- 1. 依照醫師治療的計劃定期返院追蹤檢查，治療結束後約一週需返診抽血追蹤，以便瞭解化學治療的變化。
- 2. 平時應該增加新鮮食物攝取、維持體力、維持營養，早日提升體內製造血球功能，增強身體抵抗力。
- 3. 如有發燒(耳溫大於攝氏38度)、持續咳嗽無改善、排尿燒灼感等症狀應懷疑感染產生，應立即就醫。
- 4. 保護自己、避免受傷流血，觀察身上有無出現異常出血情形包含：瘀斑、流鼻血、血尿、血便等現象。

四、總結

常見肺腫瘤化學治療之副作用包含食慾不振、噁心及嘔吐、口腔黏膜損傷、白血球降低、腎臟功能損傷及脫髮等，於返家後應繼續注意有無出現藥物副作用，按時返診追蹤，當出現副作用時，應與主治醫師討論病情，藉由適切之照護方式，緩解身體不適，並改善生活自行中斷療程，延誤治療時機。

五、參考資料

- 1. 財團法人台灣癌症基金會 (2022) ·肺癌大小事，2，01-22。
- 2. 洪敏瑛、邱文姿、戴仕卿、陳淑娟、蕭逸美、楊琇玲 (2022) ·癌症病人嗜中性白血球低下臨床照護指引第三版·腫瘤護理雜誌，22，59-91。 https://doi.org/10.6880/TJON.202210/SP_22.02
- 3. Steinmann, D., Babadag Savaş, B., Felber, S.,(2021), . Nursing Procedures for the Prevention and Treatment of Mucositis Induced by Cancer Therapies: Clinical Practice Guideline Based on an Interdisciplinary Consensus Process and a Systematic Literature Search. Integrative Cancer Therapies, 20. <https://doi.org/10.1177/153473542094041>
- 4. Desforges, A. D., Hebert, C. M., Spence, A. L., Reid, B., Dhaibar, H. A., Cruz-Topete, D., Cornett, E. M., Kaye, A. D., Urits, I., & Viswanath, O. (2022). Treatment and diagnosis of chemotherapy-induced peripheral neuropathy: An update. Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 147, 112671. <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2022.112671>

簡易測驗

讓我們來進行測驗以確認您已充分了解

1. 洗手是最有效預防感染的措施。

☐ 是 ☐ 否 ☐ 不知道

2. 食物可以多重選擇，想吃什麼就吃什麼。

☐ 是 ☐ 否 ☐ 不知道

3. 若在接受化學藥物時，注射部位有發紅、疼痛感、腫脹情形，請即刻告知醫護人員處理。

☐ 是 ☐ 否 ☐ 不知道

4. 施打化學藥物可能有食慾不振、噁心嘔吐、脫髮等副作用，並非每個人都會發生。

☐ 是 ☐ 否 ☐ 不知道

5. 三餐飯後、睡前及早上起床刷牙、漱口，保持口腔清潔衛生並使用軟毛牙刷刷牙，避免牙齦有出血情形。

☐ 是 ☐ 否 ☐ 不知道

評語



臺中榮民總醫院
407219臺中市西屯區臺灣大道四段1650號
總機：(04)2359-2525

全人智慧 醫療典範
愛心品質 創新當責

本站內容為臺中榮民總醫院所有，未經允許請勿任意轉載、複製或做商業用途
臺中榮民總醫院護理部 著作權所有