列印日期: 2024/09/16 臺中榮民總醫院護理衛教

#### 護理衛教 / 目錄總覽 / 婦科

# 婦科腹腔鏡手術後須知

制訂日期: 2001-01-08, 最近修訂: 2024-02-18, 編號: GYN-002


### 【學習重點】

- 1. 認識腹腔鏡手術,在肚臍及下腹部打3~4個小切口,利用特殊的機器將二氧化碳灌入腹腔,以特製的攝影機及手術器械來進行手術。
- 2. 學習腹腔鏡手術前準備及用物、手術後照護及出院照護注意事項。

#### 一、腹腔鏡手術簡介

- 1. 腹腔鏡是一種內視鏡,醫師會在肚臍及下腹部打3~4個約0.5~1公分的小切口,利用特殊的機器將二氧化碳灌入腹腔並將腹腔撐開,以特製的攝影機及手術器械,例如剪刀、夾子或電燒來進行手術。
- 2. 腹腔鏡手術除傷口小外,身體恢復也較快,由於傷口較小不影響美觀,住院約2~3天即可返家。適應症包含良性腫瘤切除、卵巢囊腫切除、及輸卵管結紮等。

### 二、 手術前準備及用物:



#### 三、手術後傷口照護

- 1. 傷口為三切或四切傷口,以美容膠黏貼(如圖一、二)。
- 2. 每週或脫落時即更換。
- 3. 持續貼覆3-6個月。
- 4. 若自購其它傷口敷料請於指導下使用。






圖一 三切傷口

圖二 四切傷口

# 四、疼痛怎麼辦?

- 1. 以疼痛評估量表(如圖三)來測量自己的疼痛分數,並告知護理師。
- 2. 咳嗽、改變姿勢時,用雙手或枕頭輕壓傷口,來緩解疼痛。
- 3. 按時服用止痛藥物




# 五、術後如何進食呢?

- 1. 手術後若仍禁食禁水時,可使用口腔棉棒沾水潤濕或漱口,減緩口渴感覺。
- 2. 如有嘔吐請先採側臥,避免嗆到導致肺炎,並告知護理師。
- 3. 醫師評估可進食時,請先喝溫開水50cc,若無噁心、嘔吐、腹脹情形,即可進食 (依醫囑採漸進式飲食,先流質飲食,如果汁、魚湯,再改吃軟質食物,如稀飯、麵條,無不適症狀再恢復正常飲食)。
- 4. 飲食以少量多餐為原則,如有脹氣情形則暫時不吃牛奶、豆漿、地瓜等產氣類食物,也儘量不要吃油膩或刺激性食物,如酒及辛辣食品。



# 六、身體清潔怎麼做?





# 七、預防併發症的撇步

- 1. 術後可能有喉嚨痛、癢、痰多的情形,如想咳嗽時可雙手按輕壓住傷口,將痰液咳出,需要時可使用蒸氣吸入,以減少肺部併發症。
- 2. 陰道可能還會有少量暗紅色或咖啡色分泌物流出或成點狀出血現象·大約 7~14 天左右·勤換衛生棉墊·保持會陰清潔·避免感染。
- 3. 早期下床活動,無法下床時請多翻身促進陽蠕動。
- 4. 漸進式下床方式:下床時常有頭暈情形,為避免跌倒,請先坐於床旁五分鐘,沒有頭暈情形再站於床旁五分鐘,沒 有頭暈情形才可行走,若有頭暈不適請立即回床休息。

## 八、 出院照護注意事項知多少:

- 1. 採均衡適當飲食,如高纖維高蛋白飲食為優。
- 2. 應適當休息,採漸進式增加日常活動。
- 3. 如有發燒、傷口化膿、下腹劇痛或陰道大量出血,應至急診就醫。
- 4. 按時返診,經醫師評估後,才恢復房事。
- 5. 若有女性荷爾蒙藥物使用、性生活等疑問,請與醫護師討論或諮詢。
- 6. 若有其他醫學照護問題·歡迎來電詢問:全方位健康諮詢中心:(04)23741353;婦科病房:(04)23592525轉8086或8087



# 九、結語

- 1. 手術後傷口保持乾燥。
- 2. 若有疼痛問題需立即告知醫療團隊。
- 3. 若有發燒、傷口化膿、下腹劇痛或陰道大量出血,應至急診就醫。

### 十、參考資料

- 1. 李耀泰、陳福民、郭宗正(2020)·婦科手術後快速復原的效果·南臺灣醫學雜誌,16(1),44-50。
- 2. 張正昌(2020)·達文西機器手臂系統在婦科手術的應用現況簡介·台北市醫師公會會刊·64(10)·43-51。

#### 婦科腹腔鏡手術後須知簡易測驗

讓我們來進行測驗,以確認您已充分了解。

- 是 否 不知道
- 2. 手術後傷口美容膠可持續貼覆3-6個月?
  - 是 否 不知道
- 3. 飲食以少量多餐為原則,如有脹氣情形牛奶、豆漿、地瓜等產氣類食物可以多吃?
  - 是 否 不知道
- 4. 返家後如有發燒、傷口化膿、下腹劇痛或陰道大量出血,應至急診就醫?
  - 是 否 不知道
- 5. 手術後約7~14天陰道可能會有少量暗紅色或咖啡色分泌物流出或點狀出血現象?
  - 是 否 不知道

評語

# 公公公公公

# 全人智慧 醫療典範 愛心品質 創新當責

本站內容為臺中榮民總醫院所有·未經允許請勿任意轉載、複製或做商業用途 臺中榮民總醫院護理部 著作權所有