

Représentation décimale périodique d'une fraction irréductible ⑧

La période d'un nombre à développement décimal périodique se note avec un trait horizontal placé au dessus de la séquence de chiffres qui se répète.

Exemple

$$\frac{3}{11} = 0,27272727 \dots = 0,\overline{27}$$

$$\frac{2}{13} = 0,153846153846 \dots = 0,\overline{153846}$$

$$\frac{1147}{495} = 2,3171717 \dots = 2,3\overline{17}$$

On peut retrouver la fraction irréductible correspondante au développement décimal périodique d'un nombre.

$$2,3\overline{17} = 2,3 + \frac{17}{10^3} + \frac{17}{10^5} + \frac{17}{10^7} + \dots$$

$$= 2,3 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{17}{10^{2n+1}} = \frac{23}{10} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{17}{10} \left(\frac{1}{100}\right)^n$$

$$= \frac{23}{10} + \frac{17/1000}{1 - \frac{1}{100}}$$

$$= \frac{23}{10} + \frac{17}{990}$$

$$= \frac{1147}{495}$$

Séries télescopiques

⑨

Définition

Une série télescopique est de la forme

$$\sum_{n=1}^{\infty} (b_{n+p} - b_n)$$

où p est un entier fixé.

On peut facilement calculer leurs sommes partielles.

Par exemple pour $\sum_{n=1}^{\infty} (b_{n+3} - b_n)$ on a :

$$S_k = \sum_{n=1}^k (b_{n+3} - b_n) = \sum_{n=1}^k b_{n+3} - \sum_{n=1}^k b_n$$

$$= b_4 + b_5 + \dots + b_{k+3} - (b_1 + b_2 + b_3 + b_4 + \dots + b_k)$$

$$= -b_1 - b_2 - b_3 + b_{k+1} + b_{k+2} + b_{k+3}$$

Donc

$$\sum_{n=1}^{\infty} (b_{n+3} - b_n) = \lim_{k \rightarrow \infty} (b_{k+1} + b_{k+2} + b_{k+3} - b_1 - b_2 - b_3)$$

Exemples

1) Calculer $\sum_{n=1}^{\infty} (\arctan(n+1) - \arctan(n-1))$

Solution

(10)

$$\begin{aligned} s_k &= \sum_{n=1}^k (\arctan(n+1) - \arctan(n-1)) \\ &= \sum_{n=1}^k \arctan(n+1) - \sum_{n=1}^k \arctan(n-1) \\ &= \arctan(2) + \arctan(3) + \dots + \arctan(k+1) - (\arctan(0) + \arctan(1) + \dots + \arctan(k-1)) \\ &= \cancel{\arctan(2)} + \cancel{\arctan(3)} + \dots + \cancel{\arctan(k)} - \arctan(0) - \arctan(1) - \dots - \cancel{\arctan(k-1)} \\ &= -\arctan(0) - \arctan(1) + \arctan(k) + \arctan(k+1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} s_k &= \lim_{k \rightarrow \infty} (-\arctan(0) - \arctan(1) + \arctan(k) + \arctan(k+1)) \\ &= -0 - \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{4} \end{aligned}$$

Don

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\arctan(n+1) - \arctan(n-1)) = \lim_{k \rightarrow \infty} s_k = \frac{3\pi}{4}$$

2) Calculer $\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{n^2 - 3n + 2}$

Solution

$$\frac{1}{n^2 - 3n + 2} = \frac{1}{(n-1)(n-2)} = \frac{1}{n-2} - \frac{1}{n-1}$$

$$\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{n^2-3n+2} = \sum_{n=4}^{\infty} \left(\frac{1}{n-2} - \frac{1}{n-1} \right)$$

$$\begin{aligned} s_k &= \sum_{n=4}^k \frac{1}{n-2} - \sum_{n=4}^k \frac{1}{n-1} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{k-2} - \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{k-1} \right) \\ &= \frac{1}{2} + \cancel{\frac{1}{3}} + \cancel{\frac{1}{4}} + \dots + \cancel{\frac{1}{k-2}} - \cancel{\frac{1}{3}} - \cancel{\frac{1}{4}} - \dots - \cancel{\frac{1}{k-1}} \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{k-1} \end{aligned}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} s_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2} + \frac{1}{k-1} = \frac{1}{2}$$

Donc

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2-3n+2} = \lim_{k \rightarrow \infty} s_k = \frac{1}{2}$$

3) Calculer $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{n(n+1)} + \frac{1}{2^n} \right)$

On considère les séries

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n(n+1)} \quad \text{et} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

(12)

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ est une série géométrique de raison $r = \frac{1}{2}$.

Donc elle est convergente et on a

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{n} - \frac{3}{n+1} \right)$$

$$\begin{aligned} S_k &= \sum_{n=1}^k \left(\frac{3}{n} - \frac{3}{n+1} \right) \\ &= \sum_{n=1}^k \frac{3}{n} - \sum_{n=1}^k \frac{3}{n+1} \end{aligned}$$

$$= \frac{3}{1} + \frac{3}{2} + \dots + \frac{3}{k-1} + \frac{3}{k} - \left(\frac{3}{2} + \frac{3}{3} + \dots + \frac{3}{k} + \frac{3}{k+1} \right)$$

$$= 3 - \frac{3}{k+1}$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n(n+1)} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n} - \frac{3}{n+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} S_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(3 - \frac{3}{k+1} \right) \\ &= 3 \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{n(n+1)} + \frac{1}{2^n} \right) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n(n+1)} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \\ &= 3 + 1 = 4 \end{aligned}$$