

**MAT 2784 A    Devoir # 3**  
**Dû le vendredi 25 Octobre.**

Nom

Prénom

Numéro d'étudiant

Solution

- **SVP** utilisez le format suivant pour soumettre votre devoir.
- Vous pouvez utiliser l'endos des page si celle-ci ne vous suffisent pas.

Résoudre les équations différentielles à valeurs initiales suivantes:

1. [3 points]  $x^2 y'' + 7xy' + 9y = 0$ ,  $x > 0$ ,  $y(1) = 0$ ,  $y'(1) = 1$
2. [3 points]  $x^2 y'' - 3xy' + 8y = 0$ ,  $x > 0$ ,  $y(1) = 3$ ,  $y'(1) = 9$
3. [3 points]  $y''' + 6y'' + 12y' + 8y = 0$ ,  $y(0) = 1$ ,  $y'(0) = -3$ ,  $y''(0) = 10$
4. [3 points]  $y^{(4)} + 5y'' + 4y = 0$ ,  $y(0) = 1$ ,  $y'(0) = 6$ ,  $y''(0) = 1$ ,  $y'''(0) = 21$
5. [3 points]  $x^4 y''' - x^2 y'' + 2xy' - 2y = 0$ ,  $x > 0$ ,  $y(1) = 3$ ,  $y'(1) = -7$ ,  $y''(1) = -9$

# MAT 2784 A Devoir #3 Solution

Euler-Cauchy

1.  $x^2 y'' + 7xy' + 9y = 0, \quad x > 0, \quad y(1) = 1, \quad y'(1) = 0$   
 l'éq. caract. :  $m(m-1) + 7m + 9 = 0$

$\Leftrightarrow m^2 + 6m + 9 = (m+3)^2 = 0 \Rightarrow m_1 = m_2 = -3$

$\therefore$  La soln générale :  $y(x) = c_1 x^{-3} + c_2 x^{-3} \ln x$

$y(1) = 1 \Rightarrow 1 = c_1 (1)^{-3} + c_2 (1)^{-3} \ln(1) \Rightarrow c_1 = 1$

$y'(x) = -3c_1 x^{-4} - 3c_2 x^{-4} \ln x + c_2 x^{-4}$

$y'(1) = 0 \Rightarrow 0 = -3c_1 (1)^{-4} - 3c_2 (1)^{-4} \ln(1) + c_2 (1)^{-4} \Rightarrow c_2 = 3$

$\therefore$  L'unique solution

$y(x) = x^{-3} + 3x^{-3} \ln x$

2.  $x^2 y'' - 3xy' + 6y = 0, \quad x > 0, \quad y(1) = 3, \quad y'(1) = 9$   
 L'éq. caract. :  $m(m-1) - 3m + 6 = m^2 - 4m + 6 = 0$

$\Leftrightarrow m_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{(-4)^2 - 4(6)}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{-16}}{2} = 2 \pm 2i$

$\therefore$  La soln générale :  $y(x) = c_1 x^2 \cos(2 \ln x) + c_2 x^2 \sin(2 \ln x)$

$y(1) = 3 \Rightarrow 3 = c_1 (1)^2 \cos(2 \ln(1)) + c_2 (1)^2 \sin(2 \ln(1)) \Rightarrow c_1 = 3$

$y'(x) = 2c_1 x \cos(2 \ln x) - 2c_1 x \sin(2 \ln x)$

$+ 2c_2 x \sin(2 \ln x) + 2c_2 x \cos(2 \ln x)$

$y'(1) = 9 \Rightarrow 9 = 2c_1 (1) \cos(2 \ln(1)) - 2c_1 (1) \sin(2 \ln(1))$

$+ 2c_2 (1) \sin(2 \ln(1)) + 2c_2 (1) \cos(2 \ln(1)) \Rightarrow c_2 = \frac{3}{2}$

$\therefore$  L'unique solution

$y(x) = 3x^2 \cos(2 \ln x) + \frac{3}{2} x^2 \sin(2 \ln x)$

3.  $y''' + 6y'' + 12y' + 8y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = -3, \quad y''(0) = 10$

L'éq. caract. :  $\lambda^3 + 6\lambda^2 + 12\lambda + 8 = 0$

On peut voir que  $\lambda = -2$  est une racine puis on trouve les deux autres

$\lambda^3 + 6\lambda^2 + 12\lambda + 8 = (\lambda + 2)(\lambda^2 + 4\lambda + 4) = (\lambda + 2)^3 = 0$

Donc  $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -2$  et la soln générale est :

$y(x) = c_1 e^{-2x} + c_2 x e^{-2x} + c_3 x^2 e^{-2x}$

$$y(0) = 1 \Rightarrow 1 = C_1 e^0 + C_2(0) e^0 + C_3(0)^2 e^0 \Rightarrow C_1 = 1$$

$$y'(x) = -2C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-2x} - 2C_3 x e^{-2x} + 2C_3 x e^{-2x} - 2C_3 x^2 e^{-2x}$$

$$y'(0) = -3 \Rightarrow -3 = -2C_1 e^0 + C_2 e^0 - 2C_3(0) e^0 + 2C_3(0) e^0 - 2C_3(0)^2 e^0$$

$$\text{so } -3 = -2C_1 + C_2 \Rightarrow C_2 = -1$$

$$y''(x) = 4C_1 e^{-2x} - 4C_2 e^{-2x} + 4C_2 x e^{-2x} + 2C_3 e^{-2x} - 8C_3 x e^{-2x} + 4C_3 x^2 e^{-2x}$$

$$y''(0) = 10 \Rightarrow 10 = 4C_1 e^0 - 4C_2 e^0 + 4C_2(0) e^0 + 2C_3 e^0 - 8C_3(0) e^0 + 4C_3(0)^2 e^0$$

$$\Rightarrow 10 = 4C_1 - 4C_2 + 2C_3 \Rightarrow C_3 = 1$$

∴ L'unique solution :  $y(x) = e^{-2x} - x e^{-2x} + x^2 e^{-2x}$

4.  $y^{(4)} + 5y'' + 4y = 0, y(0) = 1, y'(0) = -6, y''(0) = -1, y'''(0) = 24$

L'éq. caract. :  $\lambda^4 + 5\lambda^2 + 4 = (\lambda^2 + 1)(\lambda^2 + 4) = 0$

$\Rightarrow \lambda_{1,2} = \pm i, \lambda_{3,4} = \pm 2i$  et la sol<sup>n</sup> générale est

(S.G.) :  $y(x) = C_1 \cos x + C_2 \sin x + C_3 \cos(2x) + C_4 \sin(2x)$

$y(0) = 1 \Rightarrow 1 = C_1 \cos(0) + C_2 \sin(0) + C_3 \cos(0) + C_4 \sin(0) \Rightarrow C_1 + C_3 = 1$  ①

$y'(x) = -C_1 \sin x + C_2 \cos x - 2C_3 \sin(2x) + 2C_4 \cos(2x)$

$y'(0) = -6 \Rightarrow -6 = -C_1 \sin(0) + C_2 \cos(0) - 2C_3 \sin(0) + 2C_4 \cos(0) \Rightarrow C_2 + 2C_4 = -6$  ②

$y''(x) = -C_1 \cos x - C_2 \sin x - 4C_3 \cos(2x) - 4C_4 \sin(2x)$

$y''(0) = -1 \Rightarrow -1 = -C_1 \cos(0) - C_2 \sin(0) - 4C_3 \cos(0) - 4C_4 \sin(0) \Rightarrow -C_1 - 4C_3 = -1$  ③

$y'''(x) = C_1 \sin x - C_2 \cos x + 8C_3 \sin(2x) - 8C_4 \cos(2x)$

$y'''(0) = 24 \Rightarrow 24 = C_1 \sin(0) - C_2 \cos(0) + 8C_3 \sin(0) - 8C_4 \cos(0) \Rightarrow -C_2 - 8C_4 = 24$  ④

① + ③  $\Rightarrow C_3 = 0 \Rightarrow C_1 = 1$

② + ④  $\Rightarrow -6C_4 = 18 \Rightarrow C_4 = -3 \Rightarrow C_2 = 0$

∴ L'unique solution :  $y(x) = \cos(x) - 3 \sin(2x)$

5.  $x^3 y''' - x^2 y'' + 2xy' - 2y = 0, x > 0, y(1) = -3, y'(1) = -7, y''(1) = -9$   
 L'eq. caract. :  $m(m-1)(m-2) - m(m-1) + 2m - 2 = 0$

$$\Leftrightarrow (m-1)[m(m-2) - m + 2] = 0$$

$$\Leftrightarrow (m-1)(m^2 - 3m + 2) = (m-1)^2(m-2) = 0$$

$$\Rightarrow m_1 = m_2 = 1 \text{ and } m_3 = 2 \text{ et la g<sup>le</sup> générale est :}$$

$$y(x) = C_1 x + C_2 x \ln x + C_3 x^2$$

$$y(1) = -3 \Rightarrow -3 = C_1(1) + C_2(1) \ln(1) + C_3(1)^2 \Rightarrow C_1 + C_3 = -3 \quad (1)$$

$$y'(x) = C_1 + C_2 \ln x + C_2 + 2C_3 x$$

$$y'(1) = -7 \Rightarrow -7 = C_1 + C_2 \ln(1) + C_2 + 2C_3(1) \Rightarrow C_1 + C_2 + 2C_3 = -7 \quad (2)$$

$$y''(x) = C_2/x + 2C_3$$

$$y''(1) = -9 \Rightarrow -9 = C_2/1 + 2C_3 \Rightarrow C_2 + 2C_3 = -9 \quad (3)$$

$$(1) - (3) \Rightarrow C_1 = 2 \Rightarrow C_3 = -5 \Rightarrow C_2 = 1$$

• L'unique solution

$$y(x) = 2x + x \ln x - 5x^2$$

Résolvez les P.V.I. suivants:

6. [5 points]  $y'' - 4y = 12e^{-x} + 8x - 16$ ,  $y(0) = 10$ ,  $y'(0) = 1$

7. [5 points]  $y'' - 5y' + 6y = 2e^{2x} + 40 \cos x$ ,  $y(0) = y'(0) = 10$

# 6. • Éq. caract. :  $\lambda^2 - 4 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -2$  et  $\lambda_2 = 2$

• S.H :  $y_h = c_1 e^{-2x} + c_2 e^{2x}$

• S.P. : On ~~pose~~  $r(x) = 12e^{-x} + 8x - 16$  et donc une base pour  $\mathcal{D}_r$  est  $\{e^{-x}, x, 1\}$ .

Donc on pose  $y_p = a e^{-x} + b x + c \Rightarrow y_p' = -a e^{-x} + b$

et  $y_p'' = a e^{-x}$ .

On substitue pour avoir.  $a e^{-x} - 4(a e^{-x} + b x + c) = 12e^{-x} + 8x - 16$

$\Rightarrow \begin{cases} a - 4a = 12 \\ -4b = 8 \\ -4c = -16 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -4 \\ b = -2 \\ c = 4 \end{cases}$ . Donc  $\boxed{y_p = -4e^{-x} - 2x + 4}$

• S.G.  $\boxed{y_G = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-2x} - 4e^{-x} - 2x + 4}$   $\Rightarrow \boxed{y_G' = -2c_1 e^{-2x} + 2c_2 e^{2x} - 4e^{-x} - 2}$

• S.U:  $y_G(0) = 10 \Leftrightarrow c_1 + c_2 - 4 - 4 = 10 \Rightarrow \begin{cases} c_1 = 7 \\ c_2 = 11 \end{cases}$   
 $y_G'(0) = 10 \Leftrightarrow -2c_1 + 2c_2 + 4 - 2 = 10$

Donc la S.U:  $\boxed{y = 7e^{-2x} + 11e^{2x} - 4e^{-x} - 2x + 4}$

7.  $E_q^0$  Caract. :  $\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3.$

S.H. :  $y_R = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$

S.P. :  $r(x) = 2e^{2x} + 40 \cos x \Rightarrow$  une base pour  $D_r$  est  $\{e^{2x}, \cos x, \sin x\}$ . Comme  $e^{2x}$  est une solution de l'ÉDCH associée, on utilise le mode en  $x$ .

Donc on pose  $y_p = a x e^{2x} + b \cos x + c \sin x.$

$\Rightarrow y_p' = a e^{2x} + 2ax e^{2x} - b \sin x + c \cos x$

et  $y_p'' = 2a e^{2x} + 2a e^{2x} + 4ax e^{2x} - b \cos x - c \sin x$   
 $= 4a e^{2x} + 4ax e^{2x} - b \cos x - c \sin x.$

Substituez pour avoir :

$(4a e^{2x} + 4ax e^{2x} - b \cos x - c \sin x) - 5(a x e^{2x} + b \cos x + c \sin x) = 2e^{2x} + 40 \cos x$

Donc  $\begin{cases} x e^{2x} & 4a - 10a + 6a = 0 \checkmark \\ e^{2x} & 4a - 5a = 2 \Rightarrow \boxed{a = -2} \\ \cos x & -b - 5c + 6b = 40 \\ \sin x & -c + 5b + 6c = 0 \end{cases} \Rightarrow \boxed{b = 4, c = -4}$

Donc  $y_p = -2x e^{2x} + 4 \cos x - 4 \sin x$

S.G. :  $y_G = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} - 2x e^{2x} + 4 \cos x - 4 \sin x.$

S.U. :  $y_G' = +2C_1 e^{2x} + 3C_2 e^{3x} - 2e^{2x} - 4x e^{2x} - 4 \sin x - 4 \cos x.$

$\begin{cases} y_G(0) = 10 \\ y_G'(0) = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 + 4 = 10 \\ 2C_1 + 3C_2 - 2 - 4 = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} C_1 = 2 \\ C_2 = 4 \end{cases}$

D'où la S.U. :  $y = 2e^{2x} + 4e^{3x} - 2x e^{2x} + 4 \cos x - 4 \sin x$

8. [5 points] Trouvez les polynômes d'interpolation par splines de degré 3 aux frontières naturelles,  $S_0(x)$  et  $S_1(x)$ , pour les points  $\{(0, 0), (1, -2), (2, -6)\}$ .

Soient  $S_0(x) = a_0 + b_0x + c_0x^2 + d_0x^3$  et  $S_1(x) = a_1 + b_1x + c_1x^2 + d_1x^3$   
 Alors on doit avoir :  $(S_0'(x) = b_0 + 2c_0x + 3d_0x^2, S_1'(x) = b_1 + 2c_1x + 3d_1x^2; i=0,1)$ .

$$\left. \begin{array}{l} \bullet S_0(0) = 0 \\ \bullet S_0(1) = -2 \\ \bullet S_1(1) = -2 \\ \bullet S_1(2) = -6 \\ \bullet S_0'(1) = S_1'(1) \\ \bullet S_0''(1) = S_1''(1) \\ \bullet S_0''(0) = 0 \\ \bullet S_1''(2) = 0 \end{array} \right\} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \boxed{a_0 = 0} \\ b_0 + c_0 + d_0 = -2 \\ a_0 + b_0 + c_0 + d_0 = -2 \\ a_1 + 2b_1 + 4c_1 + 8d_1 = -6 \\ b_0 + 2c_0 + 3d_0 = b_1 + 2c_1 + 3d_1 \\ 2c_0 + 6d_0 = 2c_1 + 6d_1 \\ 2c_0 = 0 \Leftrightarrow \boxed{c_0 = 0} \\ 2c_1 + 12d_1 = 0 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} a_0 = c_0 = 0 \\ b_0 + d_0 = -2 \\ a_1 + b_1 + c_1 + d_1 = -2 \\ a_1 + 2b_1 + 4c_1 + 8d_1 = -6 \\ b_0 + 3d_0 - b_1 - 2c_1 - 3d_1 = 0 \\ 6d_0 - 2c_1 - 6d_1 = 0 \\ 2c_1 + 12d_1 = 0 \end{array} \right.$$

Résolvez le système pour avoir  $b_0 = -\frac{3}{2}, d_0 = -\frac{1}{2}, a_1 = -1, b_1 = \frac{3}{2}, c_1 = -\frac{1}{2}, d_1 = \frac{1}{2}$ .

$$\boxed{\begin{array}{l} S_0(x) = -\frac{3x - x^3}{2} \\ S_1(x) = -1 + \frac{3}{2}x - 3x^2 + \frac{1}{2}x^3 \end{array}}$$



9. [5 points] Utilisez les points  $\begin{matrix} x_0 & f_0 & x_1 & f_1 & x_2 & f_2 \\ (1.5, 4.2), (2.5, 6.6), (3.5, 7.3) \end{matrix}$  (et les formules vues en classe) pour estimer les valeurs de la dérivée de la fonction  $f$  en un point  $x$ .

Ici  $h = 1$  donc  $x_0 = 1.5$ ,  $x_1 = 2.5$ ,  $x_2 = 3.5$ . Donc

$$f'_0 \approx p'_2(1.5) = \frac{1}{2(1)} (-3(4.2) + 4(6.6) - (7.3)) = \boxed{3.25}$$

$$f'_1 \approx p'_2(2.5) = \frac{1}{2(1)} (-4.2 + 7.3) = \boxed{1.55}$$

$$f'_2 \approx p'_2(3.5) = \frac{1}{2(1)} (4.2 - 4(6.6) + 3(7.3)) = \boxed{-0.15}$$