

Matrices

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Si una matriz A con coeficientes reales tiene m filas y n columnas entonces escribimos $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$

$$A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

En una matriz A el elemento que está en la fila i y columna j se denota por a_{ij}

$$(A)_{ij} = a_{ij} \begin{cases} a_{11} = 2 \\ a_{12} = -1 \\ a_{21} = 3 \\ a_{22} = 0 \end{cases}$$

$$B = \begin{pmatrix} -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 5 \\ 4 & \pi \end{pmatrix}$$

$$B \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$$

$$b_{12} = \frac{1}{2}$$

$$b_{31} = 4$$

$$b_{21} = 0$$

Una matriz A se dice cuadrada si tiene la misma cantidad de filas que de columnas.

$$C = \begin{pmatrix} -2 & 4 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Diagonal principal

$$D = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Matriz diagonal

Una matriz A se dice nula si todos sus elementos son 0.

$$E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$F = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Matriz triangular inferior

$$G = \begin{pmatrix} -2 & 4 & 1 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Matriz triangular superior

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matriz identidad

Suma

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 5 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & -2 \\ 9 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 4 & 3 \\ 13 & 0 \end{pmatrix}$$

Tengo que sumar matrices
de la misma dimensión

$$A + B = C \quad A, B, C \in \mathbb{R}^{n \times m}$$

$$a_{ij} + b_{ij} = c_{ij}$$

Propiedades

- Asociativa: $(A + B) + C = A + (B + C)$
- Neutro: $A + 0 = 0 + A = A$
- Conmutativa: $A + B = B + A$
- Opuesto: $A + (-A) = 0$

Resta

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 5 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & -2 \\ 9 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -4 & 7 \\ -5 & -6 \end{pmatrix}$$

Producto por un escalar

$$3 \cdot \begin{pmatrix} -2 & 4 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & 12 & 3 \\ 6 & 15 & 0 \\ -3 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

Propiedades

- $a(B + C) = aB + aC$
- $(a + b)C = aC + bC$
- $(ab)C = a(bC)$

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 5 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & -2 \\ 9 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 5 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 12 & -6 \\ 27 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 1 \\ -12 & 11 \\ -23 & -12 \end{pmatrix}$$

$$-2 \left(\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 5 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & -2 \\ 9 & 3 \end{pmatrix} \right) = -2 \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 4 & 3 \\ 13 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -8 & -6 \\ -26 & 0 \end{pmatrix}$$

Producto de matrices

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 4 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

¿ $A \cdot B$?

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 4 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -5 & 5 & 7 \\ 6 & 12 & 12 \\ -4 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 4 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 5 & 7 \\ 6 & 12 & 12 \\ -4 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Para multiplicar dos matrices A y B
necesito que $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ y $B \in \mathbb{R}^{m \times j}$

Propiedades

- $A(B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$
- $A \cdot I_n = I_n \cdot A = A$
- $A(B + C) = AB + AC$
- $(A + B)C = AC + BC$

En general, el producto
de matrices **no** es
conmutativo

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ -5 & 7 \end{pmatrix}$$

\neq

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -5 & 0 \end{pmatrix}$$

Matriz inversa

$$\left. \begin{aligned} \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ \frac{5}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ \frac{5}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &\text{En este caso decimos} \\ &\text{que las matrices} \\ &A = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} \text{ y} \\ &A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ \frac{5}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix} \\ &\text{son } \mathbf{inversas} \end{aligned}$$

Diremos que dos matrices $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ y $A^{-1} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ son **inversas** si se cumple que $A \cdot A^{-1} = I_n$ y $A^{-1} \cdot A = I_n$

- Solo las matrices cuadradas pueden tener inversa.
- No todas las matrices cuadradas tienen inversa.

Propiedades

- Si existe una matriz inversa, es única
- $(A \cdot B)^{-1} = B^{-1} \cdot A^{-1}$
- $(A_1 \cdot A_2 \dots A_n)^{-1} = A_n^{-1} \dots A_2^{-1} \cdot A_1^{-1}$

Matriz transpuesta

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 5 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 4 \\ 1 & 5 & -3 \end{pmatrix}$$

Si $A \in \mathbb{R}^{n \times m}$ entonces su **transpuesta** $A^T \in \mathbb{R}^{m \times n}$ es la matriz tal que $a_{ij}^T = a_{ji}$

Propiedades

- $(A^T)^T = A$
- $(A + B)^T = A^T + B^T$
- $(c \cdot A)^T = c \cdot A^T$
- $(A \cdot B)^T = B^T \cdot A^T$

Ejemplo

Hallar la matriz $X \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$ que cumpla $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} - X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} - X = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} - X = \begin{pmatrix} -1 & -3 & 3 \\ 1 & 9 & -4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & -3 & 3 \\ 1 & 9 & -4 \end{pmatrix} = X$$

$$\begin{pmatrix} 4 & 4 & -3 \\ -2 & -7 & 5 \end{pmatrix} = X$$

Ejemplo

Si A es una matriz cuadrada que cumple que $A^3 = -4A - I$, hallar A^{-1}

$$A^3 = -4A - I$$

$$I = -4A - A^3$$

$$A^{-1} \cdot I = A^{-1}(-4A - A^3)$$

$$A^{-1} = -4 \cdot A^{-1}A - A^{-1}A^3$$

$$A^{-1} = -4I - A^2$$

Ejercicio 13. Sean A y B dos matrices de 3×3 , decir si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. JUSTIFICAR!

1. $(A + I) \cdot (A - I) = A^2 - I.$

Es verdadero, pues: $(A + I) \cdot (A - I) = A^2 + IA - AI - I^2 = A^2 + A - A - I^2 = A^2 - I$

2. $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2.$

Es falso, porque el producto no es conmutativo: $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$

3. $AB = AC \Rightarrow B = C.$

4. $AB = 0 \Rightarrow A = 0 \text{ o } B = 0.$

Es falso, porque $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, pero $\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

Es falso, porque $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, pero los factores no son iguales a la matriz nula.

Ejercicio 14. Hallar, en caso de existir, la matriz X que verifique;

$$1. \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot X + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$2. \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot X + \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} = X.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} a + 2c & b + 2d \\ 3a + 4c & 3b + 4d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a + 2c = -1 \\ 3a + 4c = 0 \\ b + 2d = 0 \\ 3b + 4d = -3 \end{cases} \quad \begin{cases} a + 2c = -1 & (1) \\ a = -\frac{4c}{3} & (2) \\ b = -2d & (3) \\ 3b + 4d = -3 & (4) \end{cases}$$

Si reemplazamos (2) en (1) y (3) en (4), obtenemos:

$$-\frac{4}{3}c + 2c = -1$$

$$\frac{2}{3}c = -1$$

$$c = -\frac{3}{2}$$

$$a = 2$$

$$-6d + 4d = -3$$

$$-2d = -3$$

$$d = \frac{3}{2}$$

$$b = -3$$

$$\text{Por lo tanto, } X = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -\frac{3}{2} & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

$$2. \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot X + \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} = X.$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 9 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 9 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \longrightarrow \left(\begin{pmatrix} 1 & 9 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right) \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = -\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 9 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ -5 & -6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 9c = -2 \\ 2c = -5 \\ 9d = -3 \\ 2d = -6 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} c = -\frac{2}{9} \\ c = -\frac{5}{2} \\ d = -\frac{1}{3} \\ d = -3 \end{cases}$$

Como los coeficientes de la matriz no pueden tomar dos valores distintos, en este caso esta ecuación matricial no tiene solución.