

Вариант	Номер задачи	
3	1a)	3a)
4	1b)	3b)
5	1c)	3c)
6	1d)	3d)
7	1e)	3e)
8	2a)	3a)
9	2b)	3b)
10	2c)	3c)
11	2d)	3d)
12	2e)	3e)
13	1a)	3a)
14	1c)	3b)
15	2a)	3c)
16	2c)	3d)
17	2b)	3e)

Задача 1. Рассматривается система ОДУ первого порядка, имеющая периодическое решение с периодом T :

$$\begin{cases} \alpha'(t) = \theta(t) \\ \theta'(t) = -\sin \alpha(t), & t \in [0, T], \\ \alpha(0) = \frac{\pi}{2}, \quad \theta(0) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

где $T = 4K(\pi/4)$, $K(\pi/4) \approx 1.854074677301372$, $K(m)$ – эллиптический интеграл первого рода.

- Реализовать предложенный метод численного решения данной системы уравнений.
- Исследовать предложенный метод на устойчивость.
- Экспериментально определить порядок сходимости, исследуя ошибку численного решения $\|\vec{y}(T) - \vec{y}(0)\|$, сравнить с порядком аппроксимации метода.
- Построить фазовую диаграмму решения.

Задача 2. Рассматривается система ОДУ первого порядка, имеющая периодическое решение с периодом T :

$$\begin{cases} u'(t) = v(t) \\ v'(t) = -u^3(t), & t \in [0, T], \\ u(0) = 1, \quad v(0) = 0 \end{cases} \quad (2)$$

где $T = \sqrt{32\pi} \frac{\Gamma(5/4)}{\Gamma(3/4)} \approx 7.416298709205487$.

- Реализовать предложенный метод численного решения данной системы уравнений.
- Исследовать предложенный метод на устойчивость.
- Экспериментально определить порядок сходимости, исследуя ошибку численного решения $\|\vec{y}(T) - \vec{y}(0)\|$, сравнить с порядком аппроксимации метода.
- Построить графики $u(t), v(t)$

Варианты численных методов для задачи 1, 2:

a) Схема Чехарда (leapfrog) $\frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2\Delta t} = f_i$.

b) Классический метод Рунге-Кутты

0	0	0	0	0
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0	0
$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	0
1	0	0	1	0
	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

c) Явный метод Адамса $y_{i+1} - y_i = \frac{\Delta t}{12} (23f_i - 16f_{i-1} + 5f_{i-2})$.

d) Метод Рунге

0	0	0	0	0
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	0	0
1	0	1	0	0
1	0	0	1	0
	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{3}$	0	$\frac{1}{6}$

e) Метод Хойна

0	0	0	0
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	0
$\frac{2}{3}$	0	$\frac{2}{3}$	0
	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{3}{4}$

Задача 3. Рассматривается система ОДУ, описывающая реакции фотохимии озона в атмосфере

$$\begin{aligned}\dot{c}_1 &= k_1 c_3 - k_2 c_1, \\ \dot{c}_2 &= k_1 c_3 - k_3 c_2 c_4, \\ \dot{c}_3 &= k_3 c_2 c_4 - k_1 c_3, \\ \dot{c}_4 &= k_2 c_1 - k_3 c_2 c_4,\end{aligned}$$

где $\vec{c} = (c_1, c_2, c_3, c_4)^T$ – концентрации (кол-во молекул вещества в кубическом сантиметре) O , NO , NO_2 и O_3 . В начальный момент времени $t = 0$ концентрации веществ $\vec{c} = (0, 0, 5 \times 10^{11}, 8 \times 10^{11})^T$. Выражения для коэффициентов реакций:

$$k_1 = 10^{-2} \max[0, \sin(2\pi/t_d)] s^{-1},$$

$$k_2 = 10^5 s^{-1}, k_3 = 10^{-16} \text{cm}^3 \text{molecule}^{-1} s^{-1},$$

$$t_d = 24 \cdot 60 \cdot 60 \text{ s}.$$

Найти численное решение данной задачи для промежутка времени $t = [0, 2t_d]$, используя предложенный численный метод. Построить графики численного решения. Определить экспериментально максимальный шаг по времени, при котором явный метод Эйлера для данной задачи устойчив. Сравнить с шагом по времени, который позволяет использовать предложенный метод численного решения.

Варианты численных методов для задачи 3:

- a) Неявный метод Эйлера.
- b) Схема Кранка-Николсон.
- c) Формула дидифференцирования назад 2го порядка
- d) Диагонально-неявный метод Рунге-Кутты с таблицей Бутчера

1	1	0	0
$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	0
1	$-\frac{1}{12}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{3}$
	$-\frac{1}{12}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{3}$

- e) Диагонально-неявный метод Рунге-Кутты с таблицей Бутчера

$1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$	$1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$	0
1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$
	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$