

Eletromagnetismo

André Del Bianco Giuffrida

Lista 3

Ex 4

Uma carga pontual q está localizada a uma distância d com relação a um plano condutor infinito fixado a potencial zero. A referência de potencial está no infinito.


(a) Verifique que este problema real satisfaz as condições necessárias para obter o potencial $V(\vec{r})$ a partir da solução do problema imagem (com uma carga $-q$ a distância $2d$ da primeira): mesma ρ e mesma condição de Dirichlet sobre o contorno S .

(b) Calcule a densidade de carga elétrica σ sobre o plano condutor.

(c) É conveniente especificar condições de contorno de Neumann para este problema?

(d) Calcule a força que o plano exerce sobre a carga q .

(e) Calcule a energia eletrostática do sistema (carga e plano).




(a)

No problema imagem podemos mostrar que $V(\vec{r})$ no plano a distância d das duas cargas possui potencial 0 devido a simetria do problema.

Resolvendo o problema real através do método das cargas imagens, podemos resolver para q' e d' a seguinte expressão:

$$V = 0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{|\vec{r} - \vec{R}|} + \frac{q'}{|\vec{r} - \vec{R}'|} \right)$$

Para a seguinte configuração:



Pelo teorema da unicidade podemos ver que se, $q = -q'$ e $R = R'$ a expressão para o potencial é validada, e assim podemos obter o potencial do problema real através do potencial do problema imagem avaliado no semi-espço do lado em que a carga real é situado, e o potencial do lado oposto é nulo, pois não existe carga e o potencial é contínuo, equalizando isso obtemos:

$$V(\vec{r}) = 0 \quad \text{para } x < 0$$

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{|\vec{r} - d\hat{x}|} - \frac{q}{|\vec{r} + d\hat{x}|} \right)$$




Figure 1: Potencial $V(\vec{r})$ no plano xy para a carga em $(1,0,0)$ e o plano a potencial nulo em $(0,y,z)$

(b)

Para obter-mos σ podemos partir do potencial já encontrado e calcular o campo elétrico \vec{E} .

$$\vec{E} = -\nabla V(\vec{r}) \quad \text{e pelas condições de contorno} \quad (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) \cdot \hat{n} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

$$4\pi\epsilon_0 \vec{E}_1 = -\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{q}{|\vec{r} - d\hat{x}|} - \frac{q}{|\vec{r} + d\hat{x}|} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{q}{|\vec{r} - d\hat{x}|} - \frac{q}{|\vec{r} + d\hat{x}|} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{q}{|\vec{r} - d\hat{x}|} - \frac{q}{|\vec{r} + d\hat{x}|} \right) =$$

$$\vec{E}_1 = \frac{-1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q(x+d)\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}}{((x+d)^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right)$$

$$\vec{E}_2 = 0 \quad \text{pois o potencial é constante e nulo em } x < 0$$

$$\vec{E} \cdot \hat{x} = \frac{-1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q(x+d)}{((x+d)^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right) \Big|_{x=0}$$

Assim obtemos σ no plano $x = 0$:

$$\sigma = -\frac{1}{4\pi} \left(\frac{q d}{(d + y^2 + z^2)^{3/2}} \right)$$




Figure 2: Densidade superficial de carga σ no plano $x = 0$ em frente a carga

(c)

As Condições de Contorno de Neumann, implicam em fornecer a variação na direção normal do potencial na superfície ao invés de fornecer $V(r)$ no contorno explicitamente, como fizemos no início (Condição de Contorno de Dirichlet).


$$\left. \frac{\partial V(\vec{r})}{\partial n} \right|_s \rightarrow \text{é dado!} \rightarrow \text{Condição de Contorno de Neumann}$$

$$V(\vec{r}) \Big|_s \rightarrow \text{é dado!} \rightarrow \text{Condição de Contorno de Dirichlet}$$


(Pensar melhor sobre isso!)

(d) A força que o plano exerce sobre a carga, pode ser feita integrando a densidade de carga, porém podemos calcular através do problema imagem, pois a força que o plano exerce sobre a carga é a força que atua na carga, e é a mesma para o problema imagem, como no esquema:

Problema Real



Problema Imagem



É necessário que as forças sejam as mesmas, os dois problemas são idênticos para $x > 0$, ou seja, a força que atua na carga q é a mesma que atua na carga q' no problema imagem e é a mesma no problema real que atua sobre o plano.

A força de Coulomb para as duas cargas é \vec{F} e é a mesma força para a carga em frente ao plano.


$$\vec{F} = -\frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 d^2} \hat{x}$$

(e)

Para calcular a energia eletrostática armazenada no sistema podemos partir da definição de trabalho W e assim podemos encontrar a variação da energia potencial elétrica calculando o trabalho para trazer a carga q do infinito até a distância d do plano.

$$W_{ab} = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{l} = \Delta U_{ab}$$

No problema real a densidade de carga no plano vai variar com a distância da carga ao plano, porém é muito mais fácil olhar-mos como varia a força no problema imagem, assim podemos concluir que é necessário trazer a carga imagem ao mesmo tempo que a carga real para que a condição de contorno seja satisfeita ($V = 0$ em $x = 0$), assim podemos calcular a força na carga q a distância $2x$ da carga $-q$.



Fazendo a integral temos:

$$W = \int_{\infty}^d \frac{-q^2}{16\pi\epsilon_0 x^2} dx = \frac{q^2}{16\pi\epsilon_0} \int_d^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$$

$$W = \frac{-q^2}{16\pi\epsilon_0 d}$$