
(α) Ακρίβεια έναντι κόστους, $n = 100$
μέσο $\rho$ Spearman
χρόνος (ms)
MC-1000
MC-200
βαθμωτό μαντείο
κανόνας + $\alpha = 0.9$ σε $P$
κανόνας + $\Gamma$ σε $P$
κανόνας + εξομάλ. AP
κανόνας
AP($\eta = 1$)
MC-50
KNZ MP
(β) Ακρίβεια έναντι κόστους, $n = 900$
μέσο $\rho$ Spearman
χρόνος (ms)
MC-1000
κανόνας + $\alpha = 0.9$ σε $P$
βαθμωτό μαντείο
MC-200
κανόνας + $\Gamma$ σε $P$
κανόνας + εξομάλ. AP
κανόνας
AP($\eta = 1$)
MC-50
διαχύσεις EW
συνδυασμός κανόνα + ακατέργ. $P$
KNZ MP
Monte Carlo κατά δέσμες
(γ) Χρόνος έναντι μεγέθους
χρόνος (ms)
πλήθος κορυφών $n$
συνδυασμός κανόνα + ακατέργ. $P$
MC-50
MC-200
MC-1000
(δ) Συνδυασμός έναντι Monte Carlo ίσου κόστους
$\rho_{\text{συνδ}} - \rho_{\text{MC}}$ σε ίσο κόστος
πλήθος κορυφών $n$
ER
BA
πλέγμα
WS