
αναφορές
με τον αναλογικό νόμο
χωρίς τον νόμο (έλεγχοι)
(α) Μέσο ρ ανά σύνολο
έλεγχος (n = 100)
πραγματικά
n = 900
αρχικές κατανομές
βαθμονομ. κανόνας [4]
AP(η = 1)
κανόνας + εξομάλ. AP
κανόνας + Γ σε P
νόμος Γ → μέση τιμή
νόμος Γ → μετάθεση
κανόνας + α = 0.9 σε P
βαθμωτό μαντείο
μαντείο ανά κόμβο
0.844
0.832
0.840
0.895
0.898
0.871
0.901
0.904
0.937
0.840
0.825
0.834
0.889
0.882
0.869
0.901
0.897
0.950
0.832
0.827
0.828
0.873
0.873
0.847
0.886
0.894
0.927
0.857
0.818
0.850
0.891
0.889
0.876
0.902
0.900
0.957
0.8
0.9
1.0
(β) Νόμος ανά κόμβο μείον το δίδυμο μέσης τιμής
κανόνας + Γ σε P (K = 5)
κανόνας + Α σε P (K = 1)
κανόνας + Γ σε P (τάξεις)
Εκδοχή (β) ως έχει (Β)
Γ αυτόνομη (EP)
Β αυτόνομη (EP)
Α αυτόνομη (P)
Β αυτόνομη (ώθηση)
Γ αυτόνομη (P)
−0.12
−0.11
−0.11
−0.25
−0.23
−0.11
έλεγχος (n = 100)
πραγματικά
n = 900
−0.10
−0.08
−0.06
−0.04
−0.02
0.00
0.02
0.04
Δρ (νόμος − δίδυμο), 95% ΔΕ