


(α) αλήθεια NCD (κύρια), r = κανόνας Σταδίου 1
64 γράφοι βαθμονόμησης, 1792 στιγμιότυπα
βέλτιστη απόσβεση α*
h στο r του Σταδίου 1
(β) ίδια σημεία· οι γκρι γραμμές ενώνουν τη σειρά διαταραχών κάθε γράφου
συσχ.(h, α*): συνολική -0.04
εντός γράφων -0.30
μεταξύ μέσων γράφων +0.29
h στο r του Σταδίου 1
Πείρ. A: αραίωση
Πείρ. B: νέες σελίδες
αποκομμένος γραμμικός, ET: α = clip(0.803 -0.021 h_rule, 0.40, 0.99)
αποκομμένος γραμμικός, βέλτ. ως προς τ: α = clip(0.810 -0.000 h_rule, 0.40, 0.99)
ισοτονικός: ισοτονική κλιμακωτή συνάρτηση του h_rule
καλύτερη σταθερά: α = 0.810
α0 = 0.85 (Στάδιο 1)
α = 0.95 (πειράματα [NG13])
μέση τιμή κάθε γράφου


(γ) αλήθεια ανεξάρτητη από α TOT: TotalRank = RAPr Beta(1,1)
r = κανόνας Σταδίου 1
βέλτιστη απόσβεση α*
h = 1/n Σ_v |1 − Σ_in(v)| στο r του Σταδίου 1
(δ) αλήθεια ανεξάρτητη από α Q: λανθάνουσα ποιότητα q (χωρίς περίπατο)
r = κανόνας Σταδίου 1
h = 1/n Σ_v |1 − Σ_in(v)| στο r του Σταδίου 1
Πείρ. A: αραίωση
Πείρ. B: νέες σελίδες
αποκομμένος γραμμικός, ET: α = clip(0.533 -0.099 h_rule, 0.40, 0.99)
αποκομμένος γραμμικός, βέλτ. ως προς τ: α = clip(0.561 -0.129 h_rule, 0.40, 0.99)
ισοτονικός: ισοτονική κλιμακωτή συνάρτηση του h_rule
καλύτερη σταθερά: α = 0.480
α0 = 0.85 (Στάδιο 1)
α = 0.95 (πειράματα [NG13])
Πείρ. A: αραίωση
Πείρ. B: νέες σελίδες
αποκομμένος γραμμικός, ET: α = clip(0.960 +0.013 h_rule, 0.40, 0.99)
αποκομμένος γραμμικός, βέλτ. ως προς τ: α = clip(0.939 +0.093 h_rule, 0.40, 0.99)
ισοτονικός: ισοτονική κλιμακωτή συνάρτηση του h_rule
καλύτερη σταθερά: α = 0.990
α0 = 0.85 (Στάδιο 1)
α = 0.95 (πειράματα [NG13])