Tekrar

➔ Histogramla en kolay görebileceğimiz değer **"moddur"**.

Aritmetik ortalama
Mod
Medyan
} Noktanın yeri sorusuna cevap verebildikleri için konum istatistiği

A	B	C
0	47	50
0	48	50
0	49	50
100	51	50
100	52	50
100	53	50

$\bar{x}_a = M_{Xa}$ (İndisi yazarken kendimiz belirtmeliyiz)

➔ C sınıfı çok homojen

➔ A sınıfında kutuplaşma var

➔ (Verilerde aksi söylenmedikçe hiçbir sıkıntı yok)

(Değişkenlik yoksa evrensel sabit olarak değerlendiririz.)

2r = R = Çap

R * π (3,1415) = Çevre

İnsanlar açısından ölüp ölmeme sabit bir durum (Herkes ölecek). Değişken olan neden biri az biri çok yaşıyor?

➔ Bilim evrendeki değişiklikleri inceleyip entelektüel mantığını bulmaya çalışan alan.

Tekrarın Ardından

➔ Veri setinde ne kadar değişkenlik olduğunu anlamak için büyüklerle küçükler arasındaki farka bakabiliriz. (53 – 47 = 6 puanlık değişkenlik var)

➔ Ranj (max – min) Ne kadar homojen ne kadar heterojen

➔ !!! Ranj sınıf örneği için kolay hesaplanıyor. Ancak ranjı hesaplamak için 2 işlem yapıyoruz. Küçükten büyüğe sırala & Farka bak (Veriler fazlayken 1. ve sonuncu değer ele alınır. Kalan veriler ele alınmaz. Elimizdeki verilerin teke düşmesi bu kısım için önemli bir sıkıntı. Kolay hesaplansa da bize çok fazla bilgi vermez.

E
0
50
50
50
50
100

Exel

➔ Dili ayarlardan değiştirebiliriz. Bu formüller açısından önemli. (İng (,) – Tr (;))

➔ Satır ve sütunları belirterek konuma ulaşabilir bu sayede de matris gibi düşünebiliriz.

➔ Bazen exel tarihleri tamamlayabilir.

ID	Tarih Sınavı Notu
1	100
2	30
3	50
4	40
5	60
6	70
7	70
8	20
9	70
10	30

➔ Formül girmek için hücrenin üstüne gelip eşittir ile başlat.

D2	=(100+30)/2

Dinamik değil.

D2	=(C2+C3)/2

Dinamik.

➔ D2 yi seç ve aşağı doğru sürükle. Bir sağa bir aşağı şeklinde formül adapte edilir.

➔ Sütun ekle de exel formülü korur.

➔ Sabit kalması istenilen dolarlandırılır. (C + C3)/2

➔ Büyük/Küçük harf önemli değil

➔ Parantez kapatılmasa da çalışır. Ancak iç içe parantezse bozulur.

➔ Ortalama: Sınıfı temsil eden idealize olmuş değer.

➔ İstediğimiz bir sayıyı çıkartarak merkezileştirme yapabiliriz. (Herkesin skorunu ortalamaya göre merkezileştirebiliriz.

➔ Ortalama öyle bir sayı ki o sayıdan diğer tüm sayıları çıkartıp topladığımızda sıfır eder.

➔ Ortalama mutlak sapma yaklaşık değişkenliği gösterir.

ID	Tarih sınav notları	Mutlak Sapma Skoru	Ortalama Mutlak Sapma Skoru
1	100	46	46
2	30	-24	24
3	50	-4	4
4	40	-14	14
5	60	6	6
6	70	16	16
7	70	16	16
8	20	-34	34
9	70	16	16
10	30	-24	24
toplam	540	0	200
ortalama	54	0	20

ID	A SINIFI	Mutlak Sapma Skoru	Ortalama Mutlak Sapma SKORU		B SINIFI	Mutlak Sapma Skoru
1	0		-50	50	47	
2	0		-50	50	48	
3	0		-50	50	49	
4	100		50	50	51	
5	100		50	50	52	
6	100		50	50	53	
Toplam	300		300	300	toplam	300
Ortalama	50		0	50	ortalama	50

Ortalama Mutlak Sapma Skoru		C SINIFI	Mutlak Sapma Skoru	Ortalama Mutlak Sapma Skoru	
-3	3	50		0	0
-2	2	50		0	0
-1	1	50		0	0
1	1	50		0	0
2	2	50		0	0
3	3	50		0	0
0	12	topla	300	0	0
0	2	ortalama	50		