

$$\ddot{q}_{M,i} = \frac{1}{J_{M,i}} \left(-f_{M,i} \dot{q}_{M,i} - \frac{1}{n_i} \tau_i + k_{T,i} u_i \right)$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{J_{M,i}} \\ 0 & -\frac{f_{M,i}}{J_{M,i}} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ k_{T,i} \end{bmatrix} u_i + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{n_i} \end{bmatrix} \tau_i$$

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} q_{M,i} \\ \dot{q}_{M,i} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} J_{M,i} &= J_{eff,i} - \frac{1}{n_i^2} \sup_q D_{ii}(q) = J_{eff,i} - \frac{1}{n_i^2} \widehat{D}(q) \\ \tau_i &= \widehat{D}(q) \ddot{q} + T_L \\ u_i &= n_i [K_{p,i}(q_i^r - q_i) + K_{D,i}(\dot{q}_i^r - \dot{q}_i)] \\ q_{M,i} &= q_i n_i \\ \ddot{q}_{M,i} &= \frac{1}{J_{M,i}} \left(-f_{M,i} \dot{q}_{M,i} - \frac{1}{n_i} \tau_i + k_{T,i} u_i \right) \\ f_{eff} &= f_M + \frac{f_L}{n_i^2} = f_M, \quad f_L = 0 \end{aligned}$$

$$n_i \ddot{q}_i = \frac{1}{J_{eff,i} - \frac{1}{n_i^2} \sup_q D_{ii}(q)} \left\{ -f_{eff} n_i \dot{q}_i - \frac{1}{n_i} (\widehat{D}(q) \ddot{q} + T_L) + k_{T,i} n_i [K_{p,i}(q_i^r - q_i) + K_{D,i}(\dot{q}_i^r - \dot{q}_i)] \right\}$$

Laplace transform

$$q_i \left(\left(n_i J_{eff,i} - \frac{1}{n_i} \sup_q D_{ii}(q) + \frac{1}{n_i} \widehat{D}(q) \right) s^2 + (f_{eff} n_i + k_{T,i} n_i K_{D,i}) s + k_{T,i} n_i K_{p,i} \right) = -\frac{1}{n_i} T_L + k_{T,i} n_i (K_{p,i} + K_{D,i} s) q_i^r$$

If $\sup_q D_{ii}(q) = \widehat{D}(q)$

$$q_i \left(s^2 + \frac{(f_{eff} + k_{T,i} K_{D,i})}{J_{eff,i}} s + \frac{k_{T,i} K_{p,i}}{J_{eff,i}} \right) = \frac{k_{T,i} (K_{p,i} + K_{D,i} s)}{J_{eff,i}} q_i^r - \frac{1}{n_i^2 J_{eff,i}} T_L$$

$$q_i = \frac{1}{N_i(s)} [F_i(s) q_i^r(s) - G_i(s) T_{L,i}(s)]$$

Hvor

$$\begin{aligned} N_i(s) &= s^2 + \frac{(f_{eff} + k_{T,i} K_{D,i})}{J_{eff,i}} s + \frac{k_{T,i} K_{p,i}}{J_{eff,i}} \\ F_i(s) &= \frac{k_{T,i} (K_{p,i} + K_{D,i} s)}{J_{eff,i}} \\ G_i(s) &= \frac{1}{n_i^2 J_{eff,i}} \end{aligned}$$

Problem 11

$$s^2 + \frac{(f_{eff} + k_{T,i} K_{D,i})}{J_{eff,i}} s + \frac{k_{T,i} K_{p,i}}{J_{eff,i}} = s^2 + 2\omega_{n,i} \zeta_i s + \omega_{n,i}^2$$

$$\omega_{n,i}^2 = \frac{k_{T,i} K_{p,i}}{J_{eff,i}} \Leftrightarrow K_{p,i} = \frac{J_{eff,i} \omega_{n,i}^2}{k_{T,i}}$$

$$2\omega_{n,i} \zeta_i = \frac{(f_{eff} + k_{T,i} K_{D,i})}{J_{eff,i}} \Leftrightarrow K_{D,i} = \frac{2\omega_{n,i} \zeta_i J_{eff,i} - f_{eff}}{k_{T,i}} = \frac{2\zeta_i}{\omega_{n,i}} K_{p,i} - \frac{f_{eff}}{K_{T,i}}$$

$$\begin{aligned} J_{M,i} &= J_{eff,i} - \frac{1}{n_i^2} \sup_q D_{ii}(q) = J_{eff,i} - \frac{1}{n_i^2} \widehat{D}(q) \\ \tau_i &= \widehat{D}(q) \ddot{q} + T_L \\ u_i &= n_i \left[K_{p,i}(q_i^r - q_i) + K_{D,i}(\dot{q}_i^r - \dot{q}_i) + K_{I,i} \int (q_i^r - q_i) dt \right] \\ q_{M,i} &= q_i n_i \\ \ddot{q}_{M,i} &= \frac{1}{J_{M,i}} \left(-f_{M,i} \dot{q}_{M,i} - \frac{1}{n_i} \tau_i + k_{T,i} u_i \right) \\ f_{eff} &= f_M + \frac{f_L}{n_i^2} = f_M, \quad f_L = 0 \end{aligned}$$

$$n_i \ddot{q}_i = \frac{1}{J_{eff,i} - \frac{1}{n_i^2} \sup_q D_{ii}(q)} \left\{ -f_{eff} n_i \dot{q}_i - \frac{1}{n_i} (\widehat{D}(q) \ddot{q} + T_L) + k_{T,i} n_i \left[K_{p,i}(q_i^r - q_i) + K_{D,i}(\dot{q}_i^r - \dot{q}_i) + K_{I,i} \int (q_i^r - q_i) dt \right] \right\}$$

$$\ddot{q}_i = \frac{1}{J_{eff,i}} \left\{ -f_{eff} \dot{q}_i - \frac{1}{n_i^2} T_L + k_{T,i} \left[K_{p,i}(q_i^r - q_i) + K_{D,i}(\dot{q}_i^r - \dot{q}_i) + K_{I,i} \int (q_i^r - q_i) dt \right] \right\}$$

Laplace transform

$$n_i q_i s^2 \left(J_{eff,i} - \frac{1}{n_i^2} \sup_q D_{ii}(q) \right) = -f_{eff} n_i q_i s - \frac{1}{n_i} (\widehat{D}(q) q_i s^2 + T_L) + k_{T,i} n_i \left[K_{p,i}(q_i^r - q_i) + K_{D,i}(q_i^r s - q_i s) + K_{I,i} \frac{1}{s} (q_i^r - q_i) \right]$$

$$n_i q_i s^2 \left(J_{eff,i} - \frac{1}{n_i^2} \sup_q D_{ii}(q) \right) + f_{eff} n_i q_i s + \frac{1}{n_i} \widehat{D}(q) q_i s^2 = -\frac{1}{n_i} T_L + k_{T,i} n_i \left[K_{p,i}(q_i^r - q_i) + K_{D,i}(q_i^r s - q_i s) + K_{I,i} \frac{1}{s} (q_i^r - q_i) \right]$$

$$\begin{aligned}
& k_{T,i}n_i \left[K_{p,i}(q_i^r - q_i) + K_{D,i}(q_i^r s - q_i s) + K_{I,i} \frac{1}{s} (q_i^r - q_i) \right] = k_{T,i}n_i K_{p,i}q_i^r - k_{T,i}n_i K_{p,i}q_i + k_{T,i}n_i K_{D,i}q_i^r s - k_{T,i}n_i K_{D,i}q_i s + k_{T,i}n_i K_{I,i}q_i^r \frac{1}{s} - k_{T,i}n_i K_{I,i}q_i \frac{1}{s} \\
& = k_{T,i}n_i \left(K_{p,i} + K_{D,i}s + K_{I,i} \frac{1}{s} \right) q_i^r - k_{T,i}n_i \left(K_{p,i} + K_{D,i}s + K_{I,i} \frac{1}{s} \right) q_i
\end{aligned}$$

$$q_i \left\{ s^2 \left(n_i J_{eff,i} - \frac{1}{n_i} \sup_q D_{ii}(q) + \frac{1}{n_i} \widehat{D}(q) \right) + s(f_{eff}n_i + k_{T,i}n_i K_{D,i}) + k_{T,i}n_i K_{p,i} + k_{T,i}n_i K_{I,i} \frac{1}{s} \right\} = -\frac{1}{n_i} T_L + k_{T,i}n_i \left(K_{p,i} + K_{D,i}s + K_{I,i} \frac{1}{s} \right) q_i^r$$

$$\text{If } \sup_q D_{ii}(q) = \widehat{D}(q)$$

$$q_i \left\{ s^2 + s \frac{(f_{eff} + k_{T,i}K_{D,i})}{J_{eff,i}} + \frac{k_{T,i}K_{p,i}}{J_{eff,i}} + \frac{k_{T,i}K_{I,i}}{J_{eff,i}} \frac{1}{s} \right\} = \frac{k_{T,i}}{J_{eff,i}} \left(K_{p,i} + K_{D,i}s + K_{I,i} \frac{1}{s} \right) q_i^r - \frac{1}{n_i^2 J_{eff,i}} T_L$$

$$q_i \{ J_{eff,i} s^3 + s^2(f_{eff} + k_{T,i}K_{D,i}) + k_{T,i}K_{p,i}s + k_{T,i}K_{I,i} \} = k_{T,i} (K_{p,i}s + K_{D,i}s^2 + K_{I,i}) q_i^r - \frac{s}{n_i^2} T_L$$

$$q_i = \frac{1}{N_i(s)} [F_i(s)q_i^r(s) - G_i(s)T_{L,i}(s)]$$

Hvor

$$N_i(s) = J_{eff,i}s^3 + s^2(f_{eff} + k_{T,i}K_{D,i}) + k_{T,i}K_{p,i}s + k_{T,i}K_{I,i}$$

$$F_i(s) = k_{T,i}(K_{p,i}s + K_{D,i}s^2 + K_{I,i})$$

$$G_i(s) = \frac{s}{n_i^2}$$

Problem 15

$$J_{eff,i}s^3 + s^2(f_{eff} + k_{T,i}K_{D,i}) + k_{T,i}K_{p,i}s + k_{T,i}K_{I,i} = (s^2 + 2\omega_{n,i}\zeta_i s + \omega_{n,i}^2)(1 + \tau_i' s) = s^2 + 2\omega_{n,i}\zeta_i s + \omega_{n,i}^2 + \tau_i' s^3 + 2\omega_{n,i}\zeta_i \tau_i' s^2 + \omega_{n,i}^2 \tau_i' s$$

$$J_{eff,i}s^3 + s^2(f_{eff} + k_{T,i}K_{D,i}) + k_{T,i}K_{p,i}s + k_{T,i}K_{I,i} = \tau_i' s^3 + (2\omega_{n,i}\zeta_i \tau_i' + 1)s^2 + (\omega_{n,i}^2 \tau_i' + 2\omega_{n,i}\zeta_i)s + \omega_{n,i}^2$$

Then we have

$$\tau_i' = |J_{eff,i}|$$

$$2\omega_{n,i}\zeta_i \tau_i' + 1 = f_{eff} + k_{T,i}K_{D,i} \quad \Leftrightarrow \quad K_{D,i} = \frac{2\omega_{n,i}\zeta_i \tau_i' + 1 - f_{eff}}{k_{T,i}}$$

$$\omega_{n,i}^2 \tau_i' + 2\omega_{n,i}\zeta_i = k_{T,i}K_{p,i} \quad \Leftrightarrow \quad K_{p,i} = \frac{\omega_{n,i}^2 \tau_i' + 2\omega_{n,i}\zeta_i}{k_{T,i}}$$

$$\omega_{n,i}^2 = k_{T,i}K_{I,i} \quad \Leftrightarrow \quad K_{I,i} = \frac{\omega_{n,i}^2}{k_{T,i}}$$