

Tabla comparativa: Angle · Morris · Okeson

Las tres hablan de “clases” o de oclusión, pero miden cosas distintas. Confundirlas es uno de los errores más frecuentes en exámenes y en clínica.

	Angle (Clases I–II–III)	Morris (Clases I–V)	Okeson (criterios funcionales)
Qué describe	Relación anteroposterior de los primeros molares permanentes	Dirección en que un obstáculo desvía la mandíbula al cerrar	Si la oclusión es biomecánicamente tolerable (daño vs adaptación)
Tipo	Morfológica	Funcional (desviación)	Funcional + biológica
Clases / categorías	I (normal), II div.1, II div.2, III	I protrusiva, II retrusiva, III vertical ↑, IV latero-protrusiva, V vertical ↓	Óptima / no óptima según contactos, guías e interferencias + presencia de daño
Referencia anatómica	1.er molar (cúspide MV sup. / surco MV inf.)	Obstáculo (prematuridad, cruzada, supraclusión, pérdida posterior...)	RC, MIC, guía anterior, lado de trabajo y de balance
¿La usa Okeson?	La menciona como clasificación ortodóncica clásica; no es su criterio de tratamiento	No. Okeson no clasifica así las relaciones patológicas	Sí: es el marco de diagnóstico y tratamiento del libro
Ejemplo de confusión	Clase III Angle = mandíbula adelantada (molar)	Clase I Morris también puede parecer mandíbula adelantada (por prematuridad)	Da igual la “clase”: importa si hay daño y si se cumplen los criterios de oclusión óptima

Regla de oro en examen y en clínica:

Si alguien dice “es Clase IV”, pregunta de inmediato: **¿de Angle o de Morris?** Angle solo llega a III. Clase IV y V solo existen en Morris. Y para decidir tratamiento, usa los criterios de Okeson (daño + oclusión funcional óptima).

En Dentipedia: el Tema 6 desarrolla Morris; el Tema 12 (Criterios de oclusión óptima) desarrolla Okeson; la clasificación de Angle está en el glosario y en fotografía clínica.