

De Herstelgids voor mannen 40+

Slaap, eiwit, rust en beweging als basis — supplementen alleen als aanvulling, met realistische verwachtingen en EFSA-kaders waar relevant.

- ▣ Waarom herstel na 40 fundamenteel anders werkt dan op je dertigste
- ▣ De vijf herstelfouten die mannen 40+ het vaakst ondermijnen
- ▣ Een vierwekenprotocol én een concreet weekplan om te volgen
- ▣ Supplementen, EFSA-kaders en praktische doseringen — ná slaap, eiwit en rust

Herstel is niet lui zijn. Het is de investering die maakt dat training werkt, dat je scherp blijft, en dat je lichaam na 40 zijn belofte inlost.

— PerfectSupplement

Inhoudsopgave

- | | |
|----|---|
| 01 | Voor wie deze gids is |
| 02 | Waarom herstel na 40 verandert |
| 03 | De vijf grootste herstelfouten |
| 04 | Vier weken herstel — protocol en weekplan |
| 05 | Supplementen in perspectief |
| 06 | Doseringen en veiligheid |
| 07 | Veelgestelde vragen |

01 Voor wie deze gids is

Je hebt misschien de Leefstijlcheck gedaan en gezien dat **herstel** meespeelt in je scores — maar **je hoeft die check niet te hebben gedaan** om hier iets aan te hebben. De punten hieronder zijn je instaptest.

Herstel is een van de vier leefstijldomeinen die de gratis Leefstijlcheck in kaart brengt. Doe de check op perfectsupplement.nl/intake.

Herken je dit bij jezelf?

- ☐ Je hebt na training meerdere dagen spierpijn of stijfheid
- ☐ Je slaapt genoeg uren, maar wordt niet uitgerust wakker
- ☐ Je traint door, maar wordt niet sterker — of word juist sneller moe
- ☐ Je gebruikt het weekend om 'bij te slapen', maar het voelt niet als herstel
- ☐ Je lichaam voelt langer nodig te hebben voor hetzelfde werk als vroeger

Drie of meer punten? Dan sluit deze gids bij je aan.

02 Waarom herstel na 40 verandert

Na je 40e merk je dat je lichaam langer nodig heeft om te herstellen van dezelfde belasting. Dat is geen kwakkel — het is biologie. Snap je wat er schuift, dan kun je gericht kiezen wat je wel aanpast.

Testosteron en groeihormoon dalen geleidelijk

Groeihormoon speelt een centrale rol in weefselherstel, vetmetabolisme en spiermassa. Onderzoek laat zien dat de pulsatiele afgifte van GH met de leeftijd afneemt ¹. Testosteron — dat een rol speelt bij spiereiwietsynthese en herstelcapaciteit — daalt bij mannen gemiddeld met ongeveer 1–2% per jaar na het 30e levensjaar, al verschilt dat sterk per individu ². In de praktijk voelt dat als langere spierpijn, trager herstel en minder uitgerust wakker worden.

Laaggradige ontsteking neemt toe

Naarmate je ouder wordt, stijgt het basisoniveau van ontstekingsmarkers zoals IL-6 en CRP licht — wel eens **inflammaging** genoemd ³. Dat betekent niet dat je ziek bent, maar wel dat je lichaam achtergrondruis heeft die herstel bemoeilijkt. Voeding, slaap en beweging zijn de eerste knoppen om aan te draaien — vóór supplementen.

Spiereiwitaanmaak reageert trager

De anabole respons — hoe sterk spieren reageren op eiwit en training — kan met de leeftijd minder efficiënt worden. Oudere volwassenen hebben vaak relatief meer eiwit per maaltijd nodig om dezelfde mate van spiereiwietsynthese te bereiken als jongere mensen ⁴. Reden om eiwit en timing serieuzer te nemen dan op je dertigste.

Slaap en herstel versterken elkaar

Veel weefselherstel en hormoonafgifte gebeurt tijdens diepe slaap. Als die fase — die met de jaren relatief korter kan worden — inboet, heeft dat direct gevolgen voor je herstelcapaciteit ¹. Herstel verbeteren zonder slaap aan te pakken is zelden effectief. Zie ook het slaaphema via perfectsupplement.nl/thema/slaap.

Bronnen

¹ Veldhuis JD et al. Alterations in growth hormone secretory dynamics in healthy elderly men. J Clin Endocrinol Metab. 1995;80(12):3459. PMID: 8530591

² Harman SM et al. Longitudinal effects of aging on serum total and free testosterone levels in healthy men. J Clin Endocrinol Metab. 2001;86(2):724. PMID: 11158037

³ Franceschi C et al. Inflammaging and anti-inflammaging: a systemic perspective on aging and longevity. Ann N Y Acad Sci. 2007;908:244. Zie ook bespreking in Mech Ageing Dev. 2007;128(1):92. PMID: 17116321

⁴ Moore DR et al. Protein Requirements: Methodological Issues. Am J Clin Nutr. 2015;101(6):1281S. PMID: 25926519

03 De vijf grootste herstelfouten

Veel mannen van midden veertig herkennen dezelfde valkuilen — niet omdat ze lui zijn, maar omdat wat op hun dertigste nog werkte, nu harder tegenaan tikt.

Fout 1: te weinig slaap, te veel training

Herstel gebeurt niet tijdens de training — vooral tijdens slaap. Wie structureel te weinig slaapt en toch blijft trainen, hoopt een tekort op. Meer trainen lost dat niet op⁵. Plan rust even bewust als je trainingsschema.

Fout 2: te weinig eiwit

Voor actieve mannen wordt in reviews vaak rond **1,6–2,2 g eiwit per kg lichaamsgewicht per dag** geadviseerd⁶. Na je 40e ligt de ondergrens eerder bij 1,6 g/kg dan bij 0,8 g/kg. Denk aan het bord: eieren, vis, vlees, kwark, peulvruchten — niet alleen poeder.

Fout 3: geen rustige dag tussen zware sessies

Twee keer kracht plus twee keer lichte cardio past voor veel mannen 40+ beter dan vijf zware dagen. Je zenuwstelsel herstelt soms trager dan spieren laten merken⁵. Een lichte wandeling of mobiliteit is actief herstel, geen 'verloren' dag.

Fout 4: alcohol vlak na training

Alcohol kan de spiereiwitsynthese na training remmen — ook bij matige hoeveelheden in gecontroleerde opstellingen⁷. Nooit drinken hoeft niet, maar direct na trainen is het slechtst getimed moment voor herstel.

Fout 5: supplementen stapelen zonder basis

Creatine, omega-3 en magnesium kunnen een rol spelen — maar niet als slaap, eiwit, rustdagen en stress nog niet op orde zijn. Zie ook perfectsupplement.nl/thema/stress en perfectsupplement.nl/thema/energie als die hoeken meespelen.

Bronnen

⁵ Meeusen R et al. Prevention, diagnosis and treatment of the overtraining syndrome: joint consensus statement. Eur J Sport Sci. 2013;13(1):1. PMID: 23235941

⁶ Morton RW et al. A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults. Br J Sports Med. 2018;52(6):376. PMID: 28698222

⁷ Parr EB et al. Alcohol ingestion impairs muscle protein synthesis following acute exercise in humans. PLoS One. 2014;9(2):e88384. PMC3914791

04 Vier weken herstel — protocol en weekplan

Je bouwt stap voor stap op — je hoeft niet perfect te zijn. Kies een paar vaste gewoontes die je wél volhoudt.

Week 1–2: basis

- Vaste slaaptijden (ook weekend) — je herstel-fundament
- Eiwit bij elke maaltijd — streef naar $\pm 1,6$ g/kg/dag (zie ook hoofdstuk 3)
- Plan bewust 1–2 rustdagen per week zonder zware training
- Beperk alcohol rondom zware sessies

Niet doen in fase 1

- Geen extra trainingsdag toevoegen omdat je 'even energie voelt'
- Geen supplementenstapel starten vóór dit basisplaatje

Week 3–4: verdieping

- Actief herstel: mobiliteit, foam rollen of wandeling na zware training
- Log een week je eiwit (app) als je twijfelt of je het haalt
- Overweeg magnesiumglycinaat 's avonds (dosering: hoofdstuk 6)
- Daglicht binnen ± 30 minuten na opstaan — ondersteunt je ritme

Niet doen in fase 2

- Geen 'compensatieweek' met dubbel trainenvolume
- Geen nieuwe supplementen stapelen zonder dat week 1–2 voelt alsof die klopt

Dag 28: één minuut meten

Noteer kort: ochtendfrisheid (1–10), herstel na training, energie overdag. Herhaal daarna de Leefstijlcheck om trend te zien.

Magnesium vergelijken

Overweeg vanaf week 3 magnesiumglycinaat als onderdeel van je avondroutine. Onafhankelijke vergelijking: perfectsupplement.nl/beste-magnesium.

Week-voor-week overzicht

Week 1 — quick wins

Vaste slaaptijden, eiwit per maaltijd (doel 1,6 g/kg/dag).

Twee bewuste rustdagen, geen alcohol rondom training.

Week 2–3 — ritme

Rustige wandeling na het avondeten.

Magnesiumglycinaat voor het slapen (zie hoofdstuk 6).

Daglicht kort na opstaan; foam rollen of mobiliteit na zware sessies.

Week 4 — meten en kiezen

Mini-hersteldagboek: frisheid, herstel, energie.

Optioneel: omega-3 als je structureel weinig vis eet — eerst vis/voeding, dan pas pil.

Evalueer supplementen: wat hielp, wat was ruis?

Herhaal de Leefstijlcheck op perfectsupplement.nl/intake.

05 Supplementen in perspectief

Slaap, eiwit en rust eerst. Hieronder staan middelen die vaak genoemd worden — met EFSA-claims waar die bestaan, en voorzichtige formulering waar dat niet zo is.

Magnesium

Magnesium draagt bij aan normale spierfunctie en kan bijdragen aan vermindering van vermoeidheid — **EFSA onder voorwaarden**⁸. Veel mensen kiezen glycinaat of bisglycinaat vanwege verdragen en gebruik rond slapen.

Vorm	Opname / verdragen	Herstel-context
Glycinaat / bisglycinaat	Meestal goed verdragen	Eerste keuze rond slaap/herstel
Citraat	Redelijke opname	Soms gekozen om andere redenen
Malaat	Over het algemeen goed verdragen	Vaak gekoppeld aan energiemetabolisme
Oxide	Minder goed opgenomen	Geen eerste keuze voor doelgericht herstel

Producten vergelijken: perfectsupplement.nl/beste-magnesium.

Omega-3 (EPA/DHA)

EPA en DHA hebben onder voorwaarden EU-claims voor o.a. hart en (voor DHA) hersenen/gezichtsvermogen. Er zijn **geen** vergelijkbare erkende etiketclaims voor "direct spierherstel" of "ontsteking" — houd verwachtingen daarom nuchter; onderzoek blijft lopen⁹.

Vergelijken op EPA/DHA, versheid (TOTOX) en transparantie: perfectsupplement.nl/beste-omega-3-supplement.

Vitamine D

Vitamine D draagt o.a. bij aan normale spierfunctie en immuunsysteem — **EFSA onder voorwaarden**¹⁰. Laat 25(OH)D desnoods meten voordat je structureel suppleert.

Zink

Zink draagt bij aan normale eiwitsynthese en een werkend immuunsysteem — **EFSA onder voorwaarden**¹¹. Tekort komt voor bij intensief trainen of weinig dierlijk eiwit.

Creatine

Creatine ondersteunt ATP-buffering bij korte, zware inspanning. In de EU bestaat een erkende claim voor **opeenvolgende zeer korte bursts** bij voldoende dagdosis — **geen** brede garantie op algemeen herstel op kantoor; onderzoek blijft relevant voor krachtsporters¹².

Eiwitpoeder

Eiwitpoeder is geconcentreerde voeding — whey, caseïne, isolaat of plantaardig kan helpen als je via maaltijden onder je doel blijft. Na 40+ is de behoefte eerder hoger dan lager ⁶. EFSA erkent dat eiwit bijdraagt aan instandhouding van spiermassa (onder productvoorwaarden).

Whey, isolaat en plantaardig: perfectsupplement.nl/beste-eiwitpoeder.

Ashwagandha — alleen als stress het hoofdthema is

Sommige extracten zijn getest in RCT's waarin subjectieve stress soms lager uitkwam vs. placebo ¹³. Als herstel vooral uit overbelasting en stress voortkomt, kan dit een gesprek met je arts waard zijn — geen vervanging voor slaap en workload.

Let op — Ashwagandha (geen EFSA-claim)

Voor **Withania somnifera** gelden in de EU geen goedgekeurde gezondheidsclaims op supplementetiketten; EFSA-dossiers staan veelal on-hold. Wat je leest steunt op literatuur, niet op een officiële claim. Het ministerie van VWS overweegt aanvullende regels; signalen kunnen medio 2026 relevant zijn. Gebruik op eigen risico; bespreek medicatie met je arts.

Extractkwaliteit en withanolide-gehalte: perfectsupplement.nl/beste-ashwagandha.

Stapel niet blind

Begin met één middel. Wacht minimaal twee weken voordat je een tweede toevoegt — zo zie je wat echt bijdroeg.

Bronnen

⁸ EFSA Panel on NDA. Scientific opinion on magnesium health claims. EFSA J. 2009;7(9):1216.

⁹ Smith GI et al. Omega-3 polyunsaturated fatty acids in muscle health. Clin Sci. 2011;121(6):267. PMID: 21501117

¹⁰ EFSA Panel on NDA. Scientific opinion on vitamin D health claims. EFSA J. 2010;8(2):1468.

¹¹ EFSA Panel on NDA. Scientific opinion on zinc health claims. EFSA J. 2009;7(9):1229.

¹² Rawson ES, Volek JS. Effects of creatine supplementation and resistance training on muscle strength and weightlifting performance. J Strength Cond Res. 2003;17(4):822. PMID: 14636102

- ¹³ Chandrasekhar K et al. A prospective, randomized double-blind, placebo-controlled study of safety and efficacy of a high-concentration full-spectrum extract of ashwagandha root in adults. Indian J Psychol Med. 2012;34(3):255. PMID: 23439798

06 Doseringen en veiligheid

Dit zijn geen voorschriften, maar gangbare vensters uit onderzoek en praktijk. **Medicatie, ziekte, zwangerschap of borstvoeding?** Overleg met je huisarts.

Magnesium (glycinaat/bisglycinaat)

- Vaak 200–400 mg **elementair** magnesium per dag — controleer het etiket
- Neem 's avonds 30–60 min voor slapen als dat past bij je routine
- Begin laag bij een gevoelige maag
- Houd ≥ 2 uur tussen magnesium en bepaalde antibiotica (chinolon, tetracycline), schildklierhormoon of bisfosfonaten

Vergelijken: perfectsupplement.nl/beste-magnesium.

Omega-3 (EPA+DHA)

- 250–500 mg EPA+DHA per dag bij een maaltijd is een veelgebruikte ondergrens rond claimcontext
- Hogere doses (1–2 g/dag) komen in studies voor — geen standaard voor iedereen
- Kies een product met duidelijke versheidsindicatie (bijv. TOTOX laag)
- Bloedverdunners: overleg bij hogere doses

Vergelijken: perfectsupplement.nl/beste-omega-3-supplement.

Vitamine D

- Bij afgesproken tekort vaak 1000–2000 IE/dag bij de vetrijkste maaltijd
- Laat 25(OH)D meten voor je lang suppleert
- Chronisch hoge doses kunnen ophopen — niet zomaar structureel >4000 IE/dag zonder arts

Zink

- Vaak 10–25 mg elementair zink per dag bij voeding — minder graag nuchter
- Langdurig >40 mg/dag kan koperopname beknotten; sommige producten voegen koper toe

Creatine

- 3–5 g creatinemonohydraat per dag; gelijkmatige inname volstaat meestal (geen verplichte laadfase)
- Voldoende vocht; bij nierproblematiek altijd overleg

Eiwitpoeder

- 20–30 g eiwit per shake als aanvulling — niet ter vervanging van maaltijden
- Houd het totaal in de buurt van 1,6–2,2 g/kg/dag als je actief traint ⁶

Ashwagandha (extracten)

- In studies vaak 300–600 mg gestandaardiseerd extract per dag, verdeeld over de dag
- Evalueer na 4–6 weken; effect is zelden acuut
- Extra voorzichtig bij schildklier en kalmerende medicatie; stop bij maagklachten en overleg

Vergelijken: perfectsupplement.nl/beste-ashwagandha.

07 Veelgestelde vragen

Hoeveel eiwit heb ik echt nodig?

Voor actieve mannen 40+ wordt 1,6–2,2 g/kg/dag vaak aangehouden ⁶. Voor 85 kg: ruwweg 136–187 g per dag, verdeeld over 3–4 maaltijden.

Kan ik magnesium combineren met creatine?

Ja, ze hebben geen klassieke farmacologische clash. Praktisch: magnesium 's avonds, creatine rond training of bij een maaltijd. Begin liever met één middel en bouw rustig op.

Mijn spierpijn duurt vijf dagen — normaal?

Structureel 5+ dagen pijn bij vergelijkbare training wijst vaak op onvoldoende herstel (slaap, eiwit, volume). Pas dat eerst aan vóór je gaat stapelen.

Werken ijsbaden voor herstel?

Koude-waterimmersie kan kortetermijnpijn dempen, maar mogelijk ook adaptatie na krachttraining beïnvloeden bij frequent gebruik ¹⁴. Als je prestatiegericht traint: spaarzaam inzetten.

Wanneer naar de huisarts?

Bij aanhoudende vermoeidheid ondanks voldoende slaap, onverklaard gewichtsverlies, pijn of herstelklachten die je functioneren ondermijnen: professioneel laten onderzoeken. Laat onder meer vitamine D, zink en ferritine zinvol afwegen — niet zelf 'blog-diagnosticeren'.

Bronnen

⁶ Morton RW et al. Br J Sports Med. 2018;52(6):376. PMID: 28698222 — eiwit en krachttraining.

¹⁴ Roberts LA et al. Post-exercise cold water immersion attenuates acute anabolic signalling. J Physiol. 2015;593(18):4285. PMID: 26174323

Wil je weten waar je staat?

Herstel is één van de vier domeinen in de gratis Leefstijlcheck. In een paar minuten zie je waar je op scoort — en welk profiel bij jou past.

perfectsupplement.nl/intake

Bronnen

- ¹ Veldhuis JD et al. Alterations in growth hormone secretory dynamics in healthy elderly men. *J Clin Endocrinol Metab.* 1995;80(12):3459. PMID: 8530591
- ² Harman SM et al. Longitudinal effects of aging on serum total and free testosterone levels in healthy men. *J Clin Endocrinol Metab.* 2001;86(2):724. PMID: 11158037
- ³ Franceschi C et al. Inflammaging and anti-inflammaging: a systemic perspective on aging and longevity. *Ann N Y Acad Sci.* 2007;908:244. Zie ook bespreking in *Mech Ageing Dev.* 2007;128(1):92. PMID: 17116321
- ⁴ Moore DR et al. Protein Requirements: Methodological Issues. *Am J Clin Nutr.* 2015;101(6):1281S. PMID: 25926519
- ⁵ Meeusen R et al. Prevention, diagnosis and treatment of the overtraining syndrome: joint consensus statement. *Eur J Sport Sci.* 2013;13(1):1. PMID: 23235941
- ⁶ Morton RW et al. A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults. *Br J Sports Med.* 2018;52(6):376. PMID: 28698222
- ⁷ Parr EB et al. Alcohol ingestion impairs muscle protein synthesis following acute exercise in humans. *PLoS One.* 2014;9(2):e88384. PMC3914791
- ⁸ EFSA Panel on NDA. Scientific opinion on magnesium health claims. *EFSA J.* 2009;7(9):1216.
- ⁹ Smith GI et al. Omega-3 polyunsaturated fatty acids in muscle health. *Clin Sci.* 2011;121(6):267. PMID: 21501117
- ¹⁰ EFSA Panel on NDA. Scientific opinion on vitamin D health claims. *EFSA J.* 2010;8(2):1468.
- ¹¹ EFSA Panel on NDA. Scientific opinion on zinc health claims. *EFSA J.* 2009;7(9):1229.
- ¹² Rawson ES, Volek JS. Effects of creatine supplementation and resistance training on muscle strength and weightlifting performance. *J Strength Cond Res.* 2003;17(4):822. PMID: 14636102
- ¹³ Chandrasekhar K et al. A prospective, randomized double-blind, placebo-controlled study of safety and efficacy of a high-concentration full-spectrum extract of ashwagandha root in adults. *Indian J Psychol Med.* 2012;34(3):255. PMID: 23439798
- ¹⁴ Roberts LA et al. Post-exercise cold water immersion attenuates acute anabolic signalling. *J Physiol.* 2015;593(18):4285. PMID: 26174323

Disclaimer

Deze gids is informatief en geen medisch advies. Bij aanhoudende herstelklachten, pijn of vermoeidheid: neem contact op met je huisarts. Supplementen vervangen geen diagnose of behandeling.

© 2026 PerfectSupplement.nl — Onafhankelijk. Onderbouwd. Voor mannen 40+.