

Зміст

1	Метричні простори та інше	3
1.1	Означення метричних просторів	3
1.2	Відкриті та замкнені множини. Збіжні послідовності	4
1.3	Замикання множин. Щільність та сепарабельність	7
1.4	Повнота	9
1.5	Поповнення метричного простору та трошки про ізометрію	12
1.6	Неперервні відображення	14
1.7	Компактність	16
1.8	Теорема Стоуна-Ваєрштраса	19
1.9	Теорема Арцела-Асколі	20
2	Початок функціонального аналізу	21
2.1	Лінійні нормовані простори	21
2.2	Ряди в нормованому просторі	22
2.3	Коротко про топологічні векторні простори	23
2.4	Факторизація напівнорми	24
3	Оператори в нормованих просторах	25
3.1	Обмежені та неперервні лінійні оператори	25
3.2	Деякі гучні теореми	29
3.3	Обернені оператори	31
3.4	Продовження неперервних операторів	33
3.5	Деякі наслідки з теореми Гана-Банаха	36
3.6	Загальний вигляд лінійних неперервних функціоналів у деяких банахових просторах	37
3.6.1	Базис Шаудера	37
3.6.2	Простір, що спряжений до $l_p, 1 < p < \infty$	38
3.6.3	Простір, що спряжений до l_1	39
3.6.4	Простори, що спряжені до l_∞	40
3.6.5	Простір, що спряжений до $L_p, 1 < p < \infty$	40
3.6.6	Простір, що спряжений до $C(K)$	40
3.7	Вкладення нормованих просторів	41
3.8	Про види збіжностей	42
3.9	Про види збіжностей в операторах	44
3.10	Спряжені оператори	45
4	Гілбертові простори	47
4.1	Основні означення	47
4.2	Факторизація квазіскалярного добутку	47
4.3	Ортогональне доповнення	48
4.4	Простір, спряжений до гілбертового	50
4.5	Ортонормовані системи та базиси	50
4.6	Ортогоналізація системи векторів	52
4.7	Коротко про ортонормовану систему векторів довільної потужності	53
4.8	Про форми в гілбертових просторах	53
4.9	Про деякі типи операторів	54
4.9.1	Спряжений оператор (ще раз)	54
4.9.2	Самоспряжений оператор	54
4.9.3	Невід’ємні та напівобмежені оператори	55
4.9.4	Проектор	55
4.9.5	Нормальні оператори	56
4.10	Унітарні та ізометричні оператори	57
4.11	Матричне представлення операторів у гілбертовому просторі	57
4.11.1	Лінійний оператор в сепарабельному просторі	57
4.12	Оператори Гілберта-Шмідта	58

5	Компактні оператори	60
5.1	Спектр та резольвента оператора	60
5.2	Компактні оператори	62
5.3	Властивості компактного оператора	64
5.4	Компактні оператори в сепарабельному гільбертовому просторі	65
5.5	Спектри в компактних операторах	65
5.6	Спектральний радіус оператора	67
5.6.1	Степеневі ряди з операторними коефіцієнтами	67
5.6.2	Спектральний радіус лінійного неперервного оператора	68
5.7	Спектральний розклад для компактних самоспряжених операторів	68
6	Диференційовані відображення	70
6.1	Основні означення	70
6.2	Диференціювання складеної функції	72
6.3	Лінійність операції диференціювання	73
6.4	Похідні від деяких функцій	73
6.5	Функції зі значеннями в добутку	75
6.6	Функції з областю визначення як добуток	75

1 Метричні простори та інше

1.1 Означення метричних просторів

Definition 1.1.1 Нехай X — деяка множина.

Функція $\rho: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ називається **метрикою**, якщо вона задовольняє такі властивості:

- 1) $\forall x, y \in X : \rho(x, y) \geq 0, \quad \rho(x, y) = 0 \iff x = y;$
- 2) $\forall x, y \in X : \rho(x, y) = \rho(y, x);$
- 3) $\forall x, y, z \in X : \rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z).$

Метрика описує відстань між елементами x, y . Пара (X, ρ) з метрикою називається **метричним простором**.

Example 1.1.2 Розглянемо декілька прикладів:

- 1) $X = \mathbb{R}, \quad \rho(x, y) = |x - y|;$
- 2) $X = \mathbb{R}^n$, можна задати дві метрики:
 $\rho_1(\vec{x}, \vec{y}) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}, \quad \rho_2(\vec{x}, \vec{y}) = |x_1 - y_1| + \dots + |x_n - y_n|;$
- 3) $X = C([a, b]), \quad \rho(f, g) = \max_{t \in [a, b]} |f(t) - g(t)|.$

Example 1.1.3 Окремо розгляну даний приклад. Нехай X — будь-яка множина, ми визначимо так звану **дискретну метрику**

$$d(x, y) = \begin{cases} 1, & x \neq y \\ 0, & x = y \end{cases}.$$

Тоді (X, d) задає **дискретний** метричний простір.

Example 1.1.4 Розглянемо $X = \mathbb{N}$ та функцію

$$\rho(m, n) = \begin{cases} 1 + \frac{1}{m+n}, & m \neq n \\ 0, & \text{інакше.} \end{cases}$$

Доведемо, що ρ задає метрику.

- 1) $\rho(m, n) \geq 0$ — це зрозуміло, також $\rho(m, n) = 0 \iff m = n$ за визначенням функції;
- 2) $\rho(n, m) = 1 + \frac{1}{n+m} = 1 + \frac{1}{m+n} = \rho(m, n);$
- 3) Тут ситуація менш приємна, ми хочемо $\rho(m, n) \leq \rho(m, k) + \rho(k, n)$. Спочатку розглянемо випадки, коли m, n, k попарно не рівні. Зауважимо, що справедлива нерівність при $m, n, k \in \mathbb{N}$:

$$\frac{1}{m+n} \leq 1 + \frac{1}{m+k} + \frac{1}{k+n}.$$

Якщо додати до обох частей нерівності 1, то ми отримаємо:

$$\rho(m, n) = 1 + \frac{1}{m+n} \leq 1 + 1 + \frac{1}{m+k} + \frac{1}{k+n} = 1 + \frac{1}{m+k} + 1 + \frac{1}{k+n} = \rho(m, k) + \rho(k, n).$$

Отже, $(\mathbb{N}, \rho)$ задає метричний простір.

Definition 1.1.5 Нехай (X, ρ) — метричний простір.

Пару $(Y, \tilde{\rho})$, де $Y \subset X$, назовемо **метричним підпростором** (X, ρ) , якщо

$$\forall x, y \in Y : \tilde{\rho}(x, y) = \rho(x, y).$$

При цьому метрика $\tilde{\rho}$, кажуть, **індукована в Y метрикою ρ** .

Proposition 1.1.6 Нехай (X, ρ) — метричний простір та $(Y, \tilde{\rho})$ — підпростір. Для функції $\tilde{\rho}$ всі три аксіоми зберігаються. Тобто $(Y, \tilde{\rho})$ залишається метричним простором.

Вправа: довести.

Example 1.1.7 Нехай $X = F([a, b])$ — множину обмежених функцій та

$$\rho(f, g) = \sup_{t \in [a, b]} |f(t) - g(t)|.$$

Тоді в $Y = C([a, b])$ маємо метрику

$$\tilde{\rho}(f, g) = \max_{t \in [a, b]} |f(t) - g(t)| = \sup_{t \in [a, b]} |f(t) - g(t)|.$$

Отже, $C([a, b])$ — метричний підпростір простору $F([a, b])$.

1.2 Відкриті та замкнені множини. Збіжні послідовності

Definition 1.2.1 Нехай (X, ρ) — метричний простір та $a \in X$.

Відкритою кулею радіусом r з центром a називають таку множину:

$$B(a; r) = \{x \in X \mid \rho(a, x) < r\}.$$

Її ще називають r -околом точки a .

Замкнутою кулею радіусом r з центром a називають таку множину:

$$B[a; r] = \{x \in X \mid \rho(a, x) \leq r\}.$$

Example 1.2.2 Розглянемо декілька прикладів:

- 1) $X = \mathbb{R}$, $\rho(x, y) = |x - y|$, $B(a; r) = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - a| < r\} = (a - r, a + r)$;
- 2) $X = \mathbb{R}^2$, $\rho(\vec{x}, \vec{y}) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}$, $B(0; 1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 < 1\}$.

Definition 1.2.3 Нехай (X, ρ) — метричний простір, $A \subset X$ та $a \in A$.

Точка a називається **внутрішньою** для A , якщо

$$\exists \varepsilon > 0 : B(a; \varepsilon) \subset A.$$

Definition 1.2.4 Нехай (X, ρ) — метричний простір та $A \subset X$.

Множина A називається **відкритою**, якщо

кожна точка множини A — внутрішня.

Example 1.2.5 Розглянемо такі приклади:

- 1) Маємо $X = \mathbb{R}$, $\rho(x, y) = |x - y|$ та множину $A = [0, 1)$. Точка $a = \frac{1}{2}$ — внутрішня, бо

$$\exists \varepsilon = \frac{1}{4} : B\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{4}\right) \subset A,$$

тобто $\left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right) \subset [0, 1)$. Водночас точка $a = 0$ — не внутрішня. Отже, A — не відкрита, бо знайшли не внутрішню точку.

- 2) Маємо $X = [0, 1]$, $\rho(x, y) = |x - y|$ та множину $A = [0, 1)$. У цьому випадку точка $a = 0$ уже внутрішня (в попередньому прикладі ми могли ε -околом вийти за межі нуля ліворуч, а тут вже ні). Тут A тепер відкрита.

- 3) Маємо $X = \{0, 1, 2\}$ — підпростір метричного простору $(\mathbb{R}, \rho(x, y) = |x - y|)$. Задамо множину $A = \{0, 1\}$. Тут кожна точка — внутрішня. Отже, A — відкрита.

Definition 1.2.6 Нехай (X, ρ) — метричний простір, $A \subset X$ та $x_0 \in X$.

Точка x_0 називається **граничною** для A , якщо

$$\forall \varepsilon > 0 : (B(x_0; \varepsilon) \setminus \{x_0\}) \cap A \neq \emptyset.$$

Інколи ще множину $B(x_0; \varepsilon) \setminus \{x_0\} \stackrel{\text{позн.}}{=} \overset{\circ}{B}(x_0; \varepsilon)$ називають **проколотим околом точки** x_0 .

Definition 1.2.7 Нехай (X, ρ) — метричний простір та $A \subset X$.

Множина A називається **замкнутою**, якщо

вона містить всі свої граничні точки.

Example 1.2.8 Розглянемо такі приклади:

- 1) Маємо $X = \mathbb{R}$, $\rho(x, y) = |x - y|$ та множину $A = (0, 1)$. Точки $x_0 \in \left\{\frac{1}{2}, 0, 1\right\}$ — граничні. Водночас точка $x_0 = \frac{3}{2}$ — не гранична. Отже, A — не замкнена, бо $x_0 = 1$ хоча й гранична для A , але $x_0 \notin A$.

- 2) Маємо $X = \mathbb{R}$, $\rho(x, y) = |x - y|$. Задамо множину $A = \{0, 1\}$. Тут жодна точка — не гранична. Тим не менш, A — замкнена. Бо нема жодної граничної точки в X для A , щоб порушити означення.

Theorem 1.2.9 Нехай (X, ρ) — метричний простір та $A \subset X$. Тоді

Множина A — відкрита $\iff$ множина A^c — замкнена.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: A — відкрита.

Припустимо, що A^c — не замкнена, тобто $\exists x_0 \in A : x_0$ — гранична для A^c , але $x_0 \notin A^c$. За умовою, оскільки $x_0 \in A$, то x_0 — внутрішня, тобто $\exists \varepsilon > 0 : B(x_0; \varepsilon) \subset A$. Отже, $B(x_0; \varepsilon) \cap A^c = \emptyset$ — суперечність!

$\Leftarrow$ Дано: A^c — замкнена. Тоді вона містить всі граничні точки. Тоді $\forall x_0 \in A : x_0$ — не гранична для A^c , тобто $\exists \varepsilon > 0 : B(x_0; \varepsilon) \cap A^c = \emptyset \implies B(x_0; \varepsilon) \subset A$. Отже, x_0 — внутрішня для A , а тому A — відкрита. ■

Example 1.2.10 Розглянемо дискретний метричний простір (X, d) . Тут всі множини — відкриті.

Нехай $A \subset X$, розглянемо $a \in A$. Тоді існує окіл

$$B\left(a; \frac{1}{2}\right) = \left\{x \in X \mid \rho(x, a) < \frac{1}{2}\right\} = \{a\} \subset A.$$

Це виконується для всіх $a \in A$, тому A — відкрита.

Всі множини відкриті, а тому всі множини також замкнені.

Theorem 1.2.11 Нехай (X, ρ) — метричний простір. Тоді справедливе наступне:

- 1) Нехай $\{U_\alpha \subset X, \alpha \in I\}$ — (довільна) сім'я відкритих множин. Тоді $\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$ — відкрита множина;
- 2) Нехай $\{U_k \subset X, k = \overline{1, n}\}$ — (скінченна) сім'я відкритих множин. Тоді $\bigcap_{k=1}^n U_k$ — відкрита множина;
- 3) $\emptyset, X$ — відкриті множини.

Proof.

Доведемо кожний пункт окремо:

1) Задано множину $U = \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$. Зафіксуємо $a \in U$. Тоді $\exists \alpha_0 : a \in U_{\alpha_0} \implies a$ — внутрішня для $U_{\alpha_0} \implies \exists \varepsilon > 0 : B(a; \varepsilon) \subset U_{\alpha_0} \subset U$. Отже, U — відкрита.

2) Задано множину $U = \bigcap_{k=1}^n U_k$. Зафіксуємо $a \in U$. Тоді $\forall k = \overline{1, n} : a \in U_k \implies a$ — внутрішня для $U_k \implies \exists \varepsilon_k > 0 : B(a; \varepsilon_k) \subset U_k$. Задамо $\varepsilon = \min_{1 \leq k \leq n} \varepsilon_k \implies B(a; \varepsilon) \subset U$. Отже, U — відкрита.

3) $\emptyset$ — відкрита, бо нема внутрішніх точок, тому що там порожньо. Також X — відкрита, оскільки для $a \in X$, який б $\varepsilon > 0$ не обрав, $B(a; \varepsilon) \subset X$.

Всі твердження доведені. ■

Remark 1.2.12 Дана теорема є однією з мотивацій створити розділ математики, що називається "топологія". Там вивчаються простори та набір відкритих і замкнених множин, не маючи прив'язки до відстані між точками. Після проходження розділу про метричні простори можна спокійно переходити топологію.

Remark 1.2.13 Нижче буде наданий приклад, чому в другому твердженні лише скінченна кількість відкритих множин.

Example 1.2.14 Розглянемо $X = \mathbb{R}$ із метрикою $\rho(x, y) = |x - y|$. Задана сім'я відкритих множин $U_n = \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$, причому $\forall n \geq 1$. Тоді зауважимо, що $\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n = \{0\}$, але така множина вже не є відкритою.

Corollary 1.2.15 Нехай (X, ρ) — метричний простір. Тоді справедливе наступне:

- 1) Нехай $\{U_\alpha \subset X, \alpha \in I\}$ — (довільна) сім'я замкнених множин. Тоді $\bigcap_{\alpha \in I} U_\alpha$ — замкнена множина;
- 2) Нехай $\{U_k \subset X, k = \overline{1, n}\}$ — (скінченна) сім'я замкнених множин. Тоді $\bigcup_{k=1}^n U_k$ — замкнена;
- 3) $\emptyset, X$ — замкнені множини.

Вказівка: скористатися де Морганом та Th. 1.2.9.

Remark 1.2.16 Такі твердження НЕ є правдивими:

- 1) A — не відкрита, а тому A — замкнена (наприклад, $[0, 1]$ в $\mathbb{R}$);
- 2) A — відкрита, а тому A — не замкнена (наприклад, $\emptyset$ в $\mathbb{R}$).

Proposition 1.2.17 Нехай (X, ρ) — метричний простір, $a \in X$, $r > 0$. Тоді відкритий окіл $B(a; r)$ — справді відкритий та замкнений окіл $B[a; r]$ — справді замкнений.

Proof.

(про $B(a; r)$). Задамо точку $b \in B(a; r)$. Нехай $\varepsilon = r - \rho(a, b) > 0$. Тоді якщо $x \in B(b; \varepsilon)$, то тоді $\rho(x, a) \leq \rho(x, b) + \rho(b, a) < \varepsilon + \rho(b, a) = r$. Отже, $B(a; r)$ — відкрита.

(про $B[a; r]$). Для цього досить довести, що $B^c[a; r] = \{x | \rho(a, x) > r\}$ — відкрита. Якщо задати $\varepsilon = \rho(a, b) - r$ для точки $b \in B(a; r)$, то аналогічними міркуваннями отримаємо, що $B^c[a; r]$ — відкрита. Отже, $B[a; r]$ — замкнена. ■

Definition 1.2.18 Нехай (X, ρ) — метричний простір, послідовність $\{x_n, n \geq 1\} \subset X$ та $x_0 \in X$. Дана послідовність називається **збіжною** до x_0 , якщо

$$\rho(x_n, x_0) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$

Позначення: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$.

Theorem 1.2.19 Задано (X, ρ) — метричний простір, $A \subset X$ та $x_0 \in X$. Наступні твердження еквівалентні:

- 1) x_0 — гранична точка для A ;
- 2) $\forall \varepsilon > 0 : B(x_0; \varepsilon) \cap A$ — нескінченна множина;
- 3) $\exists \{x_n, n \geq 1\} \subset A : \forall n \geq 1 : x_n \neq x_0 : x_n \rightarrow x_0$.

Proof.

1) $\Rightarrow$ 2) Дано: x_0 — гранична для A .

Припустимо, що $\exists \varepsilon^* > 0 : B(x_0; \varepsilon) \cap A$ — скінченна множина, тобто маємо $x_1, \dots, x_n \in B(x_0; \varepsilon^*)$. Тоді $\rho(x_0, x_1) < \varepsilon^*, \dots, \rho(x_0, x_n) < \varepsilon^*$. Оберемо найменшу відстань та задамо $\varepsilon_{new}^* = \min_{1 \leq i \leq n} \rho(x_0, x_i)$.

Створимо $B(x_0; \varepsilon_{new}^*) \subset B(x_0; \varepsilon)$. У новому шару жодна точка $x_1, \dots, x_n \in A$ більше сюди не потрапляє. Тоді $B((x_0; \varepsilon_{new}^*) \setminus \{x_0\}) \cap A = \emptyset$ — таке неможливо через те, що x_0 — гранична точка. Суперечність!

2) $\Rightarrow$ 3) Дано: $\forall \varepsilon > 0 : B(x_0; \varepsilon) \cap A$ — нескінченна множина. Встановимо $\varepsilon = \frac{1}{n}$. Тоді оскільки $\forall n \geq 1 : B(x_0; \frac{1}{n}) \cap A$ — нескінченна, то $\forall n \geq 1 : \exists x_n \in A : \rho(x_0, x_n) < \frac{1}{n}$. Якщо далі $n \rightarrow \infty$, тоді $\rho(x_0, x_n) \rightarrow 0$. Достатньо, $\exists \{x_n, n \geq 1\} \subset A : x_n \neq x_0 : x_n \rightarrow x_0$.

3) $\Rightarrow$ 1) Дано: $\exists \{x_n, n \geq 1\} \subset A : x_n \neq x_0 : x_n \rightarrow x_0$. Тобто $\forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall n \geq N : \rho(x_0, x_n) < \varepsilon$. Або, інакше кажучи, $\forall \varepsilon > 0 : x_N \in B(x_0; \varepsilon) \cap A$. Тоді $\forall \varepsilon > 0 : (B(x_0; \varepsilon) \setminus \{x_0\}) \cap A \neq \emptyset$. ■

Proposition 1.2.20 Задано (X, ρ) — метричний простір та $A \subset X$.

A — замкнена $\iff \forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset A : x_n \rightarrow x_0 \implies x_0 \in A$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: A — замкнена. Нехай $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset A$ така, що $x_n \rightarrow x_0$.

Припустимо, що $x_0 \notin A$, тобто $x_0 \in X \setminus A$. Зауважимо, що тоді x_0 має бути граничною точкою A . Оскільки A — замкнена, то звідси $x_0 \in A$ — суперечність!

$\Leftarrow$ Дано: $\forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset A : x_n \rightarrow x_0 \implies x_0 \in A$.

Нехай a — гранична точка A . Тобто існує послідовність $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset A : x_n \neq a : x_n \rightarrow a$. Але тоді звідси $a \in A$. Отже, A містить всі граничні точки, тому замкнена. ■

1.3 Замикання множин. Щільність та сепарабельність

Definition 1.3.1 Нехай (X, ρ) — метричний простір, $A \subset X$ та A' — множина граничних точок A . Замиканням множини A називають таку множину

$$\bar{A} = A \cup A'.$$

Часто ще позначають замикання за $\text{Cl}(A)$.

Example 1.3.2 Маємо $X = \mathbb{R}$, $\rho(x, y) = |x - y|$ та множину $A = (0, 1)$. Тоді множина граничних точок $A' = [0, 1]$. Замикання $\bar{A} = A \cup A' = [0, 1]$.

Remark 1.3.3 Розглянемо зараз сукупність замкнених множин $A \subset A_\alpha \subset X$. Перетин $B = \bigcap_{\alpha} A_\alpha$ — також замкнена, водночас $A_\alpha \supset B \supset A$. Отже, B — найменша замкнена множина, що містить A .

Proposition 1.3.4 Нехай (X, ρ) — метричний простір, $A, B \subset X$. Тоді справедливе наступне:

- 1) $(A \cup B)' = A' \cup B'$;
- 2) $(A \cap B)' \subset A' \cap B'$.

Proof.

Доведемо кожне твердження окремо.

- 1) $x_0 \in (A \cup B)' \iff x_0 \text{ — гранична точка } A \cup B \iff \forall \varepsilon > 0 :$

$$\begin{aligned} \dot{B}(x_0; \varepsilon) \cap (A \cup B) &= (\dot{B}(x_0; \varepsilon) \cap A) \cup (\dot{B}(x_0; \varepsilon) \cap B) \neq \emptyset \iff \begin{cases} x_0 \text{ — гранична для } A \\ x_0 \text{ — гранична для } B \end{cases} \iff \\ \begin{cases} x_0 \in A' \\ x_0 \in B' \end{cases} &\iff x_0 \in A' \cup B'. \end{aligned}$$

Отже, тим довели щойно, що $(A \cup B)' = A' \cup B'$.

- 2) $x_0 \in (A \cap B)' \iff x_0 \text{ — гранична точка } A \cap B \iff \forall \varepsilon > 0 :$

$$\begin{aligned} \dot{B}(x_0; \varepsilon) \cap (A \cap B) &= (\dot{B}(x_0; \varepsilon) \cap A) \cap (\dot{B}(x_0; \varepsilon) \cap B) \neq \emptyset \implies \begin{cases} x_0 \text{ — гранична для } A \\ x_0 \text{ — гранична для } B \end{cases} \iff \begin{cases} x_0 \in A' \\ x_0 \in B' \end{cases} \iff \\ x_0 &\in A' \cap B'. \end{aligned}$$

Отже, тим довели щойно, що $(A \cap B)' \subset A' \cap B'$.

Всі твердження доведені. ■

Proposition 1.3.5 Нехай (X, ρ) — метричний простір, $\bar{A}$ — замикання. Тоді справедливе наступне:

- 1) $\bar{A}$ — найменша замкнена множина, що містить A ;
- 2) $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B} \quad \overline{A \cap B} \subset \bar{A} \cap \bar{B}$;
- 3) A — замкнена $\iff A = \bar{A}$.

Proof.

Доведемо кожне твердження окремо.

- 1) !Припустимо, що $\bar{A}$ не є найменшою замкнутою, що містить A , тобто $\exists B \subset \bar{A} : B \supset A$ — замкнена. Зафіксуємо точку $x_0 \in \bar{A}$ — гранична, тоді $x_0 \in A' \cup A$. Далі маємо два випадки:
якщо $x_0 \in A'$, то тоді $x_0 \in B$, тому що B містить всі граничні точки A ;
якщо $x_0 \in A$, то тоді $x_0 \in B$.

В обох випадках $\bar{A} \subset B$. Отже, $\bar{A} = B$. Суперечність!

- 2) Маємо такі ланцюги рівностей та вкладень:

$$\begin{aligned} \overline{A \cup B} &= (A \cup B)' \cup (A \cup B) = A' \cup B' \cup A \cup B = \bar{A} \cup \bar{B}. \\ \overline{A \cap B} &= (A \cap B)' \cup (A \cap B) \subset (A' \cap B') \cup (A \cap B) \subset (A \cup A') \cap (B \cup B') = \bar{A} \cap \bar{B}. \end{aligned}$$

- 3) Доведення в обидва боки.

$\Rightarrow$ Дано: A — замкнена. Тоді A містить всі свої граничні точки. Так само A' містить граничні точки A . Тому $A = \bar{A}$.

$\Leftarrow$ Дано: $A = \bar{A}$. Тобто A містить всі свої граничні точки. Отже, A — замкнена.

Всі твердження доведені. ■

Example 1.3.6 У стандартному метричному просторі $\mathbb{R}$ Розглянемо множини $A = (0, 1)$, $B = (1, 2)$. Зауважимо, що $A \cap B = \emptyset$, тож звідси випливає $\overline{A \cap B} = \emptyset$. А з іншого боку, $\bar{A} = [0, 1]$, $\bar{B} = [1, 2]$, а звідси $\bar{A} \cap \bar{B} = \{1\}$.

Таким чином, $\overline{A \cap B} \subsetneq \bar{A} \cap \bar{B}$.

Буквально так само $(A \cap B)' \subsetneq A' \cap B'$.

Remark 1.3.7 У загальному випадку $\overline{B(x; r)} \neq B[x; r]$.

Розглянемо дискретний простір (X, d) , де множина X містить не менше двох елементів. Зауважимо, що $B(a; 1) = \{a\}$ та $\bar{B}[a; 1] = X$. Ми вже знаємо, що там всі множини — відкриті (тому відповідно замкнені). Отже, $\bar{B}(a; 1) = B(a; 1) = \{a\} \neq X = \bar{B}[a; 1]$.

Definition 1.3.8 Нехай (X, ρ) — метричний простір та $A \subset X$.

Множина A називається **щільною** в X , якщо

$$\forall x \in X, \forall \varepsilon > 0 : \exists y \in A : \rho(x, y) < \varepsilon.$$

Іноколи ще бачу, щоб називали множину A **скрізь щільною**.

Proposition 1.3.9 Нехай (X, ρ) — метричний простір та $A \subset X$. Тоді

$$\text{множина } A \text{ — скрізь щільна} \iff \bar{A} = X.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: A — скрізь щільна. Цілком зрозуміло, що $\bar{A} \subset X$, тому залишилося тільки в зворотний бік провести.

Нехай $x \in X$. тоді за умовою щільності, $\forall \varepsilon > 0 : \exists y \in A : \rho(x, y) < \varepsilon$. Якщо $x \in A$, автоматично $x \in \bar{A}$. Якщо $x \notin A$, то тоді там записано, що x — гранична точка A , тож все одно $x \in \bar{A}$.

$\Leftarrow$ Дано $\bar{A} = X$. Оберемо $x \in X$ та $\varepsilon > 0$. Якщо $x \in A$, то тоді можна взяти $y = x \in A$ і тоді $\rho(x, y) = 0 < \varepsilon$. Якщо $x \notin A$, то тоді x має бути просто граничною точкою A , але тоді $\exists y \in A : y \neq x : \rho(x, y) < \varepsilon$. Таким чином, A — скрізь щільна. ■

Proposition 1.3.10 Нехай (X, ρ) — метричний простір та $A \subset X$. Тоді

$$\text{Множина } A \text{ — скрізь щільна} \iff \forall x \in X : \exists \{x_n, n \geq 1\} \subset A : x_n \rightarrow x, n \rightarrow \infty.$$

Вправа: довести.

Definition 1.3.11 Задано (X, ρ) — метричний простір.

Метричний простір називається **сепарабельним**, якщо

існує в даному просторі скінченна чи зліченна щільна підмножина.

Example 1.3.12 Зокрема $(\mathbb{R}, \rho)$, де $\rho(x, y) = |x - y|$ — сепарабельний, оскільки $\mathbb{Q}$ — зліченна та скрізь щільна підмножина (див. курс матаналізу за 1 семестр).

Example 1.3.13 Простір $C([a, b])$ також сепарабельний.

Покладемо $A = \{Q \in \mathbb{Q}[x] \text{ — многочлени на } [a, b]\}$. Цілком ясно, що A — зліченна множина. Залишилося показати, що A — скрізь щільна.

Нехай $f \in C([a, b])$ та $\varepsilon > 0$. За теоремою Ваєрштраса про наближення функції, існує многочлен $P_\varepsilon \in \mathbb{R}[x]$, для якого $\sup_{x \in [a, b]} |f(x) - P_\varepsilon(x)| < \varepsilon$. Запишемо $P_\varepsilon(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_kx^k$. Оскільки

$\mathbb{Q}$ — скрізь щільна на $\mathbb{R}$, то ми можемо знайти $b_0, b_1, \dots, b_k \in \mathbb{Q}$ такі, що $|a_i - b_i| < \varepsilon$. Отримаємо многочлен $Q_\varepsilon \in \mathbb{Q}[x]$ вигляду $Q_\varepsilon(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_kx^k$. Тоді $\forall x \in [a, b]$ маємо наступне:

$$|P_\varepsilon(x) - Q_\varepsilon(x)| \leq |a_0 - b_0| + |a_1 - b_1||x| + \dots + |a_k - b_k||x^k| < \varepsilon M_0 + \varepsilon M_1 + \dots + \varepsilon M_k = M\varepsilon.$$

У цьому випадку $M_i = \max_{x \in [a, b]} |x^i|$, який існує, оскільки $x^i \in C([a, b])$. Отже, довели

$$\sup_{x \in [a, b]} |P_\varepsilon(x) - Q_\varepsilon(x)| < \varepsilon.$$

Використаємо тепер нерівність трикутника — отримаємо:

$$\sup_{x \in [a, b]} |f(x) - Q_\varepsilon(x)| \leq \sup_{x \in [a, b]} |f(x) - P_\varepsilon(x)| + \sup_{x \in [a, b]} |P_\varepsilon(x) - Q_\varepsilon(x)| < 2\varepsilon.$$

Theorem 1.3.14 Задано (X, ρ) — сепарабельний метричний простір та $Y \subset X$ — підпростір. Тоді (Y, ρ_Y) — також сепарабельний.

Proof.

Ми розглянемо випадок, коли $Y \subsetneq X$. Оберемо елемент $x \in X \setminus Y$. Оскільки (X, ρ) — сепарабельний, то маємо $Q = \{x_n, n \geq 1\}$ — зліченна та скрізь щільна в X .

Розглянемо такий набір елементів $R = \{y_{n,k}, n \geq 1, k \geq 1 : y_{n,k} \neq x\}$. Пояснюємо, як ми це сформуваємо. Проходимося по всіх можливих парам натуральних числах (n, k) . Якщо $B\left(x_n, \frac{1}{k}\right) \cap Y \neq \emptyset$, то звідти обираємо елемент $y_{n,k}$. Інакше елемент $y_{n,k} = x$.

Доведемо, що R — скрізь щільна множина в Y . Єдине варто пересвідчитися, що отримана множина $R \neq \emptyset$. Дійсно, нехай $y \in Y$ та $\varepsilon > 0$, ми оберемо таке $k \geq 1$, щоб $\frac{1}{k} < \frac{\varepsilon}{2}$. Оскільки Q — скрізь щільна, то звідси $\exists x_n \in Q : \rho(y, x_n) < \frac{1}{k}$. Отже $B\left(\frac{1}{k}, x_n\right) \cap Y \neq \emptyset$ і там існує точка $y_{n,k}$, тож $R \neq \emptyset$.

Тепер ще раз беремо $\varepsilon > 0$ та елемент $y \in Y$. Тоді ми щойно знайшли елемент $y_{n,k}$, для якого

$$\rho_Y(y, y_{n,k}) \leq \rho(y, x_n) + \rho(x_n, y_{n,k}) < \frac{1}{k} + \frac{1}{k} < \varepsilon.$$

Отже, ми довели скрізь щільність. Те, що R зліченна, тут цілком зрозуміло. ■

1.4 Повнота

Definition 1.4.1 Нехай (X, ρ) — метричний простір.

Послідовність $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ називається **фундаментальною**, якщо

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall m, n \geq N : \rho(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

Дану умову можна переписати більш компактним чином:

$$\rho(x_n, x_m) \xrightarrow{m, n \rightarrow \infty} 0.$$

Proposition 1.4.2 Будь-яка збіжна послідовність є фундаментальною.

Proof.

Нехай (X, ρ) — метричний простір та $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ — збіжна послідовність, тобто $\rho(x_n, x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. За нерівністю трикутника маємо

$$\rho(x_n, x_m) \leq \rho(x_n, x) + \rho(x, x_m).$$

Якщо спрямувати $m, n \rightarrow \infty$, то тоді $\rho(x_n, x_m) \rightarrow 0$. Отже, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ — фундаментальна. ■

Remark 1.4.3 Проте не кожна фундаментальна послідовність — збіжна.

Example 1.4.4 Маємо $(0, 1]$ — підпростір $\mathbb{R}$. Розглянемо послідовність

$$\left(x_n = \frac{1}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}},$$

яка є збіжною відносно $\mathbb{R}$ (якщо точніше, $x_n \rightarrow 0$), тому фундаментальна в $\mathbb{R}$, тож і в $(0, 1]$. Однак $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ не буде збіжною в $(0, 1]$, оскільки $0 \notin (0, 1]$.

Definition 1.4.5 Метричний простір (X, ρ) називається **повним**, якщо

будь-яка фундаментальна послідовність має границю.

Example 1.4.6 Зокрема маємо наступне:

- 1) $X = \mathbb{R}$ — повний (зі стандартною метрикою) за критерієм Коші із матану;
- 2) $X = (0, 1]$ — не повний, бо принаймні $\left(x_n = \frac{1}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ — фундаментальна, проте не має границі.

Example 1.4.7 $(\mathbb{N}, \rho)$ — повний метричний простір, де $\rho(m, n) = 1 + \frac{1}{m+n}$ при $m \neq n$.

(цей приклад ще нам знадобиться в одному моменті)

Нехай $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{N}$ — фундаментальна послідовність. Тоді для $\varepsilon = 1$ маємо, що

$$\exists N : \forall n, m \geq N : \rho(x_m, x_n) < 1.$$

Зауважимо, що взагалі $\rho(k, l) \geq 1$ при $k \neq l$, тому для нерівності треба вимагати $x_m = x_n$ для кожного $n, m \geq N$. Отже, ми отримали послідовність $(x_1, x_2, \dots, x_N, x_N, x_N, \dots)$, яка стаціонарна, починаючи з деякого номеру, яка буде збіжною.

У другому прикладі можна було з'ясувати, що підпростір неповний через її незамкненість.

Proposition 1.4.8 Нехай (X, ρ) — повний метричний простір та (Y, ρ) — підпростір. Тоді

$$(Y, \rho) \text{ — повний} \iff Y \text{ — замкнена в } X.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: (Y, ρ) — повний.

Нехай $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset Y$, причому $x_n \rightarrow x_0$. Якщо доведемо, що $x_0 \in Y$, то ми доведемо, що Y — замкнена в X . Оскільки $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in$ збіжною в X , то тоді $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ буде фундаментальною в X , зокрема в Y . Оскільки Y — повний, то $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ — збіжний в Y , що гарантує нам, що $x_0 \in Y$.

$\Leftarrow$ Дано: Y — замкнена в X .

Нехай $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset Y$ — фундаментальна в Y , зокрема в X . Оскільки X — повний, то $x_n \rightarrow x_0$, однак в силу замкненості Y маємо $x_0 \in Y$. Значить, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ — збіжна в Y . ■

Lemma 1.4.9 Нехай (X, ρ) — метричний простір та $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ — фундаментальна. Припустимо, що існує збіжна підпослідовність $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$. Тоді $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ — збіжна.

Proof.

Маємо $x_{n_k} \rightarrow x$, $k \rightarrow \infty$, тобто це означає, що

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists K : \forall k \geq K : \rho(x_{n_k}, x) < \varepsilon.$$

Також відомо із фундаментальності, що

$$\exists N : \forall n, m \geq N : \rho(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

Тоді $\forall n \geq N^* = \max\{N, K\}$ маємо таку нерівність:

$$\rho(x_n, x) \leq \rho(x_n, x_{n_{N^*}}) + \rho(x_{n_{N^*}}, x) < 2\varepsilon.$$

Внаслідок чого отримуємо $x_n \rightarrow x$. ■

Перш ніж сформулюємо критерій повноти метричного простору, сформулюємо таке означення.

Definition 1.4.10 Метричний простір (X, ρ) задовольняє умову Кантора, якщо

для кожної послідовності замкнених куль $(B[a_n; r_n])_{n \in \mathbb{N}}$, які стягуються (тобто $B[a_1; r_1] \supset B[a_2; r_2] \supset \dots$ та при цьому $r_n \rightarrow 0$) існує точка $x \in B[a_n; r_n]$, $\forall n \geq 1$.

Theorem 1.4.11 Критерій Кантора

(X, ρ) — повний метричний простір $\iff (X, \rho)$ задовольняє умову Кантора.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: (X, ρ) — повний. Задамо послідовність куль $(B[a_n; r_n])_{n \in \mathbb{N}}$, що стягується.

I. послідовність центрів $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ — фундаментальна.

За умовою $r_n \rightarrow 0$, тож

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall n \geq N : r_n < \varepsilon.$$

Досить взяти лише $r_N < \varepsilon$. Тоді

$$\forall n, m \geq N : a_m, a_n \in B[a_N, r_N] \implies \rho(a_m, a_N) < r_N \text{ та } \rho(a_n, a_N) < r_N.$$

Внаслідок чого маємо таку оцінку:

$$\rho(a_n, a_m) \leq \rho(a_n, a_N) + \rho(a_N, a_m) < 2r_N < 2\varepsilon.$$

Отже, $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ — фундаментальна.

II. Замкнені кулі, що стягуються, мають непорожній перетин.

Оскільки X — повний, то тоді $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ — збіжна, тобто $a_n \rightarrow a_0$. Оскільки $B[a_n; r_n]$ — замкнені, то

за **Prp. 1.2.20** маємо, що $a_0 \in B[a_n; r_n]$. Звідси $a_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} B[a_n; r_n]$.

⌊⇐ Дано: (X, ρ) задовольняє умову Кантора. Нехай $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ — фундаментальна послідовність. Зараз почнеться побудова послідовності замкнених куль, що стягується.

При $\varepsilon = \frac{1}{2}$ маємо $n_1 \in \mathbb{N}$ таке, що $\forall n \geq n_1 : \rho(a_n, a_{n_1}) < \frac{1}{2}$.

При $\varepsilon = \frac{1}{4}$ маємо $n_2 > n_1$ таке, що $\forall n \geq n_2 : \rho(a_n, a_{n_2}) < \frac{1}{4}$.

⋮

Тоді маємо підпослідовність $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ із властивістю $\forall n \geq n_k : \rho(a_n, a_{n_k}) < \frac{1}{2^k}$. Звідси випливає, що замкнені кулі $B \left[a_{n_k}; \frac{1}{2^{k-1}} \right]$ будуть вкладеними, тобто

$$B \left[a_{n_k}; \frac{1}{2^{k-1}} \right] \supset B \left[a_{n_{k+1}}; \frac{1}{2^k} \right], \quad \forall k \geq 1.$$

Справді, беремо $x \in B \left[a_{n_{k+1}}; \frac{1}{2^k} \right]$, тобто $\rho(x, a_{n_{k+1}}) \leq \frac{1}{2^k}$. За нерівністю трикутника отримаємо

$$\rho(a_{n_k}, x) \leq \rho(a_{n_k}, a_{n_{k+1}}) + \rho(a_{n_{k+1}}, x) \leq \frac{1}{2^{k-1}},$$

тому звідси $x \in B \left[a_{n_k}; \frac{1}{2^{k-1}} \right]$.

Далі всі радіуси $\frac{1}{2^{k-1}} \rightarrow 0$, тому за умовою Кантора існує точка $a \in B \left[a_{n_k}; \frac{1}{2^{k-1}} \right]$, $\forall k \geq 1$.

Тобто $\forall k \geq 1$ маємо $\rho(a_{n_k}, a) \leq \frac{1}{2^{k-1}}$, після спрямування $k \rightarrow \infty$ отримаємо $a_{n_k} \rightarrow a$. Значить, за

Lm. 1.4.9, послідовність $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ збіжна.

Висновок: метричний простір (X, ρ) — повний. ■

Remark 1.4.12 До речі, точка, що належить перетину замкнених кіл, буде єдиною.

!Припустимо, що це не так, тобто існують дві точки $b^*, b^{**} \in \bigcap_{n=1}^{\infty} B[a_n; r_n]$. Тоді

$$\forall n \geq 1 : \begin{cases} \rho(a_n, b^*) \leq r_n \\ \rho(a_n, b^{**}) \leq r_n \end{cases} \implies \rho(b^*, b^{**}) \leq \rho(b^*, a_n) + \rho(a_n, b^{**}) \leq r_n + r_n = 2r_n.$$

Спрямуємо $n \rightarrow \infty$, тоді $\rho(b^*, b^{**}) \leq 0 \implies \rho(b^*, b^{**}) = 0 \implies b^* = b^{**}$. Суперечність!

Remark 1.4.13 Умова того, що $r_n \rightarrow 0$ в теоремі Кантора, є суттєвою.

Example 1.4.14 (а я попереджав, що нам той приклад знадобиться)

Розглянемо повний метричний простір $(\mathbb{N}, \rho)$, де $\rho(m, n) = 1 + \frac{1}{m+n}$, $m \neq n$. Розглянемо послідов-

ність замкнених куль $\left(B \left[n, 1 + \frac{1}{2n} \right] \right)_{n \in \mathbb{N}}$. Зауважимо, що

$$\begin{aligned} B \left[n, 1 + \frac{1}{2n} \right] &= \left\{ x \in \mathbb{N} \mid \rho(x, n) \leq 1 + \frac{1}{2n} \right\} = \left\{ x \in \mathbb{N} \mid \frac{1}{x+n} \leq \frac{1}{2n} \right\} = \{x \in \mathbb{N} \mid x \geq n\} \\ &= \{n, n+1, \dots\} = \mathbb{N} \setminus \{1, 2, \dots, n-1\}. \end{aligned}$$

Аналогічні міркуваннями отримуємо $B \left[1, 1 + \frac{1}{2} \right] = \mathbb{N}$. Отже, в нас

$$B \left[1, 1 + \frac{1}{2} \right] \supset B \left[2, 1 + \frac{1}{4} \right] \supset B \left[3, 1 + \frac{1}{6} \right] \supset \dots,$$

при цьому $\bigcap_{n=1}^{\infty} B \left[n, 1 + \frac{1}{2n} \right] = \emptyset$. У цьому випадку радіуси $1 + \frac{1}{2n} \not\rightarrow 0$, тому точки перетину нема.

Існує також один важливий результат, пов'язаний з повними метричними просторами. Ця теорема буде необхідною для функана.

Theorem 1.4.15 Теорема Бера про категорії

Нехай (X, ρ) — повний метричний простір та $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n$, де кожна C_n — замкнена. Тоді існує принаймні одна множина C_{n_0} , яка містить відкрите коло.
(дана теорема не має прямого відношення до теорії категорії)

Proof.

Припустимо, що жодна множина C_n не містить відкрите коло. Тоді доведемо, що існує точка $x \in X$, яка не належить жодній з C_n , що й призведе до суперечності.

Оскільки X містить бодай одну відкриту кулю, то $X \neq C_1$, оберемо тоді точку $x_1 \in X \setminus C_1$. Оскільки C_1 — замкнена, тобто $X \setminus C_1$ — відкрита, то існує відкрита куля $B(\varepsilon_1, x_1) \cap C_1 = \emptyset$.

Зауважимо, що $B\left(\frac{\varepsilon_1}{3}, x_1\right)$ не міститься в C_2 , оберемо тоді точку $x_2 \in B\left(\frac{\varepsilon_1}{3}, x_1\right) \setminus C_2$. Оскільки C_2 — замкнена, то існує відкрита куля $B(\varepsilon_2, x_2)$, причому $\varepsilon_2 < \frac{\varepsilon_1}{3}$ та $B(x_2, \varepsilon_2) \cap C_2 = \emptyset$.

Продовжуючи дану процедуру, побудуємо послідовність $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$, всі точки задовольняють умову $x_k \in B\left(\frac{\varepsilon_{k-1}}{3}, x_{k-1}\right)$ та $B(x_k, \varepsilon_k) \cap C_k = \emptyset$, водночас $\varepsilon_k < \frac{\varepsilon_{k-1}}{3}$. Послідовність $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ є фундаментальною, адже

$$\begin{aligned} \rho(x_{n+l}, x_n) &\leq \rho(x_n, x_{n+1}) + \dots + \rho(x_{n+l-1}, x_{n+l}) < \frac{\varepsilon_n}{3} + \frac{\varepsilon_{n+1}}{3} + \dots + \frac{\varepsilon_{n+l-1}}{3} \\ &< \varepsilon_1 \left(\frac{1}{3^n} + \dots + \frac{1}{3^{n+l}} \right) < \frac{\varepsilon_1}{2} 3^{-n+1} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Оскільки X — повний, то $x_k \rightarrow x \in M$. Залишилося показати, що $x \notin C_n$ при жодному $n \geq 1$. Це можна довести, якщо показати, що $x \in B(x_n, \varepsilon_n)$ для всіх $n \in \mathbb{N}$.

$$\rho(x_{n+1}, x_{n+1+l}) < \varepsilon_{n+1} \sum_{n=1}^{\infty} 3^{-n} = \frac{\varepsilon_{n+1}}{2}.$$

Спрямовуючи $l \rightarrow \infty$, одержимо

$$\rho(x_{n+1}, x) \leq \frac{\varepsilon_{n+1}}{2} < \frac{\varepsilon_n}{6}.$$

Внаслідок чого отримуємо

$$\rho(x_n, x) \leq \rho(x_n, x_{n+1}) + \rho(x_{n+1}, x) \leq \frac{1}{3}\varepsilon_n + \frac{1}{6}\varepsilon_n < \varepsilon_n.$$

Отже, $p \in B(x_n, \varepsilon_n)$ — нарешті, одержали суперечність! ■

1.5 Поповнення метричного простору та трошки про ізометрію

Definition 1.5.1 Нехай (X, ρ) та $(Y, \tilde{\rho})$ — два метричних простори.

Відображення $f: X \rightarrow Y$ називається **ізометрією**, якщо

$$\forall x_1, x_2 \in X : \tilde{\rho}(f(x_1), f(x_2)) = \rho(x_1, x_2).$$

Тобто суть ізометрії — це збереження відстаней.

Remark 1.5.2 Кожна ізометрія уже автоматично ін'єктивна.

Дійсно, припустимо, що $f: X \rightarrow Y$ — ізометрія та $f(x_1) = f(x_2)$. Тоді $\tilde{\rho}(f(x_1), f(x_2)) = \rho(x_1, x_2)$. Отримаємо $\rho(x_1, x_2) = 0$, тобто $x_1 = x_2$.

Definition 1.5.3 Метричні простори (X, ρ) , $(Y, \tilde{\rho})$ називаються **ізометричними**, якщо

$$\exists f: X \rightarrow Y \text{ — бієктивна ізометрія.}$$

Example 1.5.4 Розглянемо метричні простори $(\mathbb{R}, \tilde{\rho})$ та $\left(\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \rho\right)$. У цьому випадку ρ — стандартна метрика та $\tilde{\rho}(x, y) = |\arctg x - \arctg y|$. Ці два простори — ізометричні.

Дійсно, між ними існує ізометрія $\arctg: \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, що є бієктивною.

Proposition 1.5.5 Нехай $(X, \rho), (Y, \tilde{\rho})$ — ізометричні метричні простори. Тоді

$$(X, \rho) \text{ — повний} \iff (Y, \tilde{\rho}) \text{ — повний}.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: (X, ρ) — повний. Нехай $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ — фундаментальна послідовність. Оскільки X, Y ізометричні, то існує бієкція $f: X \rightarrow Y$, що є ізометрією. Тож звідси $\exists! x_n \in X : f(x_n) = y_n$. Розглянемо послідовність $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ та зауважимо, що $\rho(x_n, x_m) = \tilde{\rho}(y_n, y_m) \rightarrow 0$ в силу фундаментальності. Отже, $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ — фундаментальна, тож збіжна за повнотою. Тобто $\rho(x_n, x) \rightarrow 0$. Позначимо $f(x) = y$. Звідси випливає, що $\tilde{\rho}(y_n, y) = \rho(x_n, x) \rightarrow 0$. Тобто $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ — збіжна.

$\Leftarrow$ дзеркальне доведення. ■

Definition 1.5.6 Нехай Y — метричний простір.

Простір Y буде називатися **поповненням (completion)** метричного простору X , якщо

$$\begin{aligned} Y &\text{ — повний простір, при цьому } Y \supset X; \\ X &\text{ — ізометричний підпростір } Y; \\ X &\text{ — щільна в } Y. \end{aligned}$$

Theorem 1.5.7 Для кожного метричного простору (X, ρ) існує поповнення. Причому це поповнення єдине з точністю до ізометрії.

Proof.

I. Існування.

Визначимо ось таку множину:

$$F = \{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid (x_n) \text{ — фундаментальна}\}.$$

Стационарні послідовності — фундаментальні, тож $X \subset F$ (ми можемо сприймати саме так).

Розглянемо функцію

$$d: F \times F \rightarrow \mathbb{R}, \quad d((x_n), (y_n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, y_n).$$

Необхідно довести, що $(\rho(x_n, y_n))_{n \in \mathbb{N}}$ — фундаментальна (це числова послідовність, тому цього буде достатньо для збіжності). Це треба, аби перекоонатися, що функція коректно визначена.

Нам відомо, що $(x_n), (y_n)$ фундаментальні, тобто $\exists N_1, N_2$, для яких $\rho(x_n, x_m) < \varepsilon$ та $\rho(y_n, y_m) < \varepsilon$ для всіх $n, m \geq N_1, m, n \geq N_2$. Тоді при $N = \max\{N_1, N_2\}$ справедлива оцінка:

$$|\rho(x_n, y_n) - \rho(x_m, y_m)| \leq \rho(x_n, y_n) + \rho(x_m, y_m) \leq (\rho(x_n, x_m) + \rho(x_m, y_m) + \rho(y_m, y_n)) - \rho(x_m, y_m) < 2\varepsilon.$$

Отже, функція d визначена коректно. Вона майже метрика, оскільки (легко перевірити) виконуються всі властивості; однак, на жаль, $d((x_n), (y_n)) = 0 \not\Rightarrow (x_n) = (y_n)$ (приклад буде нижче).

На множині F задамо відношення еквівалентності

$$(x_n) \sim (y_n) \iff d((x_n), (y_n)) = 0.$$

Доведемо, що фактормножина $F/\sim = \hat{F}$ — поповнення X . Елементи з $\hat{F}$ позначатимемо за $\overline{(x_n)}$.

На фактормножині покладемо функцію

$$\tilde{\rho}(\overline{(x_n)}, \overline{(y_n)}) = d((x_n), (y_n)).$$

Варто пересвідчитися, що воно визначено коректно.

Нехай $(x_n) \sim (x'_n)$ та $(y_n) \sim (y'_n)$. Тобто $d((x_n), (x'_n)) = 0$ та $d((y_n), (y'_n)) = 0$. Тоді

$$d((x_n), (y_n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, y_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, x'_n) + \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x'_n, y'_n) + \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(y'_n, y_n) = d((x'_n), (y'_n)).$$

Аналогічно отримаємо

$$d((x'_n), (y'_n)) \leq d((x_n), (y_n)).$$

Отже, $d((x'_n), (y'_n)) = d((x_n), (y_n))$, тобто $\tilde{\rho}$ визначилося коректним чином.

Поставимо відображення $f: X \rightarrow \hat{F}$ таким чином:

$$f(x) = \overline{(x)}.$$

Це буде ізометрією, тому що

$$\tilde{\rho}(f(x_1), f(x_2)) = \tilde{\rho}(\overline{(x_1)}, \overline{(x_2)}) = d((x_1), (x_2)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_1, x_2) = \rho(x_1, x_2).$$

Відображення f зобов'язане бути сюр'єктивним, оскільки повертається клас еквівалентності. Тобто f — бієктивна ізометрія, а тому (X, ρ) , $(\hat{F}, \tilde{\rho})$ — ізометричні.

Покажемо, що $(\hat{F}, \tilde{\rho})$ — повний метричний простір. (TODO: обміркувати).

Доведемо, що X — щільна в $\hat{F}$. Справді, нехай $(x_n) \in \hat{F}$ та $\varepsilon > 0$. Оскільки $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ — фундаментальна, то $\exists N : \rho(x_n, x_N) < \varepsilon$ для всіх $n \geq N$. Узявши границю, отримуємо $\tilde{\rho}((x_n), (x_N)) \leq \varepsilon < 2\varepsilon$, точка $(x_N) \in X$ як стаціонарна послідовність.

II. Єдиність.

Розглянемо два поповнення $(Y_1, \tilde{\rho}_1), (Y_2, \tilde{\rho}_2)$ простору (X, ρ) . Тобто, за означенням, маємо $Y_1 \supset X_1 \sim X \sim X_2 \subset Y_2$, а також $\overline{X_1} = Y_1, \overline{X_2} = Y_2$. Під $\sim$ мається на увазі ізометричність. Із цього X_1 ізометричний до X_2 , нехай g — відповідна ізометрія.

Побудуємо $f : Y_1 \rightarrow Y_2$ за таким правилом: для кожного $y \in Y_1$ беремо таку послідовність $\{x_n\} \subset X_1$, щоб $x_n \rightarrow y$ — тоді $f(y) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n)$. Треба пересвідчитися, що визначення коректне. Дійсно, нехай $\{x_n\}, \{x'_n\}$ — такі дві послідовності, що $x_n \rightarrow y, x'_n \rightarrow y$. Тоді звідси випливає наступне:

$$\tilde{\rho}_2(g(x_n), g(x'_n)) \stackrel{\text{ізометричність}}{=} \tilde{\rho}_1(x_n, x'_n) \leq \tilde{\rho}_1(x_n, y) + \tilde{\rho}_2(y, x'_n) \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty.$$

Таким чином, $\lim_{n \rightarrow \infty} g(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(x'_n)$, а тому значення функцій коректно визначено. (TODO: подумати над тим, чи правильно я все це розписав). ■

Example 1.5.8 Беремо стандартний метричний простір $\mathbb{R}$, послідовності

$$(x_n) = (0.9, 0.99, 0.999, \dots), \quad (y_n) = (1, 1, 1, \dots).$$

Зауважимо, що

$$d((x_n), (y_n)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \underbrace{0.00\dots 01}_{n \text{ цифр}} = 0.$$

При цьому зрозуміло, що $(x_n) \neq (y_n)$.

Definition 1.5.9 Повний нормований простір називається **банаховим**. Повний евклідов простір (відносно метрики, що породжена скалярним добутком) називається **гільбертовим**.

Proposition 1.5.10 Евклідов простір l_2 — гільбертів.

Proof.

Задамо фундаментальну послідовність $\{\vec{x}_n, n \geq 1\}$ на множині l_2

Тобто $\forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall n, m \geq N : \|\vec{x}_n - \vec{x}_m\| < \varepsilon$

$$\Rightarrow \|\vec{x}_n - \vec{x}_m\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} (x_n^k - x_m^k)^2 < \varepsilon^2 \Rightarrow \forall k \geq 1 : |x_n^k - x_m^k| < \varepsilon$$

Тоді послідовність $\{x_n^k, n \geq 1\}$ — фундаментальна — тому (за матаном) збіжна, $x_n^k \rightarrow y^k$

Доведемо, що $\vec{x}$ збігається до $\vec{y}$ за нормою

$$\text{Маємо } \sum_{k=1}^{\infty} (x_n^k - x_m^k)^2 < \varepsilon^2 \Rightarrow \forall K \geq 1 : \sum_{k=1}^K (x_n^k - x_m^k)^2 < \varepsilon^2$$

$$\text{Спрямуємо } m \rightarrow \infty, \text{ тоді } \sum_{k=1}^K (x_n^k - y^k)^2 < \varepsilon^2$$

Звідки випливає збіжність ряду $\sum_{k=1}^{\infty} (x_n^k - y^k)^2$ та його оцінка

$$\sum_{k=1}^{\infty} (x_n^k - y^k)^2 < \varepsilon^2 \Rightarrow \|\vec{x}_n - \vec{y}\| < \varepsilon$$

Отже, $\vec{x}_n \rightarrow \vec{y}$ ■

1.6 Неперервні відображення

Definition 1.6.1 Задані $(X, \rho), (Y, \tilde{\rho})$ — два метричних простори.

Відображення $f : X \rightarrow Y$ називається **неперервним у точці** x_0 , якщо

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall x \in X : \rho(x, x_0) < \delta \implies \tilde{\rho}(f(x), f(y)) < \varepsilon$$

Remark 1.6.2 Дане означення можна записати більш компактним чином. Маємо $f: X \rightarrow Y$.
 f — неперервне в точці $x_0 \in X \iff \forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : f(B(x_0; \delta)) \subset B(f(x_0); \varepsilon)$.

Proposition 1.6.3 Задані $(X, \rho), (Y, \tilde{\rho})$ — два метричних простори та $f: X \rightarrow Y$.
 f — неперервне в точці $x_0 \in X \iff \forall \{x_n\} \subset X : x_n \rightarrow x_0 \text{ в } X \implies f(x_n) \rightarrow f(x_0) \text{ в } Y$.
Вправа: довести.

Theorem 1.6.4 Задані $(X, \rho), (Y, \tilde{\rho})$ — два метричних простори та $f: X \rightarrow Y$.
 f — неперервне (на множині X) $\iff \forall V$ — замкнена в $Y : f^{-1}(V)$ — замкнена в X .

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: f — неперервне. Нехай V — замкнена в Y . Зафіксуємо $x_n \in f^{-1}(V)$ таким чином, що $x_n \rightarrow x_0$. Але за неперервністю, $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$, та додатково $f(x_n) \in V$. Значить, за замкненістю V , точка $f(x_0) \in V \implies x_0 \in f^{-1}(V)$. Отже, $f^{-1}(V)$ — замкнена.

$\Leftarrow$ Дано: $\forall V$ — замкнена в $Y : f^{-1}(V)$ — замкнена в X . Оберемо $x_n \rightarrow x_0$.
 Припустимо, що $f(x_n) \not\rightarrow f(x_0)$, тобто існує шар $B(f(x_0); \varepsilon)$, поза яким знаходиться підпоследовність $\{f(x_{n_k})\}$. Якщо V — замикання множини $\{f(x_{n_k})\}$, то звідси $x_{n_k} \in f^{-1}(V)$; $f(x_0) \notin V$. Тоді звідси $x_0 \notin f^{-1}(V)$, проте $x_{n_k} \rightarrow x_0$ та x_0 є граничною точкою для $f^{-1}(A)$. Суперечність! ■

Corollary 1.6.5 f — неперервне $\iff \forall U$ — відкрита в $Y : f^{-1}(U)$ — відкрита в X .
Вказівка: застосувати попередню теорему та рівність $f^{-1}(A^c) = (f^{-1}(A))^c$.

Proposition 1.6.6 Задані X, Y, Z — метричні простори та $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$. Нехай f — неперервне в точці $x_0 \in X$ та g — неперервне в точці $f(x_0) \in Y$. Тоді $g \circ f$ — неперервне в точці $x_0 \in X$.
Вправа: довести.

Proposition 1.6.7 Задано (X, ρ) — метричний простір та зафіксуємо $x_0 \in X$. Тоді функція $f(x) = \rho(x, x_0)$, де $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, — неперервна на X .

Proof.

Дійсно, нехай $y_0 \in X$. Припустимо, що $\{y_n\}$ така, що $y_n \rightarrow y_0$. Хочемо $f(y_n) \rightarrow f(y_0)$. Справді, $|f(y_n) - f(y_0)| = |\rho(y_n, x_0) - \rho(y_0, x_0)| \leq |\rho(y_n, y_0)| \rightarrow 0$.
 Для $\mathbb{R}$ береться стандартна метрика, якщо нічого іншого не вказується зазвичай. ■

Definition 1.6.8 Задано (X, ρ) — метричний простір та $f: X \rightarrow X$.
 Дане відображення називається **стиском**, якщо

$$\exists q \in (0, 1) : \forall x, y \in X : \rho(f(x), f(y)) \leq q \cdot \rho(x, y)$$

Remark 1.6.9 Стискаючі відображення — неперервні.
Вказівка: обрати $\delta = \frac{q}{\varepsilon}$ при всіх $\varepsilon > 0$.

Theorem 1.6.10 Теорема Банаха

Задано (X, ρ) — повний метричний простір та $f: X \rightarrow X$ — стискаюче відображення. Тоді існує єдина точка нерухома точка, тобто $\exists! x \in X : f(x) = x$.

Proof.

I. *Існування.*

Нехай $x_0 \in X$ — довільна точка. Зробимо позначення: $x_1 = f(x_0), x_2 = f(x_1), \dots, x_n = f(x_{n-1}), \dots$. Покажемо, що послідовність $\{x_n, n \geq 0\}$ — фундаментальна. Дійсно, для $m \leq n$ маємо:
 $\rho(x_m, x_n) = \rho(f(x_{m-1}), f(x_{n-1})) \leq q \cdot \rho(x_{m-1}, x_{n-1}) \leq \dots \leq q^m \rho(x_0, x_{n-m})$.
 $\rho(x_0, x_{n-m}) \leq \rho(x_0, x_1) + \rho(x_1, x_2) + \dots + \rho(x_{n-m-1}, x_{n-m}) \leq \rho(x_0, x_1)(1 + q + \dots + q^{n-m-1}) \leq$
 $\leq \rho(x_0, x_1) \frac{1}{1 - q}$.

Разом отримуємо $\rho(x_m, x_n) \leq \frac{q^m}{1 - q} \rho(x_0, x_1) \rightarrow 0, n, m \rightarrow \infty$.

Оскільки (X, ρ) — повний, то $\{x_n\}$ — збіжна, позначимо $a = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. Зважаючи на неперервність стиска, отримуємо $f(a) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = a$. Тобто a — це наша шукана нерухома точка.

II. *Єдиність.*

Припустимо, що f має дві різні нерухомі точки a, b . Буде суперечність! Дійсно, $0 < \rho(a, b) = \rho(f(a), f(b)) \leq q \cdot \rho(a, b) < \rho(a, b)$. ■

Remark 1.6.11 Насправді, в теоремі Банаха досить вимагати, щоб саме $f^n \stackrel{\text{def.}}{=} f \circ \dots \circ f$ було стиском, а не відображення f .

Дійсно, за теоремою Банаха, f^n матиме єдину нерухому точку a , тобто $f^n(a) = a$. Тоді точка $f(a)$ буде теж нерухомою для f^n , оскільки $f^n(f(a)) = f(f^n(a)) = f(a)$. Але за єдиністю, $f(a) = a$ — дві нерухомі мають збігатися. Єдиність нерухомої точки для f доводиться неважко.

1.7 Компактність

Definition 1.7.1 Задано (X, ρ) — метричний простір та $A \subset X$.

Множина A називається **компактом**, якщо

$$\forall \{x_n, n \geq 1\} \subset A : \exists \{x_{n_k}, k \geq 1\} : x_{n_k} \rightarrow x_0, k \rightarrow \infty, \text{ причому } x_0 \in A$$

Якщо прибрати умову $x_0 \in A$, то тоді A називається **передкомпактом**.

Proposition 1.7.2 Задано (X, ρ) — метричний простір та $A \subset X$.

A — компакт $\iff \forall B \subset A$, де B — нескінченна множина, існує $x_0 \in A$ — гранична точка B .

Якщо прибрати умову $x_0 \in A$, то вже мова буде йти про передкомпакт.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: A — компакт. Нехай $B \subset A$ — нескінченна множина. Оберемо послідовність $\{x_n, n \geq 1\} \subset B \subset A$, де всі вони між собою різні. Тоді за умовою компактності, існує підпослідовність $x_{n_k} \rightarrow x_0$, причому $x_0 \in A$. Зауважимо, що всі $x_{n_k} \neq x_0$, тож x_0 — гранична точка A . Якби існували $k \in \mathbb{N}$, для яких $x_{n_k} = x_0$, то тоді ми би сформулювали підпослідовність $\{x_{n_{k_m}}\}$ без цих елементів, причому $x_{n_{k_m}} \rightarrow x_0$, а тепер $x_{n_{k_m}} \neq x_0$. Тож все одно x_0 залишається граничною точкою A .

$\Leftarrow$ Дано: $\forall B \subset A$, де B — нескінченна множина, існує $x_0 \in A$ — гранична точка B . Отже, нехай $\{x_n, n \geq 1\} \subset A$ — довільна послідовність. У нас є два варіанти:

I. Множина значень $\{x_n\}$ — скінченна. Тоді можна відокремити стаціонарну підпослідовність.

II. Множина значень $\{x_n\}$ — нескінченна, всі ці значення покладемо в множину $B \subset A$. Тоді за умовою, існує $x_0 \in A$ — гранична точка B . Отже, $B \cap B(x_0; \varepsilon)$ містить нескінченне число точок для всіх $\varepsilon > 0$. Зокрема:

$\varepsilon = 1 \implies B \cap B(x_0; 1)$ має нескінченну множину. Там існує елемент $y_1 \in B \cap B(x_0; 1)$, тобто це одне зі значень послідовності. Тобто $y_1 = x_{n_1}$.

$\varepsilon = \frac{1}{2} \implies B \cap B\left(x_0; \frac{1}{2}\right)$ має нескінченну множину. Там існує елемент $y_2 \in B \cap B\left(x_0; \frac{1}{2}\right)$, тобто це одне зі значень послідовності. Тобто $y_2 = x_{n_2}$. Причому можна обрати $x_{n_2} > x_{n_1}$. Якби так не було можливо, то $B \cap B\left(x_0; \frac{1}{2}\right)$ була б скінченною множиною, що не наше випадок.

$\vdots$

Побудували підпослідовність $\{x_{n_k}, k \geq 1\}$, причому $\rho(x_0, x_k) < \frac{1}{k}$. Тож при $k \rightarrow \infty$ матимемо $x_{n_k} \rightarrow x_0 \in A$. Отже, A — компакт.

Випадок передкомпакту повторюється майже все слово в слово. ■

Proposition 1.7.3 Задано (X, ρ) — компактний метричний простір. Тоді (X, ρ) — повний.

Proof.

Дійсно, нехай $\{x_n\} \subset X$ — фундаментальна. Оскільки X — компакт, то існує збіжна підпослідовність $\{x_{n_k}\}$, де $x_{n_k} \rightarrow x, x \in X$. Ми вже знаємо, що тоді й сама послідовність $\{x_n\} \rightarrow x$ буде збіжною. Отже, (X, ρ) — повний метричний простір. ■

Definition 1.7.4 Задано (X, ρ) — метричний простір та $A \subset X$.

Множина A називається **обмеженою**, якщо

$$\exists R > 0 : A \subset B(a; R)$$

Definition 1.7.5 Задано (X, ρ) — метричний простір та $A \subset X$. Множина A називається **цілком обмеженою**, якщо

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists C_\varepsilon = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} : A \subset \bigcup_{x \in C_\varepsilon} B(x; \varepsilon)$$

До речі, C_ε , для якої виконана $A \subset \bigcup_{x \in C_\varepsilon} B(x; \varepsilon)$, називається **скінченною ε -сіткою**.

Тобто A — цілком обмежена, коли вона має скінченну ε -сітку для всіх $\varepsilon > 0$.

Proposition 1.7.6 Задано (X, ρ) — метричний простір та A — цілком обмежена множина. Тоді A — обмежена.

Proof.

Для множини A існує 1-сітка, тобто $C_1 = \{x_1, \dots, x_n\}$, для якої $A \subset \bigcup_{x \in C_1} B(x; 1)$.

Зафіксуємо $y \in X$ та оберемо $R = 1 + \max_{x \in C_1} \rho(x, y)$. Тоді хочемо довести, що $A \subset B(y; R)$.

Нехай $a \in A$, тоді вже $a \in B(x; 1)$ при деякому $x \in C_1$, а також $\rho(a; x) < 1$. Звідси $\rho(a; y) \leq \rho(a; x) + \rho(x; y) < 1 + \max_{x \in C_1} \rho(x; y) = R$.

Отже, A — обмежена. ■

Remark 1.7.7 Не обов'язково вимагати, щоб A була цілком обмежена. Подивившись на це доведення, ми можемо лише вимагати, щоб A мала хоча б одну ε -сітку — тоді буде обмеженість A .

Theorem 1.7.8 Критерій Фреше-Хаусдорфа

Нехай (X, ρ) — повний метричний простір та $A \subset X$.

A — цілком обмежена $\iff A$ — передкомпакт.

Remark 1.7.9 Під час доведення $\Leftarrow$ нам не потрібна буде умова повноти метричного простору.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: A — цілком обмежена. Нехай $\{a_n, n \geq 1\} \subset A$ — довільна послідовність.

Оберемо 1-сітку C_1 , де $A \subset \bigcup_{x \in C_1} B(x; 1)$. В одному з цих шарів нескінченне число членів послідовності, той шар позначу за $B(y_1; 1)$; маємо підпослідовність $\{a_{n_k}, k \geq 1\} \subset B(y_1; 1)$.

Оберемо $\frac{1}{2}$ -сітку $C_{\frac{1}{2}}$, де $A \subset \bigcup_{x \in C_{\frac{1}{2}}} B\left(x; \frac{1}{2}\right)$. В одному з цих шарів нескінченне число членів підпослідовності, той шар позначу за $B\left(y_2; \frac{1}{2}\right)$; маємо підпідпослідовність $\{a_{n_{k_m}}, k \geq 1\} \subset B\left(y_2; \frac{1}{2}\right)$.

$\vdots$

Отримали послідовність центрів $\{y_n, n \geq 1\}$, доведемо її фундаментальність.

$\rho(y_n, y_m) \leq \rho(y_n, a_*) + \rho(a_*, y_m) < \frac{1}{n} + \frac{1}{m} \rightarrow 0$ при $n, m \rightarrow \infty$. У даному випадку ми підібрали елемент $a_* \in B\left(\frac{1}{n}; y_n\right) \cap B\left(\frac{1}{m}; y_m\right)$.

Тепер розглянемо підпослідовність $\{a_{n_p}, p \geq 1\}$, яка будується таким чином: беремо перший елемент з $\{a_{n_k}\}$ (це наше a_{n_1}), потім перший елемент з $\{a_{n_{k_m}}\}$ (це наше a_{n_2}), ... Доведемо, що $\{a_{n_p}, p \geq 1\}$ — фундаментальна. Дійсно,

$$\rho(a_{n_p}, a_{n_t}) \leq \rho(a_{n_p}, y_p) + \rho(y_p, y_t) + \rho(y_t, a_{n_t}) < \frac{1}{p} + \frac{1}{t} + \rho(y_p, y_t) \rightarrow 0, t, p \rightarrow \infty$$

Оскільки (X, ρ) — повний, то звідси $\{a_{n_p}, n \geq 1\}$ — збіжна підпослідовність. Довели, що A — передкомпакт.

$\Leftarrow$ Дано: A — передкомпакт.

Припустимо, що A — це є цілком обмеженою. Тобто для деякого $\varepsilon > 0$ не існує ε -сітки. Нехай $x_1 \in A$. Тоді існує $x_2 \in A$, для якої $\rho(x_1, x_2) \geq \varepsilon$ (інакше якби для кожної $x_2 \in A$ була б $\rho(x_1, x_2) < \varepsilon$, то ми би знайшли ε -сітку $\{x_1\}$, що суперечить умові).

Далі існує $x_3 \in A$, для якої $\rho(x_1, x_3) \geq \varepsilon$ та $\rho(x_2, x_3) \geq \varepsilon$ (аналогічно якби для кожної $x_3 \in A$ ці два нерівності не виконувалися би, то ми би знайшли один з трьох ε -сіток: $\{x_1\}$ або $\{x_2\}$ або $\{x_1, x_2\}$).

⋮

Побудували послідовність $\{x_n, n \geq 1\} \subset A$, для якої справедлива $\rho(x_n, x_m) \geq \varepsilon$ при всіх $n \neq m$. За умовою передкомпактності, існує $\{x_{n_k}, n \geq 1\}$, для якої $x_{n_k} \rightarrow x_0$. Водночас звідси ми отримаємо, що існують номери K_1, K_2 , для яких $\rho(x_{n_{K_1}}, x_{n_{K_2}}) \leq \rho(x_{n_{K_1}}, x_0) + \rho(x_0, x_{n_{K_2}}) < \varepsilon$. Суперечність! Отже, A все ж таки має бути цілком обмеженою. ■

Theorem 1.7.10 Задано (X, ρ) — метричний простір та $A \subset X$.

A — компакт $\iff$ для кожного відкритого покриття A можна виділити скінченне підпокриття.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: A — компакт.

Припустимо, що існує відкрите покриття $\{U_\alpha\}$ множини A , від якої не можна відокремити скінченне підпокриття. Оскільки A — компакт, то A — цілком обмежена. Значить, існує 1-сітка C_1 (причому можна підібрати так, щоб $C_1 \subset A$), для якої $A \subset \bigcup_{x \in C_1} B(x; 1)$, або можна переписати як

$A \subset \bigcup_{x \in C_1} A \cap B(x; 1)$. Серед множин $A \cap B(x; 1)$ існує одна з них, яка не покривається скінченням

чином множинами $\{U_\alpha\}$. Дану множину позначу за A' .

Сама множина A' — також цілком обмежена, тож існує $\frac{1}{2}$ -сітка $C_{\frac{1}{2}}$ (знову підберемо так, щоб

$C_{\frac{1}{2}} \subset A'$), для якої виконано $A' \subset \bigcup_{x \in C_{\frac{1}{2}}} A' \cap B\left(x; \frac{1}{2}\right)$. Знову ж таки, серед $A' \cap B\left(x; \frac{1}{2}\right)$ існує одна

з них, що не покривається скінченням чином множинами $\{U_\alpha\}$. Дану множину позначу за A'' .

⋮

Продовжуючи процедуру, отримаємо набір куль $B_n = B\left(x_n; \frac{1}{n}\right)$, де центр $x_n \in B_{n-1} \cap A$. По-значимо $\overline{B_n \cap A} = K_n$ та зауважимо, що K_n — це замкнена куля в метричному підпросторі A , де $R = \frac{1}{2^n}$ та центр $y_n \in K_{n-1}$.

Подвоїмо радіуси кожної з цих куль. Тоді отримаємо послідовність вкладених куль, які стягуються. Оскільки A — компакт, то (A, ρ_A) — повний метричний простір, тож за теоремою Кантора, існує $a \in A$ — спільна точка цих куль. Зважаючи на покриття множини A , отримаємо $a \in U_{\alpha_0}$ при деякому α_0 . Оскільки U_{α_0} — відкрита, то існує куля $B(z, \delta) \subset U_{\alpha_0}$. Ми можемо підібрати завжди такий $N \in \mathbb{N}$, щоб було виконано $\frac{1}{N} < \frac{\delta}{2}$, тоді звідси $K_n \subset B(z; \delta) \subset U_{\alpha_0}$. Таким чином, K_n була покрита лише однією множиною із $\{U_\alpha\}$, проте ми обирали такі кулі (на початку), які не допускали скінченне підпокриття. Суперечність!

$\Leftarrow$ Дано: кожне покриття A має скінченне підпокриття.

Припустимо, що A — не компакт, тобто існує послідовність $\{x_n, n \geq 1\} \subset A$, що не має часткових границь. Тоді кожний відкритий окіл $U_a, a \in A$, містить скінченну кількість членів послідовності $\{x_n\}$ (якби існував окіл U_a із нескінченним числом членів послідовності, то a стала би граничною точкою, що неможливо). Набір $\{U_a, a \in A\}$ — відкрите покриття множини A . За умовою, існує скінченне підпокриття $\{U_{a_1}, \dots, U_{a_n}\}$ множини A , але тоді $A \subset \bigcup_{i=1}^n U_{a_i}$, де праворуч — скінченна множина; ліворуч — нескінченна в силу нескінченності послідовності $\{x_n\}$ — суперечність! ■

Corollary 1.7.11 Задано $(X, \rho), (Y, \tilde{\rho})$ — два метричних простори та $f: X \rightarrow Y$ — неперервне відображення. Відомо, що X — компакт. Тоді $f(X)$ — компакт.

Proof.

Маємо $\{U_\alpha\}$ — відкрите покриття $f(X)$. Тоді $\{f^{-1}(U_\alpha)\}$ — відкрите покриття X , але за компактністю, можна виділити скінченне підпокриття $\{f^{-1}(U_1), \dots, f^{-1}(U_m)\}$, тоді звідси $\{U_1, \dots, U_m\}$ буде скінченням підпокриттям $f(X)$. ■

Corollary 1.7.12 Задано (X, ρ) — метричний простір та $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ — числова неперервна функція. Відомо, що X — компакт. Тоді f — обмежена та досягає найбільшого та найменшого значень.

Theorem 1.7.13 Задано $(X, \rho), (Y, \tilde{\rho})$ — два метричних простори та $f: X \rightarrow Y$ — неперервне, причому X — компакт. Тоді f — рівномірно неперервне.

Proof.

!Припустимо, що $\exists \varepsilon > 0 : \forall \delta > 0 : \exists x, y \in X : \rho(x, y) < \delta$, але $\bar{\rho}(f(x), f(y)) \geq \varepsilon$.

Оберемо $\delta = \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N}$, тоді утвориться послідовність $\{x_n\}, \{y_n\} \subset X$. Оскільки X — компакт, то відокремимо збіжні підпослідовності $\{x_{n_k}\}, \{y_{n_k}\}$. Але оскільки $\rho(x_{n_k}, y_{n_k}) < \frac{1}{n_k}$, то звідси випливає $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} y_{n_k}$. Із іншого боку, $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) \neq \lim_{k \rightarrow \infty} f(y_{n_k})$, оскільки виконана нерівність $\bar{\rho}(f(x_{n_k}), f(y_{n_k})) \geq \varepsilon$. Суперечність! ■

1.8 Теорема Стоуна-Ваєрштраса

Надалі будемо розглядати компактний метричний простір (X, ρ) та метричний простір $(C(X), \sigma)$ — простір неперервних функцій із метрикою $\sigma(f, g) = \max_{x \in X} \|f(x) - g(x)\|$. Причому даний метричний простір теж повний (це аналогічно доводиться).

Definition 1.8.1 Множина $A \subset C(X)$ називається **алгеброю**, якщо $\forall f, g \in A, \forall \alpha \in \mathbb{R}$:

$$\alpha f, f + g, f \cdot g \in A$$

Definition 1.8.2 Нехай $A \subset C(X)$ — алгебра.

Алгебра A **відділяє точки** множини X , якщо

$$\forall x, y \in X : x \neq y : \exists f \in A : f(x) \neq f(y)$$

Theorem 1.8.3 Теорема Стоуна-Ваєрштраса

Задано (X, ρ) — компактний метричний простір та $(C(X), \sigma)$ — простір неперервних дійсних функцій, заданий вище. Маємо $A \subset C(X)$. Про неї відомо, що

- 1) A — алгебра, яка відділяє точки множини X ;
- 2) функція f , яка визначена як $f(x) = 1, \forall x \in X$, належить A .

Тоді множина A скрізь щільна в $(C(X), \sigma)$.

Proof.

Ми хочемо довести, що $\bar{A} = C(X)$.

Нехай $f \in A$. Хочемо довести, що $|f| \in \bar{A}$. У курсі мат. аналізу ми доводили теорему Ваєрштраса про наближення функції многочленом. Зокрема для функції $g(t) = \sqrt{t}, t \in [0, 1]$ маємо, що $\forall \varepsilon > 0 : \exists P_\varepsilon$ — многочлен від $t : |\sqrt{t} - P_\varepsilon(t)| < \varepsilon$. Тоді $\forall x \in X$:

$$\left| \frac{|f(x)|}{\|f\|} - P_\varepsilon \left(\frac{f^2(x)}{\|f\|^2} \right) \right| = \left| \sqrt{\frac{|f(x)|^2}{\|f\|^2}} - P_\varepsilon \left(\frac{f^2(x)}{\|f\|^2} \right) \right| < \varepsilon.$$

Оскільки $f \in A$, то в силу алгебри $\frac{f^2}{\|f\|} \in A$. Оскільки P_ε — многочлен, то $P_\varepsilon \circ \frac{f^2}{\|f\|} \in A$. Ми знайшли

$$P_\varepsilon \circ \frac{f^2}{\|f\|^2} \in A, \text{ для якої } \left\| \frac{|f|}{\|f\|} - P_\varepsilon \circ \frac{f^2}{\|f\|^2} \right\| < \varepsilon. \text{ Отже, } \frac{|f|}{\|f\|} \text{ — гранична точка, тобто } \frac{|f|}{\|f\|} \in \bar{A}.$$

Відомо знову з мат. аналізу, що для всіх $a, b \in \mathbb{R}$ ми маємо такі рівності:

$$\max\{a, b\} = \frac{1}{2}(a + b + |a - b|) \quad \min\{a, b\} = \frac{1}{2}(a + b - |a - b|).$$

Значить, маючи $f, g \in A$ та маючи результат вище, отримаємо $\max\{f, g\}, \min\{f, g\} \in \bar{A}$.

Оберемо $x, y \in X$ так, що $x \neq y$. Тоді існує функція $g \in A$, для якої $g(x) \neq g(y)$. Далі покладемо нову функцію $f(z) = \alpha + \frac{\beta - \alpha}{g(y) - g(x)}(g(z) - g(x)), z \in X, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Тоді звідси $f \in A$ (ми тут користуємося пунктом 2), щоб це показати, причому $f(x) = \alpha, f(y) = \beta$.

Отже, що ми довели щойно: $\forall x, y \in X : x \neq y, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} : \exists f \in A : f(x) = \alpha, f(y) = \beta$.

Нехай $f \in C(X)$ та $\varepsilon > 0$. Зафіксуємо $x \in X$, для $z \in X$ покладемо $\alpha = f(x), \beta = f(z)$. Тоді за щойно доведеним, існує $h_z \in A$, для якої $h_z(x) = \alpha = f(x)$ та $h_z(z) = \beta = f(z)$.

Оскільки $h_z - f \in C(X)$, то за означенням, $\exists \delta_z > 0 : \forall y \in B(z, \delta_z) : h_z(y) - f(y) < \varepsilon$. Сім'я множин $\{B(z, \delta_z) \mid z \in X\}$ — відкрите покриття компактої множини X . Отже, ми можемо взяти скінченне підпокриття $\{B(z_k, \delta_{z_k}) \mid k = \overline{1, n}\}$.

Визначимо функцію $g_x(y) = \min_{1 \leq k \leq n} \{h_{z_k}(y)\}, y \in X$. Зауважимо, що по-перше, $g_x \in \bar{A}$; по-друге, $g_x(x) = f(x)$; по-третє, $\forall y \in X : g_x(y) - f(y) < \varepsilon$.

Оскільки $g_x - f \in C(X)$, то за означенням, $\exists \delta_x > 0 : \forall y \in B(x, \delta_x) : g_x(y) - f(y) > -\varepsilon$. Сім'я множин $\{B(x, \delta_x) \mid x \in X\}$ — відкрите покриття компактної множини X . Отже ми можемо взяти скінченне підпокриття $\{B(x_k, \delta_{x_k}) \mid k = \overline{1, m}\}$.

Визначимо функцію $h(y) = \max_{1 \leq k \leq m} g_{x_k}(y), y \in X$. Тоді $h \in \bar{A}$, причому також $\forall y \in X :$

$f(y) - \varepsilon \leq h(y) \leq f(y) + \varepsilon$. Для будь-якої функції $f \in C(X)$ ми знайшли $h \in A$, для якої $\|h - f\| < \varepsilon$. Отже, $\bar{A} = C(X)$. ■

1.9 Теорема Арцела-Асколі

Definition 1.9.1 Сім'я функції $\mathcal{F} \subset C(X)$ називається **рівномірно обмеженою**, якщо

$$\exists M > 0 : \forall x \in X, \forall f \in \mathcal{F} : |f(x)| \leq M$$

Definition 1.9.2 Сім'я функції $\mathcal{F} \subset C(X)$ називається **одностайно неперервними**, якщо

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall f \in \mathcal{F}, \forall x, y \in X : \rho(x, y) < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

Theorem 1.9.3 Теорема Арцела-Асколі

Задано X — компактний метричний простір. Нехай послідовність $(f_n)_{n=1}^\infty \subset C(X)$ рівномірно обмежена та одностайно неперервна. Тоді $\exists (f_{n_k})_{n=1}^\infty$ — рівномірно збіжна підпослідовність.

Proof.

Оскільки X — компакт, то X — сепарабельний автоматично (TODO: подивитися, чи є таке твердження). Цю скрізь щільну зліченну множину позначу за $S = \{x_1, x_2, \dots\}$.

Розглянемо послідовність $(f_n(x_1))_{n=1}^\infty$, яка обмежена. Тоді за теоремою Больцано-Вейєрштраса, існує збіжна підпослідовність $(f_{1,n}(x_1))_{n=1}^\infty$.

Розглянемо послідовність $(f_{1,n}(x_2))_{n=1}^\infty$, яка обмежена. Аналогічно існує збіжна підпослідовність $(f_{2,n}(x_2))_{n=1}^\infty$.

⋮

Тепер розглянемо діагональну послідовність $(f_{n,n})_{n=1}^\infty$. Зауважимо, що вона збігається в кожній точці $x \in S$. Дійсно, $(f_{n,n})_{n=1}^\infty \subset (f_{k,n})_{n=1}^\infty$, а остання послідовність збігається в точці x_k .

Для зручності цю послідовність перепозначу за $(f_n)_{n=1}^\infty$. Доведемо, що вона рівномірно фундаментальна, внаслідок чого буде рівномірно збіжною. За одностайною неперервністю, $\exists \delta > 0 : \forall x, y, \forall n : \rho(x, y) < \delta \implies |f_n(x) - f_n(y)| < \frac{\varepsilon}{3}$.

Нехай $x \in X$ та $M > \frac{1}{\delta}$. Розглянемо $n, m > M$, тоді

$$|g_n(x) - g_m(x)| \leq |g_n(x) - g_n(s)| + |g_n(s) - g_m(s)| + |g_m(s) - g_m(x)| < 3 \cdot \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon.$$

У цьому випадку $s \in S$ така точка, що $\rho(x, s) < \delta$. Ми можемо це знайти в силу скрізь щільності. (TODO: довести). ■

2 Початок функціонального аналізу

2.1 Лінійні нормовані простори

Definition 2.1.1 Нехай L — лінійний простір над $\mathbb{R}$ або $\mathbb{C}$.

Функцію $\|\cdot\|: L \rightarrow \mathbb{R}$ називається **нормою**, якщо виконуються умови:

- 1) $\forall x \in L: \|x\| \geq 0, \quad \|x\| = 0 \iff x = 0;$
- 2) $\forall x \in L: \forall \alpha \in \mathbb{R} \text{ або } \mathbb{C}: \|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|;$
- 3) $\forall x, y \in L: \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$

Тоді пару $(L, \|\cdot\|)$ назвемо **нормованим простором**.

Функцію $\|\cdot\|: L \rightarrow \mathbb{R}$ ще називають **переднормою**, якщо всі умови виконуються, окрім умови

$$\|x\| = 0 \iff x = 0.$$

Corollary 2.1.2 Нехай $(L, \|\cdot\|)$ — нормований простір. Тоді $\forall x, y \in L:$

$$\|x - y\| \geq |\|x\| - \|y\||.$$

Вказівка: $\|x\| = \|x + y - y\|$ та $\|y\| = \|y + x - x\|$.

Proposition 2.1.3 Нехай $(L, \|\cdot\|)$ — нормований простір. Тоді (L, ρ) — метричний простір разом з метрикою

$$\rho(x, y) = \|x - y\|.$$

Вправа: перевірити три аксіоми.

Remark 2.1.4 У такому разі справедливі додаткові властивості для заданої метрики:

- 1) $\forall x, y, z \in L: \rho(x + z, y + z) = \rho(x, y)$ (інваріантність по відношенню до зсуву);
- 2) $\forall x, y \in L, \forall \alpha \in \mathbb{R} \text{ або } \mathbb{C}: \rho(\alpha x, \alpha y) = |\alpha| \rho(x, y)$ (однорідність).

Example 2.1.5 Зокрема дані простори будуть нормованими:

- 1) $\mathbb{R}, \quad \|x\| = |x|;$
- 2) $\mathbb{R}^n, \quad \|\vec{x}\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$ або навіть $\|\vec{x}\| = |x_1| + \dots + |x_n|;$
- 3) $C([a, b]) \quad \|f\| = \max_{t \in [a, b]} |f(t)|;$
- 4) $L_p(X, \lambda), \quad \|f\|_p = \left(\int_X |f|^p d\lambda \right)^{\frac{1}{p}}.$

Тому всі вони будуть автоматично метричними просторами із метрикою, що вище задана.

Example 2.1.6 Дискретний простір (X, d) — метричний, але не нормований.

Definition 2.1.7 Нехай $(L, \|\cdot\|)$ — лінійний нормований простір (оскільки в неї запроваджена метрика, то можна щось казати про присутність чи відсутність повноти метричного простору). Повний нормований простір називається **банаховим**.

Example 2.1.8 Зокрема нормований простір $C([a, b])$ зі стандартною нормою

$$\|x\| = \max_{t \in [a, b]} |x(t)|$$

буде банаховим. Це впливає з курсу математичного аналізу 2 семестру.

Example 2.1.9 Задамо підпростір $C([0, 1])$ із нормою із $L_2([0, 1], \lambda_1)$, де λ_1 — міра Лебега. Доведемо, що в такому разі $C([0, 1])$ уже не буде банаховим.

Розглянемо таку функціональну послідовність $\{x_n, n \geq 1\} \subset C([0, 1])$, що задається таким чином:

$$x_n(t) \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} - \frac{1}{n} \\ \frac{nx}{2} - \frac{n}{4} + \frac{1}{2}, & \frac{1}{2} - \frac{1}{n} \leq x \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{n} \\ 1, & \frac{1}{2} + \frac{1}{n} \leq x \leq 1 \end{cases}.$$

Це набір функцій, де похила частина зі збільшенням n перетворюється в вертикальну лінію. Зауважимо, що якщо взяти поточкову границю, то отримаємо $x(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \\ 1, & \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases}$. При цьому

$$\|x_n - x\|_2^2 = \int_{[0,1]} |x_n - x|^2 d\lambda_1 = \int_0^1 |x_n(t) - x(t)|^2 dt = \dots = \frac{1}{6n} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty.$$

Отже, $\{x_n\}$ в просторі $C([0, 1])$ із нормою L_2 збігається до точки $x \notin C([0, 1])$, але при цьому буде граничною для $C([0, 1])$. Тобто $C([0, 1])$ не буде замкненим, тож $C([0, 1])$ — не повний, або не банахів.

Proposition 2.1.10 Нехай $(L, \|\cdot\|)$ — нормований простір. Тоді норма $\|\cdot\|: L \rightarrow \mathbb{R}$ — неперервна. Вказівка: оскільки $\rho(x, y) = \|x - y\|$, то звідси $\|x\| = \rho(x, 0)$. Дали **Prp. 1.6.7**.

Definition 2.1.11 Нехай $(X, \|\cdot\|_1)$ та $(X, \|\cdot\|_2)$ — два нормовані простори. Ці два нормовані простори називаються **ізотричними**, якщо

$$\exists A: X \rightarrow Y \text{ — ізоморфізм між просторами : } \|Ax\|_2 = \|x\|_1$$

Приклади ізотрич будуть нижче, починаючи з **Prp. 3.1.16**. Вимушений був їх розкидати по сторінках, оскільки треба дещо попередньо довести.

Remark 2.1.12 Ізоморфізм L — автоматично ізотрич, це впливає зі збереження норми. Саме тому слово "ізотричні" в означенні вище виправдане.

Remark 2.1.13 У метричному просторі був критерій Кантора, який я переформулюю нижче під нормований простір. У випадку нормованих просторів не обов'язково вимагати умову $r_n \rightarrow 0$.

Theorem 2.1.14 $(L, \|\cdot\|)$ — банахів $\iff$ виконується умова Кантора (тобто будь-яка послідовність замкнених куль, що стягується, має непорожній перетин).

2.2 Ряди в нормованому просторі

Definition 2.2.1 Нехай $(L, \|\cdot\|)$ — нормований простір та $(x_n)_{n=1}^\infty \subset L$.

Вираз $S_k = \sum_{n=1}^k x_n$ називають **частковою сумою**. Припустимо, що послідовність часткових сум

збігається — тоді границю позначають за ряд $\sum_{n=1}^\infty x_n$, а сам ряд називають **збіжним**.

Definition 2.2.2 Ряд $\sum_{n=1}^\infty x_n$ називатимемо **абсолютно збіжним**, якщо

$$\sum_{n=1}^\infty \|x_n\| \text{ — збіжний.}$$

Proposition 2.2.3 Нехай $(L, \|\cdot\|)$ — нормований простір. Відомо, що $\sum_{n=1}^\infty x_n$ — абсолютно збіжний.

Тоді послідовність часткових сум — фундаментальна.

Proof.

Справді, ми маємо наступний ланцюг:

$$\|S_{k+p} - S_k\| = \left\| \sum_{n=k+1}^{k+p} x_n \right\| \leq \sum_{n=k+1}^{k+p} \|x_n\|.$$

Оскільки $\sum_{n=1}^\infty x_n$ — абсолютно збіжний, то він фундаментальний, тому ось ця остання сума в ланцюгу прямуватиме до нуля. ■

Proposition 2.2.4 Нехай $(L, \|\cdot\|)$ — нормований простір. Тоді

$$L \text{ — банахів} \iff \text{кожний абсолютно збіжний ряд — збіжний.}$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: L — банахів. Тоді кожна фундаментальна послідовність — збіжна. Якщо маємо абсолютно збіжний ряд, то послідовність часткових сум — фундаментальна, тому збіжна. Тобто ряд — збіжний.

$\Leftarrow$ Дано: кожний абсолютно збіжний ряд — збіжний. Розглянемо фундаментальну послідовність $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset L$. Тоді для кожного $k \in \mathbb{N}$ знайдеться N_k такий, що $\forall m, n \geq N_k : \|x_m - x_n\| < 2^{-k}$. Розглянемо числа вигляду

$$n_k = N_1 + \dots + N_k,$$

такі числа строго зростають, а також $n_k \geq N_k$, тому тепер детальніше розглянемо підпослідовність $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$. Звідси випливає, що для кожного $k \geq 1$

$$\|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\| < 2^{-k}.$$

Дана нерівність дозволить сказати, що ряд $\sum_{k=1}^{\infty} (x_{n_{k+1}} - x_{n_k})$ — збіжний абсолютно, а тому й просто збіжний. Послідовність часткових сум $(S_m)_{m \in \mathbb{N}}$ даного ряду має вигляд

$$S_m = x_{n_{m+1}} - x_{n_1}.$$

Отже, якщо спрямувати $m \rightarrow \infty$, то одержимо, що $(x_{n_{m+1}})_{m \in \mathbb{N}}$ — збіжна підпослідовність $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, але тоді вся послідовність $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ стане збіжною. Отже, L — банахів. ■

2.3 Коротко про топологічні векторні простори

Definition 2.3.1 Векторний простір E називається **топологічним**, якщо існує на ній така топологія, що

$$\begin{aligned} +: E \times E &\rightarrow E \text{ — неперервна операція;} \\ \cdot \lambda: \mathbb{R}(\mathbb{C}) \times E &\rightarrow E \text{ — неперервна операція.} \end{aligned}$$

На множині $\mathbb{R}, \mathbb{C}$ розглядається стандартна топологія.

Тимчасово позначу два відображення по-нормальному, маємо $\text{add}: E \times E \rightarrow E$ та $\text{scalar}: \mathbb{R} \times E \rightarrow E$.

Theorem 2.3.2 Задано L — нормований простір. Тоді L — топологічний векторний простір.

Proof.

Оскільки L — нормований простір, то він метричний, а кожний метричний простір індукуює топологію. Оберемо саме ту топологію $\tau_{\|\cdot\|}$ та доведемо, що на ній лінійні операції — неперервні.

Оберемо будь-яку точку $(x, y) \in L \times L$ та покажемо неперервність операції $+$ на неї.

Нехай $B(x + y; r)$ — окіл $x + y$. Хочемо довести, що існує окіл U точки (x, y) , щоб виконувалось $+(U) \subset B(x + y; r)$. Маємо $z_1 + z_2 \in +(U)$, тоді хочемо $z_1 + z_2 \in B(x + y; r)$. Тобто потрібно $\|z_1 + z_2 - x - y\| \leq \|z_1 - x\| + \|z_2 - y\| < r$. Якщо розглядати точки $z_1 \in B\left(x; \frac{r}{2}\right)$ та $z_2 \in B\left(y; \frac{r}{2}\right)$,

то отримаємо бажане. Можемо покласти $U = B\left(x; \frac{r}{2}\right) \times B\left(y; \frac{r}{2}\right)$.

Якщо взяти інший окіл V точки $x + y$, то ми можемо охопити кулею $B(x + y; r) \supset V$.

Отже, $+$ — неперервна операція.

Оберемо будь-яку точку $(\lambda, x) \in \mathbb{R} \times L$ та покажемо неперервність операції $\cdot \lambda$ на неї.

Нехай $B(\lambda x; r)$ — окіл точки λx . Хочемо довести, що існує окіл U точки (λ, x) , щоб виконувалось $\cdot \lambda(U) \subset B(\lambda x; r)$. Маємо $\mu z \in \cdot \lambda(U)$, тоді хочемо $\mu z \in B(\lambda x; r)$. Тобто потрібно $\|\lambda x - \mu z\| < r$.

$$\|\lambda x - \mu z\| \leq |\lambda - \mu| \|x\| + |\mu| \|x - z\| \leq |\lambda - \mu| (\|x\| + \|z - x\|) + |\lambda| \|z - x\| \stackrel{<}{\leq}.$$

Оберемо таке $R > 0$, щоб виконувалось $R^2 + R(\|x\| + |\lambda|) < r$. Такий R точно існує, якщо розв'язати нерівність. Тоді якщо $U = B(x, R) \times B(\lambda, R)$ та $(\mu, z) \in U$, тоді отримуємо

$$\stackrel{<}{\leq} R(\|x\| + R) + |\lambda| R = R^2 + R(\|x\| + |\lambda|) < r.$$

Якщо взяти інший окіл V точки λx , то ми можемо охопити кулею $B(\lambda x; r) \supset V$.

Отже, $\cdot \lambda$ — неперервна операція. ■

2.4 Факторизація напівнорми

Задано L — простір із напівнормою $\|\cdot\|$. Позначимо $M = \{x \in L : \|x\| = 0\}$.

Lemma 2.4.1 M — підпростір векторного простору L .

Як було в лінійній алгебрі, встановимо відношення еквівалентності $x \sim y \iff x - y \in M$ на векторному просторі L . Ми вже знаємо, що L/M буде векторним простором, де задаються операції так:

$$(x_1 + M) + (x_2 + M) = (x_1 + x_2) + M;$$

$$\lambda(x + M) = \lambda x + M.$$

Тепер уведемо функцію $\|\cdot\|_{L/M}$ ось таким чином: $\|x + M\|_{L/M} \stackrel{\text{def.}}{=} \|x\|_L$. Доведемо, що це буде задавати норму на L/M .

Спочатку доведемо коректність означення. Дійсно, нехай $x + M = y + M$. Тоді звідси $x - y \in M$. Зауважимо, що

$$|\|x\|_L - \|y\|_L| \leq \|x - y\|_L = 0 \implies \|x\|_L = \|y\|_L \implies \|x + M\|_{L/M} = \|y + M\|_{L/M}.$$

Щодо властивостей номри. Це вже точно напівнома. Тобто залишилося довести, що $\|x + M\|_{L/M} = 0 \iff x + M = M$.

$$\|x + M\|_{L/M} = 0 \implies \|x\| = 0 \implies x \in M \implies x + M = M.$$

Example 2.4.2 Маємо простір $C^1([a, b])$ із напівнормою $\|x\| = \max_{t \in [a, b]} |x'(t)|$. Зауважимо, що лише

функції $x(t) = \text{const}$ задовольняють умові $\|x\| = 0$. Тобто в нашому випадку підпростір $M = \{x \in C^1([a, b]) : \|x\| = 0\} = \{c \mid c \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}$. Тоді звідси маємо факторпростір $C^1([a, b])/\mathbb{R}$ — функції, що рівні з точністю до константи.

3 Оператори в нормованих просторах

3.1 Обмежені та неперервні лінійні оператори

Definition 3.1.1 Нехай $(X, \|\cdot\|_X), (Y, \|\cdot\|_Y)$ — нормовані простори. Лінійний оператор $A \in \mathcal{L}(X, Y)$ називають **обмеженим**, якщо

$$\exists C > 0 : \forall x \in X : \|Ax\|_Y \leq C\|x\|_X.$$

(надалі ми ці норми розрізняти не будемо, бо буде з контексту зрозуміло).
Позначення: $\mathcal{B}(X, Y)$ — множина всіх обмежених операторів $X \rightarrow Y$.

Remark 3.1.2 Якщо $A \in \mathcal{B}(X, Y)$, то зауважимо, що множина всіх констант, які обмежують оператор, тобто множина

$$\{C > 0 \mid \forall x \in X : \|Ax\| \leq C\|x\|\},$$

буде непорожньою та обмеженою знизу числом 0. Значить, існує нижня точна грань даної множини.

Definition 3.1.3 Нехай X, Y — нормовані простори та $A \in \mathcal{B}(X, Y)$. Нормою оператора A називається величина

$$\|A\| = \inf\{C > 0 \mid \forall x \in X : \|Ax\| \leq C\|x\|\}.$$

Corollary 3.1.4 $\|A\|$ — найменше число, яке обмежує оператор $A \in \mathcal{B}(X, Y)$. Внаслідок чого для кожного оператора $A \in \mathcal{B}(X, Y)$ виконується нерівність

$$\|Ax\| \leq \|A\| \cdot \|x\|, \quad \forall x \in X.$$

(коротше, ось цей інфімум має, насправді кажучи, мінімум.)

Proof.

Дійсно, для кожного $\varepsilon > 0$ існує стала $C_\varepsilon > 0$, для якої $C_\varepsilon < \|A\| + \varepsilon$. Тож для всіх $x \in X$ справедлива нерівність:

$$\|Ax\| \leq C_\varepsilon \|x\| < (\|A\| + \varepsilon)\|x\|.$$

При $\varepsilon \rightarrow 0$ отримуємо бажану оцінку. Таким чином,

$$\|A\| \in \{C > 0 \mid \forall x \in X : \|Ax\| \leq C\|x\|\},$$

тобто інфімум досягається. ■

Theorem 3.1.5 Нехай X, Y — нормовані простори та $A \in \mathcal{B}(X, Y)$. Тоді

$$\|A\| = \sup_{x \in X \setminus \{0\}} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}.$$

Proof.

Уже відомо, що $\forall x \in X : \|Ax\| \leq \|A\|\|x\|$, тоді звідси $\forall x \in X \setminus \{0\} : \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \leq \|A\|$, таким чином

$$\sup_{x \in X \setminus \{0\}} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \leq \|A\|.$$

Залишилося довести, що строга нерівність не допускається.

Припустимо, що $\sup_{x \in X \setminus \{0\}} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} < \|A\|$, тобто існує $\varepsilon > 0$, для якого $\sup_{x \in X \setminus \{0\}} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \|A\| - \varepsilon$. Тоді звідси випливає, що

$$\forall x \in X \setminus \{0\} : \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \leq \|A\| - \varepsilon \implies \forall x \in X : \|Ax\| \leq (\|A\| - \varepsilon)\|x\|.$$

Отже, $\|A\| - \varepsilon$ — це константа, яка обмежує оператор, тоді за означенням норми $\|A\| - \varepsilon \geq \|A\|$, а це — суперечність! ■

Theorem 3.1.6 Нехай X, Y — нормовані простори та $A \in \mathcal{B}(X, Y)$. Тоді

$$\|A\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|.$$

Proof.

Ми доведемо ось такий ланцюг нерівностей:

$$\sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \geq \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\| \geq \sup_{\|x\|=1} \|Ax\| \geq \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}.$$

Оберемо такий $x \neq 0$, щоб $\|x\| \leq 1$. Тоді виконується нерівність $\frac{\|Ax\|}{\|x\|} \geq \|Ax\|$. Таким чином,

$$\sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\| \leq \sup_{\substack{\|x\| \leq 1 \\ x \neq 0}} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \leq \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \|A\|.$$

Зрозуміло, що виконується нерівність $\sup_{\|x\|=1} \|Ax\| \leq \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\|$.

Залишилося довести, що $\sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \leq \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$. Дана нерівність є наслідком того, що для кожного

$x \neq 0$ число $\frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \left\| A \left(\frac{x}{\|x\|} \right) \right\|$ належить множині $\{\|Ax\| \mid \|x\| = 1\}$. ■

Example 3.1.7 Задано лінійний оператор $A: l_2 \rightarrow l_2$ таким чином:

$$A(x_1, x_2, \dots) = (x_2, x_3, \dots).$$

Доведемо, що A — обмежений оператор та знайдемо його норму.

Задаємо, що норма

$$\|(x_1, x_2, \dots)\| = \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 + \dots}$$

Оцінимо оператор:

$$\|A(x_1, x_2, \dots)\| = \|(x_2, x_3, \dots)\| = \sqrt{|x_2|^2 + |x_3|^2 + \dots} \leq \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 + |x_3|^2 + \dots} = 1 \cdot \|(x_1, x_2, \dots)\|.$$

Отже, A — обмежений оператор, бо знайшли константу $C = 1$, що обмежує. Далі,

$$\begin{aligned} \|A\| &= \sup_{\|(x_1, x_2, \dots)\|=1} \|A(x_1, x_2, \dots)\| = \sup_{\|(x_1, x_2, \dots)\|=1} \|(x_2, x_3, \dots)\| \\ &= \sup_{\|(x_1, x_2, \dots)\|=1} \sqrt{|x_2|^2 + |x_3|^2 + \dots} = \sup_{\|(x_1, x_2, \dots)\|=1} \sqrt{1 - |x_1|^2} = 1. \end{aligned}$$

Example 3.1.8 Задано лінійний оператор $A: C([0, 1]) \rightarrow C([0, 1])$ таким чином:

$$(Ax)(t) = \int_0^t \tau x(\tau) d\tau.$$

Доведемо, що A — обмежений оператор та знайдемо його норму. Конкретно в цьому випадку розглядатиметься норма

$$\|f\| = \max_{t \in [0, 1]} |f(t)|.$$

Для початку зробимо оцінку на обмеженість:

$$\begin{aligned} \|Ax\| &= \max_{t \in [0, 1]} \left| \int_0^t \tau x(\tau) d\tau \right| \leq \max_{t \in [0, 1]} \int_0^t |\tau| |x(\tau)| d\tau = \int_0^1 |\tau| |x(\tau)| d\tau \\ &\leq \int_0^1 |\tau| \max_{\tau \in [0, 1]} |x(\tau)| d\tau = \int_0^1 \tau \|x\| d\tau = \|x\| \left[\frac{\tau^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2} \|x\|. \end{aligned}$$

Отже, A — обмежений оператор. Залишилося знайти норму.

Оскільки $\|Ax\| \leq \frac{1}{2} \|x\|$, то звідси випливає $\|A\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\| \leq \frac{1}{2}$. Із іншого боку, оберемо функцію

$x(t) = 1$, для якої $\|x\| = 1$. Тоді отримаємо, що

$$\|Ax\| = \max_{t \in [0, 1]} \left| \int_0^t \tau d\tau \right| = \max_{t \in [0, 1]} \frac{t^2}{2} = \frac{1}{2}.$$

Таким чином, отримаємо $\|A\| = \frac{1}{2}$.

Example 3.1.9 Покажемо, що оператор $A: C^1([0, 1]) \rightarrow C^1([0, 1])$ буде необмеженим:

$$(Af)(t) = f'(t).$$

Оберемо послідовність $f_n = \sin(2\pi nt)$, причому $\|f_n\| = \max_{t \in [0, 1]} |\sin(2\pi nt)| = 1$. Тоді звідси

$$\|Af_n\| = \|2\pi nt \cos(2\pi nt)\| = 2\pi n \|\cos(2\pi nt)\| = 2\pi n \max_{t \in [0, 1]} |\cos(2\pi nt)| = 2\pi n \rightarrow +\infty.$$

Повернемось до питання, чому в лінійній алгебрі (де переважно досліджувалися оператори між скінченновимірними просторами) ми не розглядали обмежені оператори. Бо для таких випадків уже все відомо.

Proposition 3.1.10 Нехай X, Y — нормовані, $\dim X < \infty$ та $A \in \mathcal{L}(X, Y)$. Тоді $A \in \mathcal{B}(X, Y)$.
(отже, всі лінійні оператори між скінченновимірними векторними просторами — обмежені)

Proof.

Дійсно, нехай $\{e_1, \dots, e_n\}$ — базис X , на цьому просторі стоїть норма $\|x\|_2$, тоді

$$\begin{aligned} \|Ax\| &= \|A(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n)\| = \|x_1 A e_1 + \dots + x_n A e_n\| \leq |x_1| \|A e_1\| + \dots + |x_n| \|A e_n\| \\ &\leq \sqrt{|x_1|^2 + \dots + |x_n|^2} \sqrt{\|A e_1\|^2 + \dots + \|A e_n\|^2} = C \|x\|_2. \end{aligned}$$

Якби була інша норма $\|\cdot\|$, то вона еквівалентна $\|\cdot\|_2$, а тому обмеженість зберігається. ■

Theorem 3.1.11 Нехай X, Y — нормовані простори та $A \in \mathcal{L}(X, Y)$. Тоді

$$A \in \mathcal{B}(X, Y) \iff A \text{ — неперервний в точці } 0.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $A \in \mathcal{B}(X, Y)$. Оберемо послідовність $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ так, щоб $x_n \rightarrow 0$. Звідси отримаємо

$$\|Ax_n - A0\| = \|Ax_n\| \leq \|A\| \|x_n\| \rightarrow 0.$$

Отже, $Ax_n \rightarrow A0$ при $n \rightarrow \infty$, що підтверджує неперервність.

$\Leftarrow$ Дано: A — неперервний в точці 0.

Припустимо, що $A \notin \mathcal{B}(X, Y)$, тобто є необмеженим оператором. Тоді для кожного $n \in \mathbb{N}$ існує точка $x_n \in X$, для якої $\|Ax_n\| > n \|x_n\|$ (ясно, що $x_n \neq 0$). Таким чином,

$$\frac{\|Ax_n\|}{\|x_n\|} = \left\| A \left(\frac{x_n}{\|x_n\|} \right) \right\| > n.$$

Для зручності позначу $w_n = \frac{x_n}{\|x_n\|} \in X$, тобто ми вже маємо $\|Aw_n\| > n$. Оскільки відображення

A — неперервне в нулі, то для послідовності $\left(\frac{1}{n} w_n \right)_{n \in \mathbb{N}}$, для якої $\frac{1}{n} w_n \rightarrow 0$ виконується $A \frac{w_n}{n} \rightarrow A0 = 0$ — суперечність в силу нерівності! Бо в нас $\left\| A \frac{w_n}{n} \right\| > 1$. ■

Remark 3.1.12 Насправді, A — неперервний в точці 0 $\iff A$ — неперервний на X .

Сторона $\Leftarrow$ зрозуміла. По стороні $\Rightarrow$ маємо $x_0 \in X$ та припустимо, що $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ — довільна послідовність, де $x_n \rightarrow x_0$. Тоді цілком зрозуміло, що $x_n - x_0 \rightarrow 0$, але за неперервністю в нулі маємо $A(x_n - x_0) = Ax_n - Ax_0 \rightarrow A0 = 0$. Таким чином, $Ax_n \rightarrow Ax_0$.

Theorem 3.1.13 $\mathcal{B}(X, Y)$ буде підпростором $\mathcal{L}(X, Y)$, а також нормованим простором із заданою нормою за означенням вище.

Proof.

Нехай $A, B \in \mathcal{B}(X, Y)$. Тоді дійсно $A + B, \alpha A \in \mathcal{B}(X, Y)$, адже справедливі нерівності:

$$\begin{aligned} \|(A + B)x\| &= \|Ax + Bx\| \leq \|Ax\| + \|Bx\| \leq \|A\| \|x\| + \|B\| \|x\| = (\|A\| + \|B\|) \|x\|; \\ \|(\alpha A)x\| &= |\alpha| \|Ax\| \leq |\alpha| \|A\| \|x\|. \end{aligned}$$

Тепер доведемо, що вищезгадана норма лінійного обмеженого оператора — дійсно норма.
 $\|A\| \geq 0$ — зрозуміло. Також якщо $\|A\| = 0$, то звідси $\|Ax\| \leq \|A\|\|x\| = 0$, тобто $Ax = 0$, причому для всіх $x \in X$; або $A = O$. Навпаки, якщо $A = O$, тобто $\|A\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\| = \sup_{\|x\|=1} \{0\} = 0$.

Ми вже маємо оцінку $\|\alpha Ax\| \leq |\alpha| \|A\| \|x\|$ при всіх $x \in X$, тому й при всіх x з умовою $\|x\| = 1$. Таким чином, $\|\alpha A\| = \sup_{\|x\|=1} \|\alpha Ax\| \leq |\alpha| \|A\|$. Із цієї оцінки випливає, що $\|A\| = \|\alpha^{-1} \alpha A\| \leq |\alpha^{-1}| \|\alpha A\| \implies \|\alpha A\| \geq |\alpha| \|A\|$. Таким чином, $\|\alpha A\| = |\alpha| \|A\|$ (у тому числі при $\alpha = 0$).

Ми вже маємо оцінку $\|(A+B)x\| \leq (\|A\| + \|B\|)\|x\|$ при всіх $x \in X$, тому й при всіх x з умовою $\|x\| = 1$. Таким чином, $\|A+B\| = \sup_{\|x\|=1} \|(A+B)x\| \leq \|A\| + \|B\|$ — третя властивість норми. ■

Proposition 3.1.14 Нехай $A \in \mathcal{B}(X, Y)$, $B \in \mathcal{B}(Y, Z)$. Тоді композиція $BA \in \mathcal{B}(X, Z)$.

Proof.

Можна опиратися на композицію неперервних відображень. Але доведемо обмеженість інакше.

$$\|BAx\| \leq \|B\| \|Ax\| \leq \|B\| \|A\| \|x\|.$$

Звідси, окрім обмеженості, ми бонусом довели оцінку $\|BA\| \leq \|B\| \cdot \|A\|$. ■

Theorem 3.1.15 Якщо Y — банахів, то простір $\mathcal{B}(X, Y)$ — теж банахів.

Proof.

Нехай $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{B}(X, Y)$ — фундаментальна послідовність. Зауважимо, що $(A_n x)_{n \in \mathbb{N}} \subset Y$ — фундаментальна також при всіх $x \in X$. Дійсно, із фундаментальності $(A_n)_{n=1}^\infty$ маємо, що

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists N : \forall n, m \geq N : \|A_n - A_m\| < \varepsilon,$$

але тоді

$$\forall x \in X : \|(A_n - A_m)x\| \leq \|A_n - A_m\| \|x\| < \varepsilon \|x\|,$$

звідси й випливає фундаментальність.

Тоді при кожному $x \in X$ існує $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n x = z_x$. Ми можемо визначити як раз новий оператор

$$A : X \rightarrow Y, \quad Ax = z_x$$

(*границя єдина, тому визначення адекватне*). Залишилося показати, що $A \in \mathcal{B}(X, Y)$ та $A_n \rightarrow A$.

I. *Лінійність.* Дійсно, нехай $x, y \in X$ та $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, тоді

$$A(\alpha x + \beta y) = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n(\alpha x + \beta y) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha A_n x + \beta A_n y) = \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} A_n x + \beta \lim_{n \rightarrow \infty} A_n y = \alpha Ax + \beta Ay.$$

II. *Обмеженість.* Оскільки $(A_n)_{n=1}^\infty$ — фундаментальна, то $(A_n)_{n=1}^\infty$ — обмежена, тобто

$$\exists C > 0 : \forall n \geq 1 : \|A_n\| \leq C.$$

Тоді в силу неперервності норми матимемо

$$\|Ax\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|A_n x\| \leq C \|x\|.$$

III. $A_n \rightarrow A$. Згадаємо нерівність $\|(A_n - A_m)x\| < \varepsilon \|x\|$ при всіх $x \in X$, при всіх $\varepsilon > 0$ та $n, m \geq N$. Спрямуємо $m \rightarrow \infty$, тоді отримуємо $\|(A_n - A)x\| \leq \varepsilon \|x\|$, тому й $\|A_n - A\| \leq \varepsilon < 2\varepsilon$. ■

Наостанок закінчу ось таким твердженням:

Proposition 3.1.16 Простори $\mathcal{B}(\mathbb{R}, X)$ та X задають природну ізометрію. Тому надалі

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}, X) = X.$$

Proof.

⇒ Кожному елементу $y \in X$ поставимо в відповідність відображення $\mathbb{R} \rightarrow F$, яке працює як $\lambda \mapsto \lambda y$ та яке є обмеженим, оскільки $\|\lambda y\| = \|y\| |\lambda|$. Отже, побудували відображення

$$\varphi : X \rightarrow \mathcal{B}(\mathbb{R}, X), \quad \varphi(y) = (\lambda \mapsto \lambda y).$$

Думаю, неважко переконатися, що це лінійне відображення.

⇐ Кожному елементу $f \in \mathcal{B}(\mathbb{R}, X)$ поставимо в відповідність елемент $f(1) \in X$. Отже, побудували відображення

$$\psi: \mathcal{B}(\mathbb{R}, X) \rightarrow X, \quad \psi(f) = f(1).$$

Тут теж нескладно довести, що це — лінійне відображення.

Нарешті, по-перше, зауважимо, що φ, ψ — взаємно оборотні. По-друге, $\|\varphi(y)\| = \|y\|$. Із даної рівності випливає, що φ — бієктивна ізометрія. ■

3.2 Деякі гучні теореми

Тут обговорюються три ключові речі: принцип відкритості відображення, принцип рівномірної обмеженості та принцип замкненості графіка.

Theorem 3.2.1 Теорема про відкрите відображення

Нехай X, Y — банахові простори та $A \in \mathcal{B}(X, Y)$ — сюр'єктивне. Тоді A — відкрите відображення.

Перш ніж доводити цей результат, наведемо одну ключову лему.

Lemma 3.2.2 Нехай X, Y — банахові простори та $A \in \mathcal{B}(X, Y)$ — сюр'єктивне. Тоді $A(B(0; 1))$ містить відкриту кулю з центром в точці 0.

Proof.

I. $\overline{A(B(0; 1))}$ містить якусь відкриту кулю.

Оскільки A — сюр'єктивне відображення, то тоді

$$Y = \bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{A(B(0; n))}.$$

Тоді за теоремою Бера існує одне замикання $\overline{A(B(0; n_0))}$, яке містить відкриту кулю. Оскільки A — лінійний оператор, то можемо записати $\overline{A(B(0; n_0))} = n_0 \overline{A(B(0; 1))}$, звідси $\overline{A(B(0; 1))}$ теж містить відкриту кулю.

II. $\overline{A(B(0; 1))}$ містить відкриту кулю з центром в точці 0.

Коротше, хотілось би, щоб існувала куля $B(r; 0) \subset A(B(0; 1))$. Наразі відомо лише, що $B(v_0; 4r) \subset A(B(0; 1))$. Оберемо допоміжну точку $v_1 \in A(B(0; 1))$, для якої $\|v_0 - v_1\| < 2r$ (таке можливо зробити в силу замкненості, якщо взяти послідовність, яка прямує до v_0). Тоді маємо тепер вкладення $B(v_1; 2r) \subset A(B(0; 1))$. Ідея тут полягала в тому, що ми хотіли коло з центром, який вже лежить в $A(B(0; 1))$ (бо точка v_0 могла туди й не потрапити).

Доведемо, що $B(0; r) \subset \overline{A(B(0; 1))}$. Нехай $v \in B(0; r)$, тоді $2v + v_1 \in B(v_1; 2r)$. Оскільки $v_1 \in A(B(0; 1))$, то звідси $v_1 = Au_1$ для деякого $u_1 \in B(0; 1)$. Точку $2v$ запишемо в такому вигляді:

$$2v = (2v + v_1) - v_1 = (2v + v_1) - Au_1.$$

Тоді $2v \in \overline{A(B(0; 1))} - Au_1 \stackrel{A \text{ — лінійний}}{=} \overline{A(B(0; 1) - u_1)} \subset A(B(0; 2))$. Останнє вкладення отримали через те, що $\|u_1\| < 1$. Якщо $2v \in \overline{A(B(0; 2))}$, то звідси $v \in \overline{A(B(0; 1))}$.

III. $A(B(0; 1))$ містить відкриту кулю з центром в точці 0.

Ми доведемо насправді, що $B(0; \frac{r}{2}) \subset A(B(0; 1))$. Перш ніж це зробити, зауважимо, що справедливе ось таке вкладення:

$$B(0; 2^{-n}r) = 2^{-n}B(0; r) \subset 2^{-n}\overline{A(B(0; 1))} = \overline{A(B(0; 2^{-n}))}.$$

Нехай $v \in B(0; \frac{r}{2})$, тобто $\|v\| < \frac{r}{2}$, але тоді із того зауваження отримуємо $v \in \overline{A(B(0; \frac{1}{2}))}$. Значить, існує точка $b_1 \in B(0; \frac{1}{2})$, для якої $\|v - Ab_1\| < \frac{r}{4}$ (це можливо за аналогічними міркуваннями, як ми тоді шукали точку v_1). Звідси $v - Ab_1 \in \overline{A(B(0; \frac{1}{4}))}$, тому існує точка $b_2 \in B(0; \frac{1}{4})$,

для якої $\|v - Ab_1 - Ab_2\| < \frac{r}{8}$.

$\vdots$

Побудували послідовність $(b_k)_{k \in \mathbb{N}}$, де маємо

$$\|b_k\| < 2^{-k}, \quad \left\| v - \sum_{k=1}^n Ab_k \right\| < 2^{-n-1}r.$$

Із першої оцінки випливає, що ряд $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ збіжний абсолютно, але оскільки X — банахів, то $\sum_{k=1}^{\infty} b_k = b$ — просто збіжний. Причому

$$\|b\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=1}^n b_k \right\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \|b_k\| = \sum_{k=1}^{\infty} \|b_k\| < \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} = 1.$$

(там нерівність справді строга, попри граничний перехід, треба трошки за додатні ряди згадати). Однак A — обмежений оператор, тому неперервний, тож

$$Ab = \lim_{n \rightarrow \infty} A \left(\sum_{k=1}^n b_k \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n Ab_k = v.$$

Остання рівність була отримана за другою оцінкою. Точка $b \in B(0; 1)$, але оскільки $Ab = v$, то $v \in A(B(0; 1))$. ■

Маючи дану лему, доб'ємо теорему.

Proof.

Нехай U — відкрита в X . Хочу довести, що $A(U)$ — відкрита в Y .

Оберемо точку $y \in A(U)$, тобто $y = Ax$ для деякого $x \in U$. За відкритістю знайдеться куля $B(x; \varepsilon) \subset U$. За лемою $A(B_1(0; 1)) \supset B(0; \delta)$ для деякої кулі. Звідси

$$B(y, \varepsilon\delta) = y + \varepsilon B(0; \delta) \subset y + \varepsilon A(B(0; 1)) = Ax + \varepsilon A(B(0; 1)) = A(x + B(0; \varepsilon)) = A(B(x; \varepsilon)).$$

Отже, знайшли відкриту кулю з центром b_2 , який міститься в $A(U)$. ■

Theorem 3.2.3 Теорема Банаха-Штайнгауза

Нехай X — банахів та Y — нормований простір. Також нехай задана послідовність $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{B}(X, Y)$. Припустимо, що для всіх $x \in X$ маємо $\sup_{n \in \mathbb{N}} \|A_n x\| < +\infty$. Тоді $\sup_{n \in \mathbb{N}} \|A_n\| < +\infty$.

(дану теорему ще називають "принцип рівномірної обмеженості")

Remark 3.2.4 Умова $\sup_{n \in \mathbb{N}} \|A_n x\| < +\infty$ для всіх $x \in X$ означає, що послідовність $(A_n x)_{n \in \mathbb{N}}$ — обмежена для всіх $x \in X$. Аналогічно умова $\sup_{n \in \mathbb{N}} \|A_n\| < +\infty$ означає, що послідовність $(\|A_n\|)_{n \in \mathbb{N}}$ — обмежена.

Proof.

Для кожного $k \in \mathbb{N}$ розглянемо множину

$$C_k = \{x \in X \mid \|x\| \leq 1, \sup_{n \in \mathbb{N}} \|A_n x\| \leq k\}.$$

Кожна множина C_k є замкненою. Дійсно, нехай є послідовність $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset C_k$ така, що $x_n \rightarrow x$. По-перше, в силу неперервності норми

$$\|x\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| \leq 1.$$

По-друге, оскільки $x_n \in C_k$, то звідси $\|A_m x_n\| \leq k$ для всіх $m \in \mathbb{N}$. Спрямуємо $n \rightarrow \infty$, тоді в силу неперервності норми та операторів маємо

$$\|A_m x\| \leq k, \quad \forall m \in \mathbb{N}.$$

Із двох умов одержимо $x \in C_k$. Далі зазначимо, що справедлива така рівність:

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} C_k = B[0; 1].$$

Такий розклад впливає з умови теореми. Оскільки $B[0; 1]$ — замкнений та X — банахів, то підпростір $B[0; 1]$ теж буде повним. Тоді за теоремою Бера один із C_k міститиме відкриту кулю $B(x_0; \delta_0)$. Треба цю кулю трошки посунути, принаймні до центра 0, а зробимо це ось так.

Для кожного $x \in B(0; \delta_0)$ маємо $x_0 + x \in B(x_0; \delta_0) \subset C_k$, тобто $\sup_{n \in \mathbb{N}} \|A_n(x_0 + x)\| \leq k$. Звідси маємо такий ланцюг нерівностей:

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \|A_n x\| = \sup_{n \in \mathbb{N}} \|-A_n x_0 + A_n(x_0 + x)\| \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \|A_n x_0\| + \sup_{n \in \mathbb{N}} \|A_n(x_0 + x)\| \leq k + k.$$

Тобто для кожного $x \in B(0; \delta_0)$ маємо $\sup_{n \in \mathbb{N}} \|A_n x\| \leq 2k$.

Нехай x такий, що $\|x\| = 1$. Тоді цілком ясно, що $\frac{\delta_0}{2}x \in B(0; \delta_0)$, що дає оцінку $\left\|A_n \left(\frac{\delta_0}{2}x\right)\right\| \leq 2k$ для кожного $n \in \mathbb{N}$. Іншими словами, $\|A_n x\| \leq \frac{4k}{\delta_0}$. Оскільки це виконується для всіх x , де $\|x\| = 1$, то звідси $\|A_n\| \leq \frac{4k}{\delta_0}$ для всіх $n \in \mathbb{N}$. ■

Remark 3.2.5 У теоремі Банаха-Штайнгауза умова того, що X — банахів, є суттєвою.

Example 3.2.6 Зокрема розглянемо простір $\mathfrak{c}_0$ — послідовності, що збігаються до нуля. Далі розглянемо небанахів підпростір $\mathfrak{c}_{00} \subset \mathfrak{c}_0$ — послідовності, де всі члени нулі, починаючи з деякого номера (вправа: переконатися, що це дійсно небанахів). Задамо послідовність операторів $l_n: \mathfrak{c}_{00} \rightarrow \mathfrak{c}_{00}$, визначені як

$$l_n(x_1, x_2, \dots, x_n, 0, 0, \dots) = (x_1, 2x_2, \dots, nx_n, 0, 0, \dots).$$

Зауважимо, що $l_n \in \mathcal{B}(\mathfrak{c}_{00})$ із нормою $\|l_n\| = n$ (вправа: довести). Крім того, для кожного $x \in \mathfrak{c}_{00}$ послідовність $(l_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ — обмежена, але $(\|l_n\|)_{n \in \mathbb{N}}$ уже не обмежена.

Theorem 3.2.7 Теорема про замкнений графік

Нехай X_1, X_2 — банахові простори та $A \in \mathcal{L}(X_1, X_2)$. **Графіком** даного оператора назвемо множину

$$\Gamma(A) = \{(x, Ax) \mid x \in X\}.$$

Тоді справедливе наступне:

$$A \in \mathcal{B}(X_1, X_2) \iff \Gamma(A) \text{ — замкнена на } X_1 \times X_2.$$

(доведення очікується після обговорення обернених операторів)

3.3 Обернені оператори

Definition 3.3.1 Бієктивний оператор $A \in \mathcal{B}(X, Y)$ називається **оборотно-обмеженим**, якщо

$$A^{-1} \in \mathcal{B}(Y, X).$$

У книжках цей оператор називають просто **оборотним**, але для мене це призводить до плутанини зі стандартним означенням оборотного оператора (як бієктивне відображення).

Theorem 3.3.2 Маємо $A \in \mathcal{B}(X, Y)$. Тоді

$$A \text{ оборотно-обмежений та бієктивний} \iff \exists m > 0 : \forall x \in X : \|Ax\| \geq m\|x\|.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $A^{-1} \in \mathcal{B}(Y, X)$, тобто $\forall y \in Y : \|A^{-1}y\| \leq \|A^{-1}\|\|y\|$. Оскільки A — бієктивний оператор, то $\exists! x \in X : y = Ax$. Значить, підставивши в нерівність, отримаємо $\|A^{-1}Ax\| = \|x\| \leq \|A^{-1}\|\|Ax\|$. Якщо покласти $m = \|A^{-1}\|^{-1} > 0$, то отримаємо бажану нерівність $\|Ax\| \geq m\|x\|$.

$\Leftarrow$ Дано: $\exists m > 0 : \forall x \in X : \|Ax\| \geq m\|x\|$. Якщо взяти елемент $x \in \ker A$, то одержимо нерівність $\|Ax\| = 0 \geq m\|x\|$, тож автоматично $x = 0$. Отже, існує оборотний оператор $A^{-1}: Y \rightarrow X$. Залишилося переконатися, що $A^{-1} \in \mathcal{B}(Y, X)$. Ми маємо $x = A^{-1}y$, тоді звідси $\|AA^{-1}y\| = \|y\| \geq m\|A^{-1}y\|$, внаслідок чого $\|A^{-1}y\| \leq m^{-1}\|y\|$. ■

Example 3.3.3 Розглянемо оператор $A: C[0, 1] \rightarrow C[0, 1]$, який задається формулою

$$(Ax)(t) = t \int_0^t x(s) ds$$

(довести, що $A \in \mathcal{B}(C[0, 1])$ та $\|A\| = 1$). Даний оператор буде ін'єктивним (довести це). Отже, існує оборотний оператор $A^{-1}: \text{Im } A \rightarrow C[0, 1]$, однак доведемо, що $A^{-1} \notin \mathcal{B}(\text{Im } A, C[0, 1])$.

Нехай $m \in (0, 1]$. Цілком ясно, що існує такий номер n , для якого $\frac{1}{n+1} < m$. Розглянемо функції $x_n(t) = t^n$, тоді звідси $(Ax_n)(t) = \frac{1}{n+1}t^{n+2}$. Зауважимо, що $\|x_n\| = 1$, а також

$$\|Ax_n\| = \frac{1}{n+1} < m\|x_n\|.$$

При $m > 1$ автоматично

$$\|Ax\| \leq \|A\|\|x\| = 1 \cdot \|x\| < m\|x\|.$$

Таким чином, за теоремою вище не існує оборотно-обмеженого оператора.

Theorem 3.3.4 Нехай X — банахів простір та $A \in \mathcal{B}(X)$, причому $\|A\| = q < 1$. Тоді оператор $I - A$ буде оборотно-обмеженим, причому

$$(I - A)^{-1} = I + A + A^2 + \dots$$

(щось на кшталт геометричної прогресії). Збіжність в правій частині — рівномірна.

Definition 3.3.5 Нехай X, Y — лінійні нормовані простори.

Послідовність операторів $(A_n)_{n=1}^\infty \subset \mathcal{B}(X, Y)$ називається **рівномірно збіжною** до A , якщо

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|A_n - A\| = 0.$$

Позначення: $A_n \xrightarrow{\rightarrow} A$ при $n \rightarrow \infty$.

Proof.

Розглянемо послідовність $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$, що задана як

$$S_n = I + A + \dots + A^n.$$

Доведемо, що вона фундаментальна в $\mathcal{B}(X)$. Для цього запишемо ланцюг нерівностей:

$$\begin{aligned} \|S_{n+p} - S_n\| &= \|A^{n+1} + \dots + A^{n+p}\| \leq \|A^{n+1}\| + \dots + \|A^{n+p}\| \\ &\leq \|A\|^{n+1} + \dots + \|A\|^{n+p} < q^{n+1} + \dots + q^{n+p} \leq \frac{q^{n+1}}{1-q} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

За умовою $q < 1$, тому фундаментальність доводиться миттєво. Оскільки простір X банахів, то звідси $\mathcal{B}(X)$ теж банахів, тому $S_n \xrightarrow{\rightarrow} S \in \mathcal{B}(X)$.

Цілком зрозуміло, що $I - A \in \mathcal{B}(X)$. Залишилося довести, що $I - A$ є оборотним оператором до S , тобто

$$(I - A)S = S(I - A) = I.$$

Спочатку зауважимо, що справедлива нерівність:

$$\|(I - A)S_n - (I - A)S\| \leq \|I - A\|\|S - S_n\| \rightarrow 0.$$

Тому нам буде досить довести, що $(I - A)S_n \xrightarrow{\rightarrow} I$. Ось це доводиться доволі швидко:

$$\|(I - A)S_n - I\| = \|I - A^{n+1} - I\| = \|A^{n+1}\| \leq q^{n+1} \rightarrow 0. \quad \blacksquare$$

Remark 3.3.6 В умовах теореми, справедлива оцінка:

$$\|(I - A)^{-1}\| \leq (1 - \|A\|)^{-1}.$$

Вправа: довести.

Theorem 3.3.7 Нехай X, Y — банахові простори та оператори $A, B \in \mathcal{B}(X, Y)$, причому оператор A — оборотно-обмежений та B задовольняє нерівність $\|B\| \leq \|A^{-1}\|^{-1}$. Тоді оператор $A + B$ буде оборотно-обмеженим.

Proof.

Доводити будемо з використанням попередньої теореми. Розглянемо ось такий оператор

$$I + A^{-1}B: X \rightarrow X.$$

Зауважимо, що справедлива оцінка:

$$\|A^{-1}B\| \leq \|A^{-1}\| \|B\| < 1,$$

тому $I + A^{-1}B$ оборотно-обмежений. Зауважимо, що $A + B = A(I + A^{-1}B)$, тобто $A + B$ розписали на добуток двох оборотно-обмежених операторів, тому сам оператор $A + B$ буде теж оборотно-обмеженим. ■

Theorem 3.3.8 Нехай X, Y — банахові та $A \in \mathcal{B}(X, Y)$ — бієктивний. Тоді A — оборотно-обмежений. Іншими словами, якщо оператор між двома банаховими просторами обмежений та має обернений, то цей обернений оператор теж обмежений.

Proof.


Доведемо, що A^{-1} — неперервне відображення (із топологічного означення). Справді, якщо U — відкрита в X , то його прообраз $(A^{-1})^{-1}(U) = A(U)$ — відкрита в Y (наш оператор A задовольняє open mapping theorem). Власне, тоді $A^{-1} \in \mathcal{B}(Y, X)$. ■

Тепер ми готові, нарешті, довести теорему про замкнений графік **Th. 3.2.7**.

Proof.

⇒ Дано: $A \in \mathcal{B}(X_1, X_2)$. Розглянемо послідовність $((x_n, Ax_n))_{n \in \mathbb{N}} \subset \Gamma(A)$, де $x_n \rightarrow x$ та $Ax_n \rightarrow y$. Однак оскільки A — неперервний, то насправді $Ax_n \rightarrow Ax = y$. Звідси точка $(x, Ax) \in \Gamma(A)$.

⇐ Дано: $\Gamma(A)$ — замкнена на $X_1 \times X_2$. Передусім зауважимо, що оскільки X_1, X_2 — банахові, тому $X_1 \times X_2$ — банахів, а в силу замкненості $\Gamma(A)$ — теж банахів. Розглянемо ось таку діаграму:



Спочатку побачимо, що $\pi_1 \in \mathcal{B}(\Gamma(A), X_1)$ та $\pi_2 \in \mathcal{B}(\Gamma(A), X_2)$, тут сумнівів нема. Крім того, цілком зрозуміло, що π_1 — бієкція. Отже, із діаграмки випливає рівність

$$A = \pi_2 \pi_1^{-1}.$$

Однак обмежений оператор π_1 відображає між банаховими просторами, тому $\pi_1^{-1} \in \mathcal{B}(X_1, \Gamma(A))$. Композиція обмежених операторів дає знову обмежений оператор. ■

3.4 Продовження неперервних операторів

Нехай X, Y — нормовані простори, $X_0 \subset X$ та $A \in \mathcal{B}(X_0, Y)$. Питання полягає в тому, чи існує розширення $\tilde{A} \in \mathcal{B}(X, Y)$ оператора A . Причому нас буде цікавити таке розширення, що $\|\tilde{A}\| = \|A\|$.

Remark 3.4.1 Якщо таке розширення допустиме, то щонайменше $\|\tilde{A}\| \geq \|A\|$. Дійсно,

$$\|\tilde{A}\| = \sup_{x \in X \setminus \{0\}} \frac{\|\tilde{A}x\|}{\|x\|} \geq \sup_{x \in X_0 \setminus \{0\}} \frac{\|\tilde{A}x\|}{\|x\|} = \sup_{x \in X_0 \setminus \{0\}} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \|A\|.$$

Proposition 3.4.2 Нехай X, Y — відповідно нормований та банахів простори та $X_0 \subset X$ — щільний підпростір. Тоді для кожного $A \in \mathcal{B}(X_0, Y)$ існує єдиний розширений оператор $\tilde{A} \in \mathcal{B}(X, Y)$ оператора A , при цьому $\|\tilde{A}\| = \|A\|$.

Це твердження описує так зване неперервне продовження оператора.

Proof.

Нехай є послідовність $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X_0$, де $x_n \rightarrow x \in X$. Зауважимо, що тоді $(Ax_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset Y$ — фундаментальна. У силу банаховості Y матимемо збіжність $(Ax_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Тож визначимо оператор

$$\tilde{A}: X \rightarrow Y, \quad \tilde{A}x = \lim_{n \rightarrow \infty} Ax_n.$$

I. $\tilde{A}$ визначений коректно.

Нехай є дві послідовності $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}, (y_n)_{n \in \mathbb{N}}$, для яких $x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow x$. Значить,

$$\|Ax_n - Ay_n\| = \|A(x_n - y_n)\| \leq \|A\| \|x_n - y_n\| \rightarrow 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} Ax_n = \lim_{n \rightarrow \infty} Ay_n.$$

II. $\tilde{A}$ розширює оператор A .

Справді, нехай $x \in X_0$. Оберемо стаціонарну послідовність $(x)_{n \in \mathbb{N}} \subset X_0$, де $x \rightarrow x$. Тоді одержимо $\tilde{A}x = \lim_{n \rightarrow \infty} Ax = Ax$. Отже, звідси $\tilde{A}|_{X_0} = A$.

III. $\tilde{A}$ лінійний оператор.

Нехай $x, y \in X$ та $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Тоді

$$\tilde{A}(\alpha x + \beta y) = \lim_{n \rightarrow \infty} A(\alpha x_n + \beta y_n) = \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} Ax_n + \beta \lim_{n \rightarrow \infty} Ay_n = \alpha \tilde{A}x + \beta \tilde{A}y.$$

IV. $\|\tilde{A}\| = \|A\|$.

Оберемо $X_0 \ni x_n \rightarrow x \in X$. Оскільки A — обмежений, то $\|Ax_n\| \leq \|A\| \|x_n\|$. Спрямовуючи $n \rightarrow \infty$, ми отримуємо $\|\tilde{A}x\| \leq \|A\| \|x\|$. Автоматично довели, що $\tilde{A}$ — обмежений оператор. Раз це виконується для всіх $x \in X$, то отримуємо $\|\tilde{A}\| = \sup_{\|x\|=1} \|\tilde{A}x\| \leq \sup_{\|x\|=1} \|A\| \|x\| = \|A\|$. Тобто звідси

$\|\tilde{A}\| \leq \|A\|$. Зважаючи на зауваження вище, маємо $\|\tilde{A}\| = \|A\|$.

V. $\tilde{A}$ — єдине розширення.

Припустимо, що існує інший оператор $\tilde{\tilde{A}}$, яке також є розширенням A з усіма умовами, що задані в твердженні. Маємо $x \in X$, тож існує послідовність $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset X_0, x_n \rightarrow x$. Тоді

$$\tilde{\tilde{A}}x \stackrel{\tilde{\tilde{A}} - \text{обмежений}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{\tilde{A}}x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} Ax_n \stackrel{\text{def}}{=} \tilde{A}x.$$

Отримали суперечність! Коротше, у нас тільки єдиний такий оператор. ■

Існує не зовсім неперервний варіант розширитися, який можливо для лінійних неперервних функціоналів. Загострювати увагу буде саме на них.

Позначення: $X' = \mathcal{B}(X, \mathbb{R})$ — множина всіх лінійних неперервних функціоналів на X .

Theorem 3.4.3 Теорема Гана-Банаха

Нехай E — нормований простір та $G \subset E$ — підпростір. Тоді для кожного функціонала $l \in G'$ існує продовження $\tilde{l} \in E'$ функціонала l , причому $\|\tilde{l}\| = \|l\|$.

(TODO: форматувати текст доведення та переглянути всі моменти)

Proof.

1. Обмежимося випадком, коли E — дісний та сепарабельний простір.

I. Доведемо, що l можна продовжити на деякий підпростір $E \supset F \supsetneq G$.

Нехай G — підпростір E та $G \neq E$. Зафіксуємо $y \notin G$ та розглянемо підпростір $F = \text{span}\{G \cup \{y\}\}$. Тобто кожний елемент $x \in F$ записується як $x = g + \lambda y$ при $g \in G, \lambda \in \mathbb{R}$. Визначимо оператор $\tilde{l}(x) = l(g) + \lambda c$, де $c = \tilde{l}(y)$. За побудовою, такий оператор — лінійний.

Тепер залишилося підібрати таке $c \in \mathbb{R}$, щоб виконувалося $\|\tilde{l}\| = \|l\|$ — тим самим ми й обмеженість доведемо автоматично. Але згідно зі зауваження, нам треба підібрати $c \in \mathbb{R}$, щоб $\|\tilde{l}\| \leq \|l\|$.

Обмежимося поки що $\lambda > 0$. Нехай зафіксовано $h_1, h_2 \in G$ та зауважимо, що справедлива нерівність:

$$l(h_2) - l(h_1) = l(h_2 - h_1) \leq |l(h_2 - h_1)| \leq \|l\| \|h_2 - h_1\| = \|h\| \|(h_2 + y) - (y + h_1)\| \leq \|l\| \|h_1 + y\| + \|l\| \|h_2 + y\|.$$

Звідси випливає, що $-\|l\| \|h_1 + y\| - l(h_1) \leq \|l\| \|h_2 + y\| - l(h_2)$.

Оскільки це $\forall h_1, h_2 \in G$, то тоді $\sup_{h_1 \in G} (-\|l\| \|h_1 + y\| - l(h_1)) \leq \inf_{h_2 \in G} (\|l\| \|h_2 + y\| - l(h_2))$.

Для зручності супремум позначу за a_1 та інфімум за a_2 . Оберемо число $c \in \mathbb{R}$ так, щоб $a_1 \leq c \leq a_2$. Звідси справедлива така нерівність:

$$\forall h \in G: -\|l\|\|h+y\| - l(h) \leq c \leq \|l\|\|h+y\| - l(h).$$

Тепер покладемо елемент $h = \lambda^{-1}g$ та домножимо обидві частини нерівності на λ . Оскільки ми домовилися $\lambda > 0$, то знаки нерівностей зберігаються. Коротше, отримаємо:

$$-\|l\|\|g+\lambda y\| - l(g) \leq \lambda c \leq \|l\|\|g+\lambda y\| - l(g).$$

$$-\|l\|\|g+\lambda y\| \leq l(g) + \lambda c \leq \|l\|\|g+\lambda y\|.$$

$$|\tilde{l}(x)| = |l(g) + \lambda c| \leq \|l\|\|g+\lambda y\| = \|l\|\|x\|.$$

Власне, далі аналогічними міркуваннями (як в попередньому твердженні) отримаємо $\|\tilde{l}\| \leq \|l\|$.

Тепер що робити при $\lambda < 0$. Перепишемо $x = -(-g + (-\lambda)y)$. У нас тепер $-\lambda > 0$ та $-x = t = -g + (-\lambda)y$, звідси отримаємо

$$|\tilde{l}(t)| \leq \|l\|\|t\| \implies |\tilde{l}(x)| \leq \|l\|\|x\|.$$

II. Тепер доведемо, що продовження на нашому конкретному E існує.

Оскільки E — сепарабельний, то існує (ми оберемо зліченну) множина $A = \{x_1, x_2, \dots\}$, яка є щільною підмножиною E . Також ми досі маємо $G \subset E$ — підпростір.

Позначимо $x_{n_1} \in A$ — перший з елементів, де $x_{n_1} \notin G$. За кроком I, існує l_1 — продовження l на $G_1 = \text{span}\{G \cup \{x_{n_1}\}\}$.

Позначимо $x_{n_2} \in A$ — перший з елементів, де $x_{n_2} \notin G_1$. За кроком I, існує l_2 — продовження l_1 на $G_2 = \text{span}\{G_1 \cup \{x_{n_2}\}\}$.

⋮

Отримаємо ланцюг підпросторів $G \subset G_1 \subset G_2 \subset \dots$ та набір функціоналів $l_1, l_2, \dots$, для яких:

$$\forall n \geq 1: \quad l_n: G_n \rightarrow \mathbb{R} \text{ — обмежена}; \quad l_n|_G = l; \quad \|l_n\| = \|l\|.$$

Покладемо множину $M = \bigcup_{n=1}^{\infty} G_n$, яка є лінійною. Визначимо функціонал $L_0: M \rightarrow \mathbb{R}$ таким чином:

$$x \in M \implies x \in G_N \implies L_0(x) = l_N(x). \text{ Зрозуміло цілком, що } L_0 \text{ — лінійний, а також } \|L_0\| = \|l\|.$$

Оскільки $M \supset A$ та A всюди щільна, то M — всюди щільна. Отже, за попереднім твердженням, існує продовження $L: E \rightarrow \mathbb{R}$, для якого $\|L\| = \|L_0\| = \|l\|$.

Висновок: ми довели теорему Гана-Банаха для випадку, коли E — дійсний сепарабельний.

2. Тепер будемо доводити теорему для E — довільний дійсний нормований простір. Все ще $G \subset E$. Позначимо за l_p — продовження l зі збереженням норми на множині $P \supset G$. Таке продовження існує див (1. та I.). Позначимо X — множина всіх таких продовжень. На ній введемо відношення $\preceq$ таким чином:

$$l_p \preceq l_q \iff P \subset Q \text{ та } l_Q(x) = l_p(x), \forall x \in P.$$

Зрозуміло, що $\preceq$ задає відношення порядку, внаслідок чого X — частково впорядкована. Зафіксуємо $Y = \{l_{P_\alpha} \mid \alpha \in A\}$ — будь-яку лінійно впорядковану підмножину X . Знайдемо верхню грань.

Для цього покладемо $P_* = \bigcup_{\alpha \in A} P_\alpha$ та на множині P_* задамо функціонал l_* таким чином:

$$x \in P_* \implies x \in P_{\alpha_0} \implies l_*(x) = l_{\alpha_0}(x).$$

Зрозуміло, що l_* — лінійний, причому $\|l_*\| = \|l\|$. На множині $\bar{P}_*$ продовжимо функціонал, як було в твердженні — отримаємо функціонал $l_{\bar{P}_*}$, причому $\|l_{\bar{P}_*}\| = \|l_*\| = \|l\|$. Даний функціонал $l_{\bar{P}_*}$ на $\bar{P}_*$ буде верхньою гранню Y . Отже, за лемою Цорна, існує максимальний елемент X . Це буде функціонал L , який визначений на E (у протилежному випадку його можна було би ще продовжити та він не був би максимальним елементом).

Висновок: ми довели теорему Гана-Банаха для випадку, коли E — дійсний (не обов'язково сепарабельний) нормований простір. ■

Насправді, на цьому теорема Гана-Банаха ще не закінчена. Ми можемо її довести на випадок, коли нормований простір E — комплексний. Спершу кілька деталей.

Нехай E — комплексний лінійний нормований простір. Розглянемо одночасно $E_{\mathbb{R}}$ — асоційований з E дійсний нормований простір; тобто під час множення на скаляр ми допускаємо лише дійсні коефіцієнти. Зауважимо, що $E_{\mathbb{R}} = E$ як множини, утім не як простори.

Розглянемо довільний функціонал $l: E \rightarrow \mathbb{C}$. Раз $l(x) \in \mathbb{C}$, то для кожного $x \in E$ можна записати функціонал як $l(x) = m(x) + in(x)$. У цьому випадку $m(x) = \text{Re } l(x)$, $n(x) = \text{Im } l(x)$.

Proposition 3.4.4 Нехай $l: E \rightarrow \mathbb{C}$ — лінійний та обмежений функціонал. Тоді $m, n: E_{\mathbb{R}} \rightarrow \mathbb{R}$ задають лінійний обмежений функціонал.

Proof.

Нехай $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ та $x, y \in E$. Тоді ми отримаємо наступне:

$$l(\alpha x + \beta y) = m(\alpha x + \beta y) + in(\alpha x + \beta y) \quad (\text{з одного боку})$$

$$l(\alpha x + \beta y) = \alpha l(x) + \beta l(y) = \alpha(m(x) + in(x)) + \beta(m(y) + in(y)) = (\alpha m(x) + \beta m(y)) + i(\alpha n(x) + \beta n(y))$$

(з іншого боку).

Знаючи, що комплексне число рівне тоді й лише тоді, коли дійсні та уявні частини збігаються, отримаємо

$$m(\alpha x + \beta y) = \alpha m(x) + \beta m(y) \quad n(\alpha x + \beta y) = \alpha n(x) + \beta n(y).$$

Отже, m, n — лінійний функціонали.

Обмеженість m (аналогічно з n) випливає з такої ланцюга нерівностей:

$$|m(x)| \leq |m(x) + in(x)| = |l(x)| \leq \|l\| \|x\|. \quad \blacksquare$$

Proposition 3.4.5 $n(x) = -m(ix)$.

Іншими словами, ми можемо функціонал l відновити повністю, знаючи функціонал m .

Proof.

$$m(ix) + in(ix) = l(ix) = il(x) = i(m(x) + in(x)) = -n(x) + im(x).$$

$$\implies n(x) = -m(ix).$$

$$l(x) = m(x) - im(ix). \quad \blacksquare$$

Повернімося назад до теореми Гана-Банаха. Доб'ємо її на випадок, коли E — комплексний нормований простір.

Proof.

Маємо $E \supset G$ — два комплексних простори та $E_{\mathbb{R}}, G_{\mathbb{R}}$ — асоційовані простори. Маємо функціонал $l: G \rightarrow \mathbb{C}$, який визначається дійсним функціоналом $m: G_{\mathbb{R}} \rightarrow \mathbb{R}$. Оскільки це дійсний функціонал, ми можемо продовжити до $M: E_{\mathbb{R}} \rightarrow \mathbb{R}$ зі збереженням норми.

Покладемо $L(x) = M(x) - iM(ix)$. Неважко буде довести, що L — комплексний лінійний функціонал.

Залишилося довести, що $\|L\| = \|l\|$. Знову ж таки, достатньо довести $\|L\| \leq \|l\|$. Запишемо $L(x) = |L(x)|e^{i\varphi}$, де $\varphi = \arg L(x)$. Тоді

$$|L(x)| = e^{-i\varphi} L(x) = L(e^{-i\varphi} x) = M(e^{-i\varphi} x) = |M(e^{-i\varphi} x)| \leq \|M\| \|e^{-i\varphi} x\| = \|m\| \|x\| \leq \|l\| \|x\|.$$

Отже, $\|L\| \leq \|l\|$. Ми тут юзали той факт, що $L(y) = M(y)$ при $L(y) \in \mathbb{R}$. $\blacksquare$

Remark 3.4.6 Зауважимо, що якщо G — лінійна множина (але не підпростір), то теорема Гана-Банаха все одно виконується.

У цьому випадку $\tilde{G}$ буде підпростором E . Функціонал l продовжується неперервним чином на $\tilde{G}$, а далі застосовується доведена теорема.

3.5 Деякі наслідки з теореми Гана-Банаха

Corollary 3.5.1 Нехай E — лінійний нормований простір та $G \subset E$ — підпростір. Тоді для будь-якого вектора $y \notin G$ існує функціонал $l \in E'$, для якого

$$\|l\| = 1, \quad l(y) = \rho(y, G), \quad l|_G = 0.$$

(цей наслідок про існування функціоналу, що поводить як обчислення відстані від елемента y до підпростору G ; ми можемо підібрати такий, щоб норма була "нормальною")

Proof.

На підпросторі $F = \text{span}\{G \cup \{y\}\}$ визначимо функціонал l_0 таким чином:

$$l_0(g + \lambda y) = \lambda \rho(y, G).$$

Цілком зрозуміло, що l_0 — лінійний неперервний функціонал на F , також $l_0(y) = \rho(y, G)$, нарешті $l_0(g) = l_0(g + 0y) = 0$. Обчислимо $\|l_0\|$.

$$\begin{aligned} \|l_0\| &= \sup \left\{ \frac{|l_0(g + \lambda y)|}{\|g + \lambda y\|} \mid g + \lambda y \in F \right\} = \sup \left\{ \frac{|\lambda| \rho(y, G)}{|\lambda| \cdot \|\lambda^{-1}g + y\|} \mid g + \lambda y \in F \right\} \\ &= \rho(y, G) \sup \{\|g' - y\|^{-1} \mid g' \in G\} = \rho(y, G) \inf_{g' \in G} \|g' - y\| = 1, \end{aligned}$$

де елемент $g' = \lambda^{-1}g \in G$. За теоремою Банаха існує продовження l до E , де $\|l\| = \|l_0\| = 1$. $\blacksquare$

Corollary 3.5.2 Для кожного $y \in E \setminus \{0\}$ існує функціонал $l \in E'$, де

$$\|l\| = 1, \quad l(y) = \|y\|.$$

(цей наслідок про існування функціоналу, що поводиться як знаходження норми)

Вказівка: $G = \{0\}$ до попереднього наслідку.

Corollary 3.5.3 Функціонали із E' розділяють точки нормованого простора E . Іншими словами,

$$\forall x_1, x_2 \in E : x_1 \neq x_2 : \exists l \in E' : l(x_1) \neq l(x_2).$$

Вказівка: попередній наслідок, покласти $y = x_1 - x_2 \neq 0$.

Definition 3.5.4 Нехай E — нормований простір.

Підмножина $M \subset E$ називається **тотальною**, якщо

$$\overline{\text{span } M} = E.$$

Іншими словами, лінійна оболонка $\text{span } M$ скрізь щільна.

Theorem 3.5.5 Нехай E — нормований простір та $M \subset E$. Тоді

$$M \text{ — тотальна в } E \iff \forall l \in E' : l|_M \equiv 0 \implies l|_E \equiv 0.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: M — тотальна множина. Нехай $l \in E'$ такий, що $l|_M \equiv 0$. Оскільки функціонал лінійний, то $l|_{\text{span } M} \equiv 0$. Оскільки M — тотальна, то $\text{span } M \subset E$ буде щільною підмножиною, тож ми можемо неперервно продовжити l до E . Отримаємо $l|_E \equiv 0$.

$\Leftarrow$ Дано: $\forall l \in E' : l|_M \equiv 0 \implies l|_E \equiv 0$.

Припустимо, що M не є тотальною. Тобто $\overline{\text{span } M} \stackrel{\text{позн.}}{=} G \subsetneq E$, тобто існує вектор $y \in E \setminus G$. За першим наслідком, можна взяти функціонал $l \in E'$, що тіпа описує відстань, тобто $\|l\| = 1$, $l|_G = 0$. Але з того, що $l|_G \equiv 0 \implies l|_M \equiv 0$ випливає $l|_E \equiv 0$. Суперечність! ■

Proposition 3.5.6 Нехай E — нормований простір та l — лінійний неперервний функціонал з E . Тоді $\ker l$ — замкнений підпростір E . Навіть більше: $\ker l$ буде гіперпідпростором, тобто це означає, що $E = \text{span}\{\ker l, y\}$ при $y \notin \ker l$.

Proof.

Те, що $\ker l$ підпростір, тут все зрозуміло. Якщо взяти $(x_n)_{n=1}^\infty \subset \ker l$ таку, що $x_n \rightarrow x$, тоді маємо послідовність $(l(x_n) = 0)_{n=1}^\infty$ — стаціонарна послідовність, при цьому $0 = l(x_n) \rightarrow l(x)$, тому $x \in \ker l$. Нехай $y \notin \ker l$. Тоді доведемо, що кожний елемент $x \in E$ записується як $x = g + \lambda y$, де $g \in \ker l$, $\lambda \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$. Покладемо $\lambda = \frac{l(x)}{l(y)}$ та розглянемо вектор $g = x - \lambda y$. Оскільки $l(g) = l(x) - \lambda l(y) = 0$, то звідси $g \in \ker l$. Отже, $x = g + \lambda y$ — шукане представлення. ■

3.6 Загальний вигляд лінійних неперервних функціоналів у деяких банахових просторах

3.6.1 Базис Шаудера

Definition 3.6.1 Нехай E — банахів простір.

Послідовність $\{e_1, e_2, \dots\} \subset E$ називається **базисом Шаудера** простора E , якщо

$$\forall x \in E : \exists! x_k \in \mathbb{R}(\mathbb{C}) : x = \sum_{k=1}^{\infty} x_k e_k$$

Proposition 3.6.2 Нехай E — банахів простір, що містить базис Шаудера. Тоді E — сепарабельний.

Proof.

Випадок дійсного нормованого простору.

Оберемо множину $A = \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} x_k e_k \mid x_k \in \mathbb{Q} \right\}$.

Нехай $x \in E$, тоді за умовою, $x = \sum_{k=1}^{\infty} x_k e_k$ єдиним чином. Нехай задане $\varepsilon > 0$. Тоді на кожному з

$\left(x_k - \frac{\varepsilon}{\|e_k\|2^k}, x_k + \frac{\varepsilon}{\|e_k\|2^k}\right)$ існує раціональне число $y_k \in \mathbb{Q}$. Оберемо $y \in A$ так, що $y = \sum_{k=1}^{\infty} y_k e_k$.

Позначимо $x^{(n)}, y^{(n)}$ за часткову суму ряду (перші n додаються). Тоді

$$\|x^{(n)} - y^{(n)}\| = \left\| \sum_{k=1}^n (x_k - y_k) e_k \right\| \leq \sum_{k=1}^n \|(x_k - y_k) e_k\| = \sum_{k=1}^n |x_k - y_k| \|e_k\| \leq \sum_{k=1}^n \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

Далі спрямовуємо $n \rightarrow \infty$. Тоді $x^{(n)} \rightarrow x, y^{(n)} \rightarrow y$. Після чого отримаємо $\|x - y\| \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon$.

Отже, A скрізь щільна множина, ну тобто $\bar{A} = E$.

Випадок комплексного нормованого простору.

Оберемо множину $A = \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} x_k e_k \mid x_k = \alpha_k + i\beta_k, \alpha_k, \beta_k \in \mathbb{Q} \right\}$. Далі плюс-мінус аналогічно. ■

Remark 3.6.3 Якщо зробити [*клік*](#) сюди, то тут буде стаття про приклад сепарабельного банахового простору, який не містить базис Шаудера. Доведено П. Енфло. Власне, це означає, що зворотне твердження не працює.

Theorem 3.6.4 Простір l_p містить базис Шаудера. Причому цей базис матиме вигляд $\{e_1, e_2, e_3, \dots\}$, де кожний $e_i = (0, \dots, 0, \underbrace{1}_{\text{на } i\text{-ій позиції}}, 0, \dots)$.

Proof.

I. Існування.

Фіксуємо елемент $x \in l_p$, де $x = (x_1, x_2, \dots)$ та $\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p < +\infty$. Покладемо елемент (що є частковою сумою) $s_n = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$ та доведемо, що послідовність $(s_n)_{n=1}^{\infty}$ — фундаментальна. При $n > m$

$$\|s_n - s_m\|_p = \|(0, \dots, 0, x_{m+1}, \dots, x_n, 0, \dots)\|_p = \left(\sum_{k=m+1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Фундаментальність $(s_n)_{n=1}^{\infty}$ впливає зі збіжності числового ряду $\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p$. Оскільки l_p — банахів, то

$(l_p)_{n=1}^{\infty}$ — збіжний, тобто $\sum_{k=1}^{\infty} x_k e_k$ збігається до деякого елемента. Зокрема доведемо, що $\sum_{k=1}^{\infty} x_k e_k = x$.

$$\|x - s_n\|_p = \left\| x - \sum_{k=1}^n x_k e_k \right\|_p = \|(0, \dots, 0, x_{n+1}, x_{n+2}, \dots)\|_p = \left(\sum_{k=n+1}^{\infty} |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Знову зі збіжності числового ряду $\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p$ впливає бажане.

II. Єдиність.

!Припустимо, що $x = \sum_{k=1}^{\infty} y_k e_k$ — друге представлення. Тоді отримаємо $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n (x_k - y_k) e_k = 0$.

Звідси отримаємо $\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=1}^n (x_k - y_k) e_k \right\|_p = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n |x_k - y_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} = 0$. Єдина можливість тут — це $x_k = y_k$ при всіх $k \in \mathbb{N}$ — суперечність! ■

3.6.2 Простір, що спряжений до $l_p, 1 < p < \infty$

Theorem 3.6.5 Нехай $p, p' > 1$ таким чином, що $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$. Тоді $(l_p)' \cong l_{p'}$ ізометричним чином. Часто пишуть просто $(l_p)' = l_{p'}$.

Lemma 3.6.6 Для будь-якого $f \in (l_p)'$ існує елемент $(f_k)_{k=1}^\infty \in l_{p'}$, такий, що $f(x) = \sum_{k=1}^\infty f_k x_k$ для всіх $x \in l_p$.

Proof.

Нехай $f \in (l_p)'$ (тобто лінійний неперервний функціонал). Тоді звідси отримаємо:

$$f(x) = f\left(\sum_{k=1}^\infty x_k e_k\right) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n x_k e_k\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n x_k f(e_k) = \sum_{k=1}^\infty x_k f(e_k) \stackrel{f(e_k) \stackrel{\text{пок.л.}}{=} f_k}{=} \sum_{k=1}^\infty f_k x_k.$$

Доведемо, що $(f_k)_{k=1}^\infty \in l_{p'}$. Для цього підберемо елемент $y \in l_p$ ось таким чином, щоб

$$f(y) = \sum_{k=1}^\infty y_k f_k \stackrel{\text{був рівний}}{=} \sum_{k=1}^n |f_k|^{p'}.$$

Можна для цього взяти елемент $y = (|f_1|^{p'-1} e^{-i \arg f_1}, \dots, |f_n|^{p'-1} e^{-i \arg f_n}, 0, 0, \dots)$. Оскільки f

$$\text{обмежений, то звідси } |f(y)| \leq \|f\| \|y\| = \|f\| \left(\sum_{k=1}^n |f_k|^{p'-1} \cdot e^{-i \arg f_k} |f_k|^{p'} \right)^{\frac{1}{p}} = \|f\| \left(\sum_{k=1}^n |f_k|^{p'} \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Маючи щойно отриману нерівність та рівність трошки вище, отримаємо

$$\sum_{k=1}^n |f_k|^{p'} \leq \|f\| \left(\sum_{k=1}^n |f_k|^{p'} \right)^{\frac{1}{p}} \implies \left(\sum_{k=1}^n |f_k|^{p'} \right)^{\frac{1}{p'}} \leq \|f\|, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Остання оцінка стверджує, що ряд збіжний, внаслідок чого $(f_k)_{k=1}^\infty \in l_{p'}$. ■

Lemma 3.6.7 Для кожного $(f_k)_{k=1}^\infty \in l_{p'}$ рівність $f(x) = \sum_{k=1}^\infty f_k x_k$ визначає лінійний та неперервний функціонал на l_p .

Proof.

Нехай $(f_k)_{k=1}^\infty \in l_{p'}$. Завдяки нерівності Гольдера, отримаємо:

$$|f(x)| \leq \left(\sum_{k=1}^\infty |f_k|^{p'} \right)^{\frac{1}{p'}} \left(\sum_{k=1}^\infty |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} = c \|x\|_p < +\infty.$$

Отже, f — обмежений та $\|f\| \leq c$. Як доводиться лінійність, цілком зрозуміло. ■

Під час доведення першої леми ми отримали нерівність $c \leq \|f\|$. Маючи ще нерівність $c \geq \|f\|$ з другої леми, ми отримаємо $\|f\| = c$, тобто $\|f\| = \left(\sum_{k=1}^\infty |f_k|^{p'} \right)^{\frac{1}{p'}}$. Ліворуч маєтись на увазі норма від $f \in (l_p)'$, а праворуч норма $(f_k) \in l_{p'}$.

Короче, маємо $A: l_{p'} \rightarrow (l_p)'$, який задається таким чином: $A(f_k)_{k=1}^\infty (x) = \sum_{k=1}^\infty x_k f_k$ (оператор A повертає функціонал, тому я тут написав аргумент (x)). Може, красивіше було б написати $A(f_k)_{k=1}^\infty = \sum_{k=1}^\infty \cdot f_k$, ще не знаю. Він є ізоморфізмом, оскільки існує $A^{-1}: (l_p)' \rightarrow l_{p'}$, що задається як $A^{-1}l = (l(e_1), l(e_2), \dots)$. Усі два оператори коректно визначені за теоремами вище. Також ми довели, що $\|l\| = \|Af\| = \|f\|$.

3.6.3 Простір, що спряжений до l_1

Theorem 3.6.8 $(l_1)' \cong l_\infty$ ізометричним чином. Часто пишуть просто $(l_1)' = l_\infty$.

Proof.

Нехай $(f_k)_{k=1}^\infty \in l_\infty$. Визначимо функціонал $f(x) = \sum_{k=1}^\infty f_k x_k$, який вже ясно, що лінійний. Залишилося довести обмеженість.

$$|f(x)| = \left| \sum_{k=1}^\infty f_k x_k \right| \leq \sup_{k \in \mathbb{N}} |f_k| \sum_{k=1}^\infty |x_k| = \|f\|_\infty \|x\|_1.$$

Із цього всього ми встановили $l_\infty \subset (l_1)'$.

Нехай $f \in (l_1)'$, тобто лінійний та обмежений функціонал. Аналогічним чином отримаємо, що $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k x_k$, де $f_k = f(e_k)$. Тепер хочемо $(f_k)_{k=1}^{\infty} \in l_{\infty}$. Дійсно це спрацює, бо $\|f\|_{\infty} = \sup_{k \in \mathbb{N}} |f_k| = \sup_{k \in \mathbb{N}} |f(e_k)| \leq \sup_{k \in \mathbb{N}} \|f\| \|e_k\|_1 = \|f\| \sup\{1, 1, \dots\} = \|f\| < \infty$. Причому ми також довели, що $\|f\| = \|f\|_{\infty}$. ■

3.6.4 Простори, що спряжені до l_{∞}

Proposition 3.6.9 $(l_{\infty})' \supsetneq l_1$.

Спочатку доведемо вкладення. Дійсно, нехай $(f_k)_{k=1}^{\infty} \in l_1$, тоді функціонал $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k x_k$, $x \in l_{\infty}$

все одно лінійний, а обмеженість доводиться, завдяки оцінці

$$|f(x)| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |f_k x_k| \leq \sup_{k \in \mathbb{N}} |x_k| \sum_{k=1}^{\infty} |f_k| = \|x\|_{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} |f_k|.$$

Отже, довели вкладення, при цьому ми ще довели $\|f\| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |f_k|$.

Якщо покласти такий $x \in l_{\infty}$, де $x_k = e^{-i \arg f_k}$, то взагалі отримаємо $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} |f_k| = \|f\|_1$.

Час з'ясувати, чому не допускається рівність. Розглянемо лінійну множину $C \subset l_{\infty}$, яка містить збіжні послідовності комплексних чисел. Визначимо $f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} x_k$ для кожного $x = (x_1, x_2, \dots) \in C$.

Цілком ясно, що це лінійний функціонал. Обмеженість впливає з оцінки $|f(x)| = \left| \lim_{k \rightarrow \infty} x_k \right| \leq \sup_{k \in \mathbb{N}} |x_k| = \|x\|$.

Отже, $f \in C'$ (лінійний та неперервний функціонал), причому $\|f\| \leq 1$. Ми можемо продовжити функціонал f до функціонала $F \in (l_{\infty})'$ зі збереженням норми, за теоремою Гана-Банаха. Функціонал F не можна записати як $F(x) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k f_k$. Представимо, що можна. Маємо послідовність $x \in C$, ліміт не зміниться при зміні скінченного числа членів, тобто $F(x) = f(x)$ залишиться таким самим. Проте із іншого боку, зміниться $F(x) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k f_k$.

3.6.5 Простір, що спряжений до L_p , $1 < p < \infty$.

Theorem 3.6.10 Нехай $1 < p < \infty$ та $p' > 1$, причому $\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$. Також задано $(X, \lambda, \mathcal{F})$ — вимірний простір, де λ — σ -скінченна міра. Простір $(L_p)' \cong L_{p'}$ ізометричним чином. Ізоморфізм $l: (L_p)' \rightarrow L_{p'}$ задається наступним чином:

$$l(x) = \int_X h(q) x(q) d\lambda(q).$$

Доведення див. в pdf теорії міри.

3.6.6 Простір, що спряжений до $C(K)$

Припустимо, що K — метричний компакт та $\mathfrak{B}(K)$ — борельова σ -алгебра.

Definition 3.6.11 Заряд ω на вимірній множині $(K, \mathfrak{B}(K))$ назовемо **регулярним**, якщо

$$\omega_+, \omega_- \text{ — обидва регулярні}$$

Позначення: $W(K)$ — множина регулярних зарядів.

Remark 3.6.12 $W(K)$ буде векторним простором. Також якщо покласти $\|\omega\| = |\omega|(K)$, де $|\omega|$ — повна варіація заряду, то тоді ми отримаємо нормований простір. Причому $W(K)$ — банахів додатково.

Theorem 3.6.13 Теорема Маркова

$(C(K))' \cong W(K)$ ізометричним чином. Ізоморфізм $l: (C(K))' \rightarrow W(K)$ задається таким чином:

$$l(x) = \int_K x(q) d\omega(q).$$

Без доведення. Наведу частинний випадок даної теореми.

Theorem 3.6.14 Теорема Піка

Для кожного функціонала $l \in (C([0, 1]))'$ існує функція g обмеженої варіації, для якої l можна представити через інтеграл Рімана-Стілт'єса таким чином:

$$l(x) = \int_0^1 x(t) dg(t), \text{ причому } V(g; [0, 1]) = \|l\|.$$

Proof.

Нехай $l \in (C([0, 1]))'$, визначений на підпросторі $M([0, 1])$ — простір обмежених функцій. За теоремою Гана-Банаха, продовжимо до функціонала $L \in (M([0, 1]))'$.

Нехай $t \in [0, 1]$, позначимо $u_t = \mathbb{1}_{[0, t]}$. Сама функція $u_t \in M([0, 1])$, тому можна покласти $g(t) = L(u_t)$. Покажемо, що сама $g \in BV([0, 1])$.

Оберемо розбиття π відрізки $[0, 1]$ та позначимо $\varepsilon_i = \operatorname{sgn}(g(t_i) - g(t_{i-1}))$. Тоді маємо:

$$V_\pi(g, [0, 1]) = \sum_{i=1}^n |g(t_i) - g(t_{i-1})| = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i (Lu_{t_i} - Lu_{t_{i-1}}) = L \left(\sum_{i=1}^n \varepsilon_i (u_{t_i} - u_{t_{i-1}}) \right) = L \left(\sum_{i=1}^n \varepsilon_i \mathbb{1}_{(t_{i-1}, t_i]} \right).$$

Позначимо тимчасово за $z = \left(\sum_{i=1}^n \varepsilon_i \mathbb{1}_{(t_{i-1}, t_i]} \right)$. Вона може приймати значення $0, 1, -1$, тому звідси

$\|z\| = 1$. Оскільки L — обмежений, то

$$|V_\pi(g, [0, 1])| = |Lz| \leq \|L\| \|z\| = \|l\|.$$

Ця нерівність свідчить про те, що $g \in BV([0, 1])$, причому автоматично $V(g, [0, 1]) \leq \|l\|$.

Тепер доведемо рівність. Нехай $x \in C([0, 1])$. Покладемо такі прості функції:

$$x_n(t) = \sum_{k=1}^n x \left(\frac{k-1}{n} \right) \left(u_{\frac{k}{n}}(t) - u_{\frac{k-1}{n}}(t) \right) = \sum_{k=1}^n x \left(\frac{k-1}{n} \right) \mathbb{1}_{\left(\frac{k-1}{n}, \frac{k}{n} \right]}(t).$$

$$L(x_n) = \sum_{k=1}^n x \left(\frac{k-1}{n} \right) \left(g \left(\frac{k}{n} \right) - g \left(\frac{k-1}{n} \right) \right).$$

Оскільки $x \in C([0, 1])$, то $x \in \mathcal{RS}([0, 1], g)$. Більш того, $(x_n)_{n=1}^\infty$ — послідовність простих функцій, що збігається рівномірно до x . Отже, маючи це все, можна написати рівність:

$$L(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} L(x_n) = \int_0^1 x(t) dg(t).$$

Проте $x \in C([0, 1])$, тож звідси $L(x) = l(x) = \int_0^1 x(t) dg(t)$.

Нарешті, $|l(x)| = \left| \int_0^1 x(t) dg(t) \right| \leq \left| \int_0^1 |x(t)| dg(t) \right| \leq \|x\| V(g, [0, 1])$. Таким чином, $\|l\| \leq V(g, [0, 1])$.

Знайшли варіацію $V(g, [0, 1]) = \|l\|$. ■

Remark 3.6.15 Теорема працює, якщо розглянути довільний відрізок $[a, b]$.

3.7 Вкладення нормованих просторів

Theorem 3.7.1 Нехай E — лінійний нормований простір. Тоді $E \subset E''$, під другою множиною мається на увазі друге спряження, тобто $E'' = (E')'$. При цьому $\|x\|_E = \|x\|_{E''}$.

Proof.

Для зручності елементи простору E позначимо через $x, y, \dots$; елементи простору E' — через $l, m, \dots$; елементи простору E'' — через $L, M, \dots$.

Визначимо відображення φ ось так: кожному $x \in E$ поставимо в відповідність $\varphi(x) = L_x \in E''$. При цьому ми покладемо $L_x(l) = l(x)$ при всіх $l \in E'$.

Доведемо, що L_x — лінійний та неперервний функціонал. Нехай $l, m \in E', \lambda, \mu \in \mathbb{K}$, тоді звідси $L_x(\lambda l + \mu m) = (\lambda l + \mu m)(x) = \lambda l(x) + \mu m(x) = \lambda L_x(l) + \mu L_x(m)$. Далі маємо

$$|L_x(l)| = |l(x)| \leq \|l\| \cdot \|x\|.$$

Отже, довели бажане, причому ми отримали оцінку $\|L_x\| \leq \|x\|$.

Тепер доведемо, що саме φ — лінійне відображення. Нехай $x, y \in E, \lambda, \mu \in \mathbb{K}$, тоді ми хочемо довести рівність $\varphi(\lambda x + \mu y) = \lambda \varphi(x) + \mu \varphi(y)$, або що теж саме $L_{\lambda x + \mu y} = \lambda L_x + \mu L_y$. Така рівність має виконуватися для кожного функціонала $l \in E'$. Дійсно,

$$L_{\lambda x + \mu y}(l) = l(\lambda x + \mu y) = \lambda l(x) + \mu l(y) = \lambda L_x(l) + \mu L_y(l) = (\lambda L_x + \mu L_y)(l).$$

Доведемо, що φ — ін'єктивне відображення. Припустимо, що $x \in \ker \varphi$ та $x \neq 0$. Тоді за наслідком теореми Гана-Банаха, існує функціонал $l \in E'$, для якого $\|l\| = 1$, $l(x) = \|x\|$. Звідси $L_x(l) = l(x) = \|x\| \neq 0$, тобто $L_x \neq 0$. Це означає лише, що $x \notin \ker \varphi$ — суперечність!

Залишилося довести, що $\|x\| = \|L_x\|$. Точніше, залишилося $\|x\| \leq \|L_x\|$. При $x = 0$ все ясно. При $x \neq 0$, знову за наслідком Гана-Банаха, існує функціонал $l \in E'$, для якого $\|l\| = 1$, $l(x) = \|x\|$. Тоді $\|x\| = l(x) = L_x(l) \leq \|L_x\| \|l\| = \|L_x\|$.

Отже, $\varphi: E \rightarrow E''$ — лінійне та ін'єктивне відображення, що зберігає норму. Значить, E ізометрично ізоморфний $\text{Im } E \subset E''$. Отже, кожний елемент $x \in E$ можемо ототожнити з його елементом $L_x \in E''$. Звідси отримаємо вкладення $E \subset E''$ та рівність $\|x\|_E = \|x\|_{E''}$. ■

Definition 3.7.2 Задано E — банахів простір.

Простір E називають **рефлексивним**, якщо

$$E'' = \varphi(E),$$

де $\varphi: E \rightarrow E''$, який задавали під час доведення теореми.

Example 3.7.3 Зокрема рефлексивними будуть такі простори: l_p та L_p при $1 < p < \infty$.

Також скінченновимірний простір E буде рефлексивним.

Example 3.7.4 Водночас нереплексивними будуть такі простори: l_1 , l_∞ , L_1 , L_∞ (останні два нереплексивні при $\dim L_1 = \infty$, $\dim L_\infty = \infty$; $C(K)$ (буде нереплексивним, якщо K нескінченна множина).

3.8 Про види збіжностей

Ми вже знаємо один тип збіжностей. Переформулюю ще раз означення, але доповню це одним словом в дужках.

Definition 3.8.1 Задано E — лінійний нормований простір.

Послідовність $(x_n)_{n=1}^\infty$ називається **(сильно) збіжною** до $x \in E$, якщо

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x - x_n\| = 0$$

Позначення: $x_n \rightarrow x$.

Тобто сильна збіжність — це збіжність за нормою.

Definition 3.8.2 Нехай E — лінійний нормований простір.

Послідовність $(x_n)_{n=1}^\infty$ називається **слабко збіжною** до $x \in E$, якщо

$$\forall l \in E' : l(x_n) \rightarrow l(x)$$

Позначення: $x_n \xrightarrow{w} x$.

Якщо розглянути спряжений простір E' , то крім сильної та слабкої збіжності існує ще один тип.

Definition 3.8.3 Нехай E — лінійний нормований простір.

Послідовність функціоналів $(l_n)_{n=1}^\infty \subset E'$ називається **слабко* збіжною** до $l \in E'$, якщо

$$\forall x \in E : l_n(x) \rightarrow l(x)$$

Позначення: $l_n \xrightarrow{w^*} l$.

Proposition 3.8.4 Задано E — лінійний нормований простір та послідовність $(x_n)_{n=1}^\infty$. Тоді:

$$x_n \rightarrow x \implies x_n \xrightarrow{w} x.$$

Proof.

Дійсно, нехай $x_n \rightarrow x$, тобто звідси $\|x - x_n\| \rightarrow 0$ при $n \rightarrow \infty$. Маючи це, отримаємо $\forall l \in E'$:

$$|l(x_n) - l(x)| = |l(x_n - x)| \leq \|l\| \|x_n - x\| \rightarrow 0. \text{ Таким чином, } x_n \xrightarrow{w} x. \quad \blacksquare$$

Proposition 3.8.5 Задано E — лінійний нормований простір та послідовність $(l_n)_{n=1}^\infty \subset E'$. Тоді:
 $l_n \rightarrow l \implies l_n \xrightarrow{w} l \implies l_n \xrightarrow{w^*} l$.

Proof.

Імплікація $l_n \rightarrow l \implies l_n \xrightarrow{w} l$ була доведена вище. Залишилося $l_n \xrightarrow{w} l \implies l_n \xrightarrow{w^*} l$.

Нехай $l_n \xrightarrow{w} l$, тобто $\forall L \in E'' : L(l_n) \rightarrow L(l)$. Зафіксуємо елемент $x \in E$. Ми вже доводили, що $E \subset E''$, тобто $x \in E''$, де в цьому випадку $x = L_x$ такий, що $L_x(l) = l(x)$. Звідси

$l_n(x) = L_x(l_n) \rightarrow L_x(l) = l(x)$. Звідси випливає, що $l_n \xrightarrow{w^*} l$. ■

Example 3.8.6 Зараз покажемо, чому в зворотний бік не працює.

$x_n \xrightarrow{w} x \not\implies x_n \rightarrow x$.

Розглянемо простір l_p та зафіксуємо послідовність $(e_n)_{n=1}^\infty$, де кожний e_j — елемент базиса Шаудера. Спочатку покажемо, що $(e_n)_{n=1}^\infty$ слабо збігається. Зафіксуємо довільний функціонал $l \in (l_p)' = l_{p'}$,

тобто $l = (l_1, l_2, \dots)$. Це означає, що $\sum_{j=1}^\infty |l_j|^{p'} < +\infty$, а тому за необхідною умовою, $|l_j|^{p'} \rightarrow 0 \implies$

$l_j \rightarrow 0$. Із іншого боку, ми вже знаємо, що $l_j = l(e_j) \rightarrow 0 = l(0)$ при $j \rightarrow \infty$. Це як раз свідчить про те, що $e_j \xrightarrow{w} 0$.

Проте зауважимо, що $\|e_j - 0\| = \|e_j\| = 1 \not\rightarrow 0$. Це як раз означає, що $e_j \not\rightarrow 0$.

$f_n \xrightarrow{w^*} f \not\implies f_n \xrightarrow{w} f$.

Розглянемо простір l_1 та зафіксуємо послідовність $(f_n)_{n=1}^\infty$, $f_n = ?$. Спочатку покажемо, що $(f_n)_{n=1}^\infty$ слабо* збігається. Зафіксуємо довільний елемент $x \in c_0$. Значить, $x_j \rightarrow 0$ при $j \rightarrow \infty$. Оберемо

$f_n = (-1)^n$. Тоді звідси $f_n(x) = \sum_{k=1}^\infty x_k f_n^k(e_k)$. (TODO: не можу добити)

Proposition 3.8.7 Утім якщо E — рефлексивний лінійний нормований простір та $(l_n)_{n=1}^\infty \subset E'$, тоді

$l_n \xrightarrow{w} l \iff l_n \xrightarrow{w^*} l$.

Remark 3.8.8 Границя єдина за слабою* збіжністю, слабою збіжністю та сильною збіжністю.

Proposition 3.8.9 Задано E — банахів та послідовність $(l_n)_{n=1}^\infty$, яка слабо* збігається. Тоді $(l_n)_{n=1}^\infty$ — обмежена.

Proof.

Дійсно, маємо $\forall x \in E : l_n(x) \rightarrow l(x)$, тобто числова послідовність $(l_n(x))_{n=1}^\infty$ збігається, тоді обмежена. Значить, за теоремою Банаха-Штайнгауза, послідовність $(\|l_n\|)_{n=1}^\infty$ обмежена. ■

Theorem 3.8.10 Задано E — банахів простір та $(l_n)_{n=1}^\infty \subset E'$ — така послідовність, що $\forall x \in E : (l_n(x))_{n=1}^\infty$ — фундаментальна. Тоді $\exists l \in E' : l_n \xrightarrow{w^*} l$.

Proof.

Оскільки $\forall x \in E : (l_n(x))_{n=1}^\infty$ фундаментальна, то (як числова послідовність) вона збіжна. Визначимо функціонал $l(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} l_n(x)$. Зважаючи на той факт, що l_n — лінійний, то l — лінійний в силу граничного переходу. Залишилося довести обмеженість.

При кожному $x \in E$ послідовність $(l_n(x))_{n=1}^\infty$ (вже з'ясували) збіжна, тож обмежена. Але за теоремою Банаха-Штайнгауза, $\exists c > 0 : \forall n \geq 1 : \|l_n\| \leq c$. Значить, $\forall n \geq 1, \forall x \in E : |l_n(x)| \leq \|l\| \|x\| \leq c \|x\|$. Знову переходячи до границі, отримаємо $|l(x)| \leq c \|x\|$.

Отже, $\forall x \in E : l_n(x) \rightarrow l(x) \implies l_n \xrightarrow{w^*} l$. ■

Theorem 3.8.11 Критерій слабкої* збіжності

Задано E — банахів та множина M — скрізь щільна в E . Нехай $(l_n)_{n=1}^\infty \subset E'$.

$l_n \xrightarrow{w^*} l \iff \begin{cases} \forall x \in M : l_n(x) \rightarrow l(x) \\ \exists c > 0 : \forall n \geq 1 : \|l_n\| \leq c \end{cases}$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $l_n \xrightarrow{w^*} l$. Тобто $\forall x \in E : l_n(x) \rightarrow l(x)$, зокрема $\forall x \in M$. Обмеженість норм $\|l_n\|$ автоматично виконується.

$\Leftarrow$ Дано: ці дві умови. Ми хочемо $\forall y \in E : l_n(y) \rightarrow l(y)$.

При $x \in M$ маємо наступне:

$$|l_n(y) - l(y)| \leq |l_n(y) - l_n(x)| + |l_n(x) - l(x)| + |l(x) - l(y)| \leq \|l_n\| \|y - x\| + |l_n(x) - l(x)| + \|l\| \|x - y\| \leq (c + \|l\|) \|x - y\| + |l_n(x) - l(x)|.$$

Проте $C(M) = E$, тож звідси $\forall y \in E : \forall \varepsilon > 0 : \exists x \in M : \|x - y\| < \frac{\varepsilon}{2(c + \|l\|)}$. В силу першої умови,

$$\exists N : \forall n > N : |l_n(x) - l(x)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Значить, $|l_n(y) - l(y)| < \varepsilon$. ■

Remark 3.8.12 Судячи з доведення, в $\Leftarrow$ не обов'язково вимагати бути E повним. Також в формулюванні теореми досить вимагати, щоб M була тотальною в E .

Example 3.8.13 На просторі $C([0, 1])$ визначимо послідовність $l_n(x) = n \int_0^{\frac{1}{n}} x(t) dt$. Доведемо, що l_n слабо* збіжний.

Розглянемо спочатку простір многочленів на $[0, 1]$ — цілня підмножина $C([0, 1])$. Оберемо $x(t) = a_n t^n + \dots + a_1 t + a_0$. Тоді

$$l_n(x) = n \int_0^{\frac{1}{n}} a_n t^n + \dots + a_1 t + a_0 dt = n \left(\frac{a_n}{n+1} t^{n+1} + \frac{a_{n-1}}{n} t^n + \dots + a_0 t \right) \Big|_0^{\frac{1}{n}} \rightarrow a_0 = x(0).$$

Позначимо новий функціонал $l(x) = x(0)$, який справді лінійний та обмежений. Тоді $l_n(x) \rightarrow l(x)$.

При цьому самі норми будуть обмеженими. Справді,

$$|l_n(x)| = n \left| \int_0^{\frac{1}{n}} x(t) dt \right| \leq n \int_0^{\frac{1}{n}} |x(t)| dt \leq \|x\| \implies \|l_n\| \leq 1.$$

Отже, за критерієм, $l_n \xrightarrow{w^*} l$.

3.9 Про види збіжностей в операторах

Definition 3.9.1 Нехай X, Y — лінійні нормовані простори.

Послідовність операторів $(A_n)_{n=1}^\infty$ називається **рівномірно збіжною** до A , якщо

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|A_n - A\| = 0.$$

Позначення: $A_n \xrightarrow{\rightarrow} A$ при $n \rightarrow \infty$.

Definition 3.9.2 Нехай X, Y — лінійні нормовані простори.

Послідовність операторів $(A_n)_{n=1}^\infty$ називається **сильно збіжною** до A , якщо

$$\forall x \in X : \lim_{n \rightarrow \infty} A_n x = Ax.$$

Позначення: $A_n \xrightarrow{s} A$ при $n \rightarrow \infty$.

Definition 3.9.3 Нехай X, Y — лінійні нормовані простори.

Послідовність операторів $(A_n)_{n=1}^\infty$ називається **слабко збіжною** до A , якщо

$$\forall x \in X : A_n x \xrightarrow{w} Ax.$$

Позначення: $A_n \xrightarrow{w} A$ при $n \rightarrow \infty$.

Proposition 3.9.4 Нехай X, Y — лінійні нормовані простори та послідовність $(A_n)_{n=1}^\infty \subset \mathcal{B}(X, Y)$.

Тоді $A_n \xrightarrow{\rightarrow} A \implies A_n \xrightarrow{s} A \implies A_n \xrightarrow{w} A$.

Proof.

Нехай $A_n \xrightarrow{\rightarrow} A$. Зафіксуємо $x \in X$. Тоді

$$\|A_n x - Ax\| = \|(A_n - A)x\| \leq \|A_n - A\| \|x\| \rightarrow 0 \text{ при } n \rightarrow \infty.$$

Значить, ми отримали $A_n \xrightarrow{s} A$. Ще раз зафіксуємо $x \in X$. Тоді $(A_n x)_{n=1}^\infty$ збігається сильно до $Ax \in Y$. Із сильної збіжності випливає слабка збіжність (минулий розділ), тож $A_n x \xrightarrow{w} Ax$. Отже, $A_n \xrightarrow{w} A$. ■

Example 3.9.5 Зараз покажемо, чому в зворотні боки не працюють.

$$A_n \xrightarrow{w} A \not\Rightarrow A_n \xrightarrow{s} A.$$

Перш за все ознайомимось з оператором $s: l_2 \rightarrow l_2$ — оператор зсуву, який працює таким чином: $(x_1, x_2, x_3, \dots) \xrightarrow{s} (0, x_1, x_2, \dots)$. Оператор $s \in \mathcal{B}(l_2, l_2)$ (детально це доводити не буду, бо в цілому ясно). Тепер розглянемо послідовність операторів $(A_n)_{n=1}^\infty$, що задані як $A_n = s^n$, тобто певна кількість зсуву. Зауважимо, що $A_n \xrightarrow{w} O$.

Дійсно, нехай $l \in (l_2)'$. Тоді звідси $l(x) = \sum_{k=1}^\infty l_k x_k$ для деякого елементу $(l_k)_{k=1}^\infty \in l_2$. Тоді зауважимо:

$$|l(A_n x)| = \left| \sum_{k=1}^\infty l_{n+k} x_k \right| \leq \sum_{k=1}^\infty |l_{n+k} x_k| \leq \left(\sum_{k=1}^\infty |l_{n+k}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k=1}^\infty |x_k|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{m=n+1}^\infty |l_m|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k=1}^\infty |x_k|^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Тоді звідси $l(A_n x) \rightarrow 0 = l(Ox)$ через хвіст ряду. Отже, звідси $A_n \xrightarrow{w} O$.

При цьому зауважимо, що $A_n \not\xrightarrow{s} O$. Дійсно,

$$\|A_n x\| = \|(\underbrace{0, \dots, 0}_{n \text{ штук}}, x_1, x_2, \dots)\| = \sum_{k=1}^\infty |x_k|^2, \text{ якщо взяти } x = e_p, p > n, \text{ то отримаємо } \|A_n x\| = 1.$$

$$A_n \xrightarrow{s} A \not\Rightarrow A_n \rightarrow A.$$

Розглянемо послідовність операторів $(A_n)_{n=1}^\infty \subset \mathcal{B}(l_2, l_2)$, де кожний $A_n x = (x_1, \dots, x_n, 0, 0, \dots)$. Зауважимо, що $A_n \xrightarrow{s} I$ (тут I — одиничний оператор).

$$\text{Дійсно, } \|A_n x - Ix\| = \|(0, \dots, 0, x_{n+1}, x_{n+2}, \dots)\| = \sum_{k=1}^\infty |x_{n+k}|^2 \rightarrow 0.$$

При цьому зауважимо, що $A_n \not\xrightarrow{s} I$. Дійсно, ми маємо наступне:

$$\|A_n - I\| = \sup_{\|x\|=1} \|(A_n - I)x\| \geq \|(A_n - I)e_j\| = \|e_j\| = 1 \text{ (при } j > n).$$

Theorem 3.9.6 Задані X, Y — банахові простори та $(A_n)_{n=1}^\infty \subset \mathcal{B}(X, Y)$ — така послідовність, що $\forall x \in X : (A_n x)_{n=1}^\infty$ — фундаментальна. Тоді $\exists A \in \mathcal{B}(X, Y) : A_n \xrightarrow{s} A$.

Було щось схоже раніше. Доведення повторюється.

3.10 Спряжені оператори

Definition 3.10.1 Задані X, Y — нормовані простори та $A \in \mathcal{B}(X, Y)$.

Спряженим до A називають оператор $A^*: Y' \rightarrow X'$, що визначений так:

$$(A^* l)(x) = l(Ax), \quad l \in Y', \quad x \in X$$

(насправді, можна трохи послабити умови та попросити $A \in \mathcal{L}(X, Y)$, але таке рідко буває.)

Remark 3.10.2 Дане означення оператора є коректним.

Дійсно, припустимо, що існує $l \in Y'$, якому ставиться в відповідність два різні функціонали $m_1, m_2 \in X'$. Отже, має існувати $x \in X$, щоб $m_1(x) \neq m_2(x)$. Проте за визначенням, $(A^* l)(x) = m_1(x) = m_2(x)$ — суперечність!

Theorem 3.10.3 Задано $A \in \mathcal{B}(X, Y)$. Тоді $A^* \in \mathcal{B}(Y', X')$, при цьому маємо $\|A^*\| = \|A\|$.

Proof.

A^* — лінійний.

Нехай $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$ та $l_1, l_2 \in E'_2$. Тоді для кожного $x \in E_1$ маємо

$$(A^*(\lambda_1 l_1 + \lambda_2 l_2))(x) = (\lambda_1 l_1 + \lambda_2 l_2)(Ax) = \lambda_1 l_1(Ax) + \lambda_2 l_2(Ax) = \lambda_1 (A^* l_1)(x) + \lambda_2 (A^* l_2)(x).$$

$$A^*(\lambda_1 l_1 + \lambda_2 l_2) = \lambda_1 A^* l_1 + \lambda_2 A^* l_2.$$

(ми довели, що якщо $A \in \mathcal{L}(X, Y)$, то тоді й $A^* \in \mathcal{L}(Y', X')$, але знову ж таки.)

A^* — обмежений.

$$|(A^* l)(x)| = |l(Ax)| \leq \|l\| \|Ax\| \leq \|l\| \|A\| \|x\|. \text{ Звідси й випливає нерівність } \|A^* l\| \leq \|A\| \|l\|.$$

$$\|A^*\| = \|A\|.$$

Щойно ми довели, що $\|A^*\| \leq \|A\|$. Для зворотної нерівності зробимо наступне. Оберемо будь-який $x \in E_1$, позначимо $y = Ax$. Тоді за наслідком теореми Гана-Банаха, знайдеться $l \in E'_2$, для якого $\|l\| = 1$ та $l(y) = \|y\|$. Звідси $l(Ax) = \|Ax\|$, а тому $\|Ax\| = |l(Ax)| = |(A^*l)(x)| \leq \|A^*\| \|l\| \|x\| = \|A^*\| \|x\|$. Отже, для всіх $x \in E_1$ справедлива нерівність $\|Ax\| \leq \|A^*\| \|x\|$, зокрема $\|A\| \leq \|A^*\|$. ■

Theorem 3.10.4 Нехай $A \in \mathcal{B}(X, Y)$ та $B \in \mathcal{B}(Y, Z)$. Тоді $(BA)^* = A^*B^*$.

Proof.

Для кожного $l \in Z'$, $x \in X$ маємо рівність $((BA)^*l)(x) = l(BAx) = l(B(Ax)) = (B^*l)(Ax)$. Функціонал $B^*l \in Y'$ позначимо за m . Тоді отримаємо $m(Ax) = (A^*m)(x)$. Отже, $((BA)^*l)(x) = (A^*B^*l)(x)$. ■

Theorem 3.10.5 Нехай $A \in \mathcal{B}(X, Y)$. Тоді $(A^*)^* = A$ за умовою, що X, Y — рефлексивні.

Proof.

Маємо $A^*: Y' \rightarrow X'$, беремо до нього спряжений $(A^*)^*: X'' \rightarrow Y''$, але в силу рефлексивності отримаємо $(A^*)^* \in \mathcal{B}(X, Y)$. У нас вже була відповідність між E, E'' , що задається таким чином: $E \ni x \mapsto L_x \in E''$. Тоді для кожного $l \in Y'$ та $x \in X$ маємо $((A^*)^*L_x)(l) = L_x(A^*l) = (A^*l)(x) = l(Ax) = (AL_x)(l)$. ■

4 Гілбертові простори

4.1 Основні означення

Definition 4.1.1 Передгілбертовим простором називають лінійний простір H над $\mathbb{C}$, на якому задано півторалінійний функціонал $(\cdot, \cdot): H \times H \rightarrow \mathbb{C}$, для якого виконуються такі властивості:

- 1) $\forall x \in H : (x, x) \geq 0$
- 2) $(x, x) = 0 \iff x = 0$
- 3) $\forall x, y \in H : (x, y) = \overline{(y, x)}$

Такий функціонал називають **скалярним добутком**. Якщо прибрати умову $(x, x) = 0 \iff x = 0$, то тоді такий функціонал ще називають **квазіскалярним добутком**.

Remark 4.1.2 Насправді, можна не вимагати, що це півторалінійний функціонал. Ми можемо просто додати четверту умову, що цей функціонал лінійний лише за першим аргументом, тоді впливатиме антилінійність за другим аргументом — значить, буде півторалінійним.

Theorem 4.1.3 Нерівність Коші-Буняковського

Задано H — передгілбертів простір. Тоді $\forall x, y \in H : |(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y)$.

Було доведено, див. pdf з лінійної алгебри. Щоправда, там в умові теореми вимагалася скінченність векторного простору, але під час доведення це ми не використовуємо.

Remark 4.1.4 Нерівність Коші-Буняковського справедлива й для квазіскалярного добутку.

Remark 4.1.5 $\|(x, y)\|^2 = (x, x)(y, y) \iff y = \alpha x$ при $\alpha \in \mathbb{C}$.

Proposition 4.1.6 Задано H — передгілбертів простір. Тоді H — лінійний нормований простір, причому норма задається як $\|x\| = \sqrt{(x, x)}$.

Remark 4.1.7 Якби був квазіскалярний добуток, то ми би задали вже лише напівнорму.

Proof.

- 1) $\|x\| = \sqrt{(x, x)} \geq 0$ — зрозуміло. Також $\|x\| = \sqrt{(x, x)} = 0 \iff (x, x) = 0 \iff x = 0$.
- 2) $\|\lambda x\| = \sqrt{(\lambda x, \lambda x)} = \sqrt{\lambda \bar{\lambda} (x, x)} = \sqrt{\lambda \bar{\lambda}} \sqrt{(x, x)} = |\lambda| \|x\|$.
- 3) $\|x + y\|^2 = (x + y, x + y) = (x, x) + (x, y) + (y, x) + (y, y) = \|x\|^2 + 2 \operatorname{Re}(x, y) + \|y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2|(x, y)| + \|y\|^2 \stackrel{\text{нер-ть К-Б}}{\leq} \|x\|^2 + 2\sqrt{(x, x)}\sqrt{(y, y)} + \|y\|^2 = \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2$.
 $\implies \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$. ■

Definition 4.1.8 Нехай H — банахів передгілбертів простір.

Тоді даний простір H ще називають **гілбертовим**.

Proposition 4.1.9 Задано H — передгілбертів простір. Тоді $(\cdot, \cdot): H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ — неперервне.

Proof.

Дійсно, нехай $x_n \rightarrow x_0$ та $y_n \rightarrow y_0$. Вони будуть збігатися за нормою (у нас H — нормований), тобто $(\|x_n\|), (\|y_n\|)$ — збіжні послідовності, тому обмежені. Тоді
 $|(x_n, y_n) - (x_0, y_0)| \leq |(x_n, y_n) - (x_0, y_n)| + |(x_0, y_n) - (x_0, y_0)| = |(x_n - x_0, y_n)| + |(x_0, y_n - y_0)| \leq \|x_n - x_0\| \|y_n\| + \|x_0\| \|y_n - y_0\| \leq \|x_n - x_0\| M + \|x_0\| \|y_n - y_0\| \rightarrow 0$ (число M обмежує $(\|y_n\|)$).
Отже, $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ при $x \rightarrow x_0, y \rightarrow y_0$. ■

4.2 Факторизація квазіскалярного добутку

Задано H — векторний простір зі квазіскалярним добутком $(\cdot, \cdot)$. Позначимо $L = \{x \in H : (x, x) = 0\}$.

Lemma 4.2.1 $\forall x \in L, \forall y \in H : (x, y) = 0$.

Випливає з нерівності Коші-Буняковського.

Lemma 4.2.2 L — підпростір векторного простору H .

Як було в лінійній алгебрі, встановимо відношення еквівалентності $x \sim y \iff x - y \in L$ на векторному просторі E . Ми вже знаємо, що E/L буде векторним простором, де задаються операції так:

$$(x_1 + L) + (x_2 + L) = (x_1 + x_2) + L;$$

$$\lambda(x + L) = \lambda x + L.$$

Тепер уведемо білінійний функціонал ось таким чином: $(x_1 + L, x_2 + L)_{E/L} \stackrel{\text{def.}}{=} (x_1, x_2)_E$. Доведемо, що це буде задавати скалярний добуток на E/L .

Спочатку доведемо коректність означення. Дійсно, нехай $x_1 + L = y_1 + L$ та $x_2 + L = y_2 + L$. Тоді звідси $x_1 - y_1 \in L$ та $x_2 - y_2 \in L$. Зауважимо, що

$$(x_1, x_2)_E - (y_1, y_2)_E = (x_1, x_2)_E - (y_1, x_2)_E + (y_1, x_2)_E - (y_1, y_2)_E = (x_1 - y_1, x_2)_E + (y_1, x_2 - y_2)_E = 0.$$

Отже, $(x_1, x_2)_E = (y_1, y_2)_E \implies (x_1 + L, x_2 + L)_{E/L} = (y_1 + L, y_2 + L)_{E/L}$.

Щодо властивостей скалярного добутку. Це вже точно квазіскалярний. Тобто залишилося довести, що $(x + L, x + L)_{E/L} = 0 \iff x + L = L$.

$$(x + L, x + L)_{E/L} = 0 \implies (x, x)_E = 0 \implies x \in L \implies x + L = L.$$

4.3 Ортогональне доповнення

Definition 4.3.1 Задано H — гільбертів простір.

Вектори $x, y \in H$ будуть називатися **ортогональними**, якщо

$$(x, y) = 0$$

Позначення: $x \perp y$.

Я залишу еквівалентне означення, яке менш розповсюджене, проте корисне буде для деяких локальних міркувань. Одне з локальних міркувань — це майбутня лема (не теорема) Ріса.

Theorem 4.3.2 Задано H — гільбертів простір.

$$x \perp y \iff \forall \lambda \in \mathbb{C} : \|x\| \leq \|x + \lambda y\|.$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $x \perp y$, тоді $(x, y) = 0$, а звідси отримаємо

$$\|x + \lambda y\|^2 = (x + \lambda y, x + \lambda y) = \|x\|^2 + \lambda(y, x) + \bar{\lambda}(x, y) + \lambda^2\|y\|^2 = \|x\|^2 + \lambda^2\|y\|^2 \geq \|x\|^2.$$

$\Leftarrow$ Дано: $\forall \lambda \in \mathbb{C} : \|x\| \leq \|x + \lambda y\|$. Розпишемо ще раз нерівність:

$$\|x\|^2 \leq \|x\|^2 + \lambda(y, x) + \bar{\lambda}(x, y) + \lambda^2\|y\|^2.$$

$$2 \operatorname{Re} \lambda(y, x) + |\lambda|^2\|y\|^2 \geq 0.$$

Оскільки це виконується для кожного $\lambda \in \mathbb{C}$, то зокрема й для $\lambda = \frac{-(x, y)}{\|y\|^2}$ при $y \neq 0$. Отримаємо:

$$2 \operatorname{Re} \left(\frac{-(x, y)}{\|y\|^2} (y, x) \right) + \frac{|(x, y)|^2}{\|y\|^2} \geq 0$$

$$-3|(x, y)|^2 \geq 0 \implies (x, y) = 0. \quad \blacksquare$$

Definition 4.3.3 Задано H — гільбертів простір та $G \subset H$.

Ортогональним доповненням підмножини G називають таку множину:

$$G^\perp = \{x \in H \mid \forall y \in G : (x, y) = 0\}$$

Remark 4.3.4 Маючи вище теорему, ми можемо переписати ортогональне доповнення інакше:

$$G^\perp = \{x \in H \mid \forall y \in G : \|x + y\| \geq \|x\|\}$$

Proposition 4.3.5 Задано H — гільбертів простір та $G \subset H$. Тоді $G^\perp$ — замкнений підпростір.

Proof.

Нехай $x_1, x_2 \in G^\perp$, тобто звідси $\forall y \in G : (x_1, y) = 0, (x_2, y) = 0$. Звідси випливає, що

$$(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2, y) = \lambda_1 (x_1, y) + \lambda_2 (x_2, y) = 0, \text{ а тому отримали } \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 \in G^\perp.$$

Тепер нехай $(x_n)_{n=1}^\infty \subset G^\perp$, де $x_n \rightarrow x$. Тепер маємо $(x_n, y) = 0$, але через неперервність, то при $n \rightarrow \infty$ отримаємо $(x, y) = 0$, тому $x \in G^\perp$. $\blacksquare$

Уже якось доводилося, що в унітарних просторах E та підпросторі $L \subset E$ кожний вектор розбивається на суму проєктивного та ортогонального вектора. Спробуємо показати, що це можливо також в довільних гільбертових просторах. Це робиться окремо, бо там ми доводили для скінченно вимірного випадку.

Theorem 4.3.6 Про існування проєкції на підпростір

Нехай H — гільбертів простір та $G \subset H$ — підпростір. Тоді для кожного $x \in H$ існує єдиний $y \in G$ такий, що $x - y \in G^\perp$.

По суті, ця теорема каже, що $G^\perp$ точно містить ненульовий вектор, коли $H \neq \{0\}$.

Proof.

I. Існування.

Якщо $x \in G$, то кладемо вектор $y = x$.

Нехай $x \in H \setminus G$. Визначимо відстань $d = \rho(x, G) \stackrel{\text{def.}}{=} \inf_{y \in G} \|x - y\|$. Оскільки $x \notin G$, то звідси

$d > 0$. Відокремимо послідовність $(y_n)_{n=1}^\infty$ таку, що $d_n \stackrel{\text{позн.}}{=} \|x - y_n\| \rightarrow d$. Доведемо, що $(y_n)_{n=1}^\infty$ буде збіжною до деякого елемента y , який буде нашим шуканим. Для цього треба довести фундаментальність, зокрема довести $\|y_m - y_n\|^2 = (y_m - y_n, y_m - y_n) \rightarrow 0$. Натомість будемо оцінювати $|(y_m - y_n, h)|$, $h \in G$.

Для кожного вектора $h \in G$ та скаляра $\lambda \in \mathbb{C}$ ми розглянемо вектор $y_n + \lambda h \in G$. Зрозуміло, що $\|x - (y_n + \lambda h)\| \geq d$, але спробуємо ще оцінити дану норму.

$$\|x - (y_n + \lambda h)\|^2 = (x - y_n - \lambda h, x - y_n - \lambda h) = (x - y_n, x - y_n) + (x - y_n, -\lambda h) + (-\lambda h, x - y_n) + (-\lambda h, -\lambda h) = \|x - y_n\|^2 + |\lambda|^2 \|h\|^2 - \lambda(h, x - y_n) - \bar{\lambda}(x - y_n, h).$$

Ми оберемо $\lambda = \frac{(x - y_n, h)}{\|h\|^2}$. Тоді отримаємо:

$$\begin{aligned} \|x - (y_n + \lambda h)\|^2 &= \frac{(x - y_n, h)^2}{\|h\|^2} - \frac{(h, x - y_n)(x - y_n, h)}{\|h\|^2} - \frac{(h, x - y_n)(x - y_n, h)}{\|h\|^2} + \|x - y_n\|^2 = \\ &= d_n^2 - \frac{|(x - y_n, h)|^2}{\|h\|^2}. \end{aligned}$$

Таким чином, отримали $d_n^2 - \frac{|(x - y_n, h)|^2}{\|h\|^2} \geq d^2$. Внаслідок чого $|x - y_n, h|^2 \leq \|h\|^2(d_n^2 - d^2)$.

Далі, $|(y_m - y_n, h)| = |(x - y_n, h) - (x - y_m, h)| \leq |(x - y_n, h)| + |(x - y_m, h)| \leq \|h\| \left(\sqrt{d_n^2 - d^2} + \sqrt{d_m^2 - d^2} \right)$.

Оберемо вектор $h = y_m - y_n$, тоді отримаємо наступне:

$$\|y_m - y_n\|^2 \leq \|y_m - y_n\| \left(\sqrt{d_n^2 - d^2} + \sqrt{d_m^2 - d^2} \right).$$

$$\|y_m - y_n\| \leq \sqrt{d_n^2 - d^2} + \sqrt{d_m^2 - d^2} \rightarrow 0.$$

Таким чином, послідовність $(y_n)_{n=1}^\infty$ фундаментальна, а в силу повноти збіжна. Тобто $y_n \rightarrow y \in G$. Маючи нерівність $|x - y_n, h|^2 \leq \|h\|^2(d_n^2 - d^2)$, при $n \rightarrow \infty$ отримаємо $(x - y, h) = 0$ для всіх $h \in G$. Це означає, що $x - y \in G^\perp$.

II. Єдиність.

Припустимо, що існує ще один вектор $y' \in G$ так, щоб $x - y' \in G^\perp$. Тоді

$(y - y', h) = (x - y', h) - (x - y, h) = 0, \forall h \in G$. Зокрема якщо обрати $h = y - y'$, то тоді швидко отримаємо $y = y'$ — суперечність! ■

Отже, нехай $x \in H$. За щойно доведеною теоремою, $\exists! x_1 \in H$ такий, що $x_2 \stackrel{\text{позн.}}{=} x - x_1 \in G^\perp$. Власне, ми отримали однозначний розклад $x = x_1 + x_2$, де вектори $x_1 \in G, x_2 \in G^\perp$.

Перший вектор називається **ортогональною проєкцією**, позначають $x_1 = \text{pr}_G x$.

Другий вектор називається **ортогональним складником**, позначають $x_2 = \text{ort}_G x$.

Отже, кожний вектор $x \in H$ має єдиний розклад в $x = \text{pr}_G x + \text{ort}_G x$.

Власне, якщо H — гільбертів простір та $G \subset H$ — підпростір, то $H = G \oplus G^\perp$.

Proposition 4.3.7 Теорема Піфагора

$$\|x\|^2 = \|\text{pr}_G x\|^2 + \|\text{ort}_G x\|^2.$$

Вказівка: розписати $\|x\|^2$ та зауважити, що $(\text{pr}_G x, \text{ort}_G x) = 0$.

Remark 4.3.8 Буде корисним залишити таке зауваження. Якщо H — гільбертів простір та $G \subset H$ — замкнений підпростір, то тоді існує $G^\perp \neq \{0\}$. Внаслідок чого ми знайдемо вектор $y \notin G$, причому $\|y\| = 1$, для якого $\forall x \in G : \|x + y\| \geq 1$.

4.4 Простір, спряжений до гільбертового

Theorem 4.4.1 Теорема Ріса

Нехай H — гільбертів. Тоді для будь-якого $l \in H'$ існує єдиний вектор $u \in H$ такий, що $\forall x \in H : l(x) = (x, u)$.

Proof.

I. *Існування.*

Якщо $l \equiv 0$, то існує вектор $u = 0$ — все ясно.

Нехай $l \in H'$, де функціонал ненулевий. Розглянемо $G = \ker l$. Існує елемент $y \notin G$ такий, що $\forall x \in H : x = g + \lambda y$ (це виконано за **Prp. 3.5.6**). Можна переписати елемент $x = g + \lambda(\text{pr}_G y + \text{ort}_G y) = (g + \lambda \text{pr}_G y) + \lambda \text{ort}_G y$.

Позначимо $g' = g + \lambda \text{pr}_G y \in G$, а також $e = \frac{\text{ort}_G y}{\|\text{ort}_G y\|} \in G^\perp$. Отже, маємо $x = g' + \mu e$, де в цьому випадку $\|e\| = 1$. Тоді розпишемо функціонал та скалярний добуток:

$$l(x) = l(g' + \mu e) = 0 + \mu l(e).$$

$$(x, e) = (g' + \mu e, e) = \mu \|e\|^2 = \mu.$$

$$l(x) = l(e)(x, e) = (x, l(e)e) \implies u = \overline{l(e)}e.$$

Отриманий елемент $u = \overline{l(e)}e$ — шуканий вектор, що задовольняє рівності $l(x) = (x, u)$.

II. *Єдиність.*

Припустимо, що існує ще один вектор $u' \in H$, для якого $l(x) = (x, u')$. Звідси випливає, що $\forall x \in H : (x, u - u') = 0 \implies u = u'$ — суперечність! ■

Corollary 4.4.2 $H' = H$.

При цьому коли $H \ni u \leftrightarrow l \in H'$ ми маємо $\|u\| = \|l\|$.

Proof.

Якщо $l \in H'$, то за теоремою Ріса йому ставиться в відповідність єдиний $u \in H$, де $l(x) = (x, u)$.

Для кожного $u \in H$ розглянемо $l(x) = (x, u)$. Зрозуміло, що це лінійний функціонал, а обмеженість випливає з нерівності Коші-Буняковського $|l(x)| = |(x, u)| \leq \|x\| \|u\|$. У силу обмеженості ми маємо $\|l\| \leq \|u\|$. При $x = u$ маємо $l(u) = (u, u) = \|u\|^2$, тобто $\|l\| = \|u\|$. ■

Corollary 4.4.3 Нехай H — гільбертів простір та $G \subset H$.

G — тотальна в $H \iff \forall h \in H : h \perp G \implies h = 0$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: G — тотально в H . Нехай $h \in H$ такий, що $h \perp G$. Звідси випливає, що $\forall y \in G : (h, y) = 0$. Зафіксуємо функціонал $l(y) = \overline{(h, y)}$. Тоді маємо $\forall y \in G : l(y) = 0 \implies \forall y \in H : l(y) = 0$, тобто звідси $\forall y \in H : (h, y) = 0$. Значить, обов'язково $h = 0$.

$\Leftarrow$ Дано: $\forall h \in H : h \perp G \implies h = 0$.

Нехай l — лінійний та неперервний функціонал такий, що $\forall y \in G : l(y) = 0$. За теоремою Ріса, даний функціонал $l(y) = (y, u)$ при деякому $u \in H$. Але $\forall y \in G : (y, u) = 0$, тобто звідси $u \perp G \implies u = 0$. Значить, $\forall y \in H : l(y) = (y, 0) = 0$. Отже, G — тотальна в H . ■

Proposition 4.4.4 Задано H — гільбертів простір та $G \subset H$. Тоді $(G^\perp)^\perp = \overline{\text{span}(G)}$.

Зокрема якщо G — підпростір H , то $(G^\perp)^\perp = G$.

Proof.

Спочатку треба довести, що $G \subset (G^\perp)^\perp$, але тут (в принципі) ясно.

Нехай $h \in (G^\perp)^\perp$ такий, що $h \perp G$. Тобто $h \in G^\perp$. Але тоді звідси $(h, h) = 0 \implies h = 0$. Отже, G — тотальна в $(G^\perp)^\perp$. ■

4.5 Ортонормовані системи та базиси

Definition 4.5.1 Система векторів $\{e_i\}_{i=1}^\infty$ (поки не більш, ніж злічені системи розглядатимемо) називається **ортонормованою**, якщо

$$(e_i, e_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases},$$

де δ — дельта-символ Кронекера.

Example 4.5.2 У просторі l_2 система, яка є базисом Шаудера, — ортонормована.

Lemma 4.5.3 Нехай $\{e_j\}_{j=1}^\infty$ — ортонормована система векторів.

$$\sum_{i=1}^\infty c_i e_i \text{ — збіжний ряд} \iff \sum_{i=1}^\infty |c_i|^2 < \infty.$$

Proof.

Щоб довести в обидві сторони, треба зауважити, що справедлива рівність:

$$\left\| \sum_{i=1}^n c_i e_i - \sum_{i=1}^m c_i e_i \right\| = \left\| \sum_{i=m+1}^n c_i e_i \right\| = \left(\sum_{i=m+1}^n c_i e_i, \sum_{k=m+1}^n c_k e_k \right) = \sum_{i=m+1}^n \sum_{k=m+1}^n c_i \overline{c_k} (e_i, e_k) = \sum_{i=m+1}^n |c_i|^2.$$

Це ми припускали всюди, що $n > m$. ■

Theorem 4.5.4 Нерівність Бесселя

Нехай $\{e_j\}_{j=1}^\infty$ — ортонормована система. Тоді $\sum_{i=1}^\infty (x, e_i) e_i$ збігається, причому $\|x\|^2 \geq \sum_{i=1}^\infty |(x, e_i)|^2$.

Remark 4.5.5 До речі, коефіцієнти (x, e_i) називаються **коефіцієнтами Фур'є**, а сам ряд — **рядом Фур'є**. По суті, ми зробили розклад Фур'є в загального випадку та отримали додатково нерівність Бесселя.

Proof.

$$\begin{aligned} 0 &\leq \left\| x - \sum_{i=1}^n (x, e_i) e_i \right\|^2 = \left(x - \sum_{i=1}^n (x, e_i) e_i, x - \sum_{i=1}^n (x, e_i) e_i \right) = \\ &= (x, x) - \left(x, \sum_{i=1}^n (x, e_i) e_i \right) - \left(\sum_{i=1}^n (x, e_i) e_i, x \right) + \left(\sum_{i=1}^n (x, e_i) e_i, \sum_{i=1}^n (x, e_i) e_i \right) = \\ &= \|x\|^2 - \sum_{i=1}^n \overline{(x, e_i)} (x, e_i) - \sum_{i=1}^n (x, e_i) (e_i, x) + \sum_{i=1}^n |(x, e_i)|^2 = \|x\|^2 - \sum_{i=1}^n |(x, e_i)|^2. \end{aligned}$$

Отже, $\|x\|^2 \geq \sum_{i=1}^\infty |(x, e_i)|^2$. До того, ж за лемою, оскільки цей ряд збіжний за цією нерівністю, то

ряд $\sum_{i=1}^\infty (x, e_i) e_i$ збіжний при всіх $x \in H$. ■

Remark 4.5.6 Нехай $\{e_i\}_{i=1}^\infty$ — ортонормована система. Тоді вже відомо, що $\sum_{i=1}^\infty |(x, e_k)|^2$ — збіжний ряд, тому звідси за необхідною ознакою збіжності $(x, e_k) \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$, причому для всіх $x \in H$. Внаслідок чого ми отримуємо, що $e_n \xrightarrow{w} 0$. При цьому $\|e_n - e_m\| = \sqrt{2}$, тому $e_n \not\rightarrow 0$ (не сильно збіжна).

Lemma 4.5.7 Нехай $\{e_i\}_{i=1}^\infty$ — ортонормована система та $G = \overline{\text{span}\{e_i\}_{i=1}^\infty} \subset H$. Тоді $\forall x \in H$:

$$\text{pr}_G x = \sum_{i=1}^\infty (x, e_i) e_i.$$

Proof.

Ми хочемо довести, що $\forall x \in H : x - \sum_{i=1}^\infty (x, e_i) e_i \in G^\perp$. Таким чином, у силу єдиності, $\sum_{i=1}^\infty (x, e_i) e_i = \text{pr}_G x$. Але за тим, чому дорівнює простір G , нам буде досить довести це лише для всіх e_k .

$$\left(x - \sum_{i=1}^\infty (x, e_i) e_i, e_k \right) = (x, e_k) - \sum_{i=1}^\infty (x, e_i) (e_i, e_k) = (x, e_k) - (x, e_k) = 0.$$

Definition 4.5.8 Задано H — гільбертів простір.

Система $\{e_i\}_{i=1}^\infty$ називається **ортонормованим базисом**, якщо

$$\{e_i\}_{i=1}^\infty \text{ — тотальна в } H \text{ ортонормована система.}$$

Оскільки $\text{rg}_H x = x$, то звідси $\forall x \in H$ маємо однозначний розклад $x = \sum_{i=1}^{\infty} (x, e_i) x_i$. Також для будь-якого $y = \sum_{i=1}^{\infty} (y, e_i) e_i$ скалярний добуток $(x, y) = \sum_{i=1}^{\infty} (x, e_i) \overline{(y, e_i)}$. Зокрема окремо запишу це:

Theorem 4.5.9 Рівність Парсеваля

Нехай H — гільбертів простір та $\{e_i\}_{i=1}^{\infty}$ — ортонормований базис. Тоді $\|x\|^2 = \sum_{i=1}^{\infty} |(x, e_i)|^2$.

Theorem 4.5.10 Нехай $\{e_i\}_{i=1}^{\infty}$ — ортонормована система.

$\{e_i\}_{i=1}^{\infty}$ — ортонормований базис $\iff \forall x \in H$ справедлива рівність Парсеваля.

Proof.

$\Rightarrow$ Щойно довели.

$\Leftarrow$ Дано: $\forall x \in H : \|x\|^2 = \sum_{i=1}^{\infty} |(x, e_i)|^2$. При доведенні нерівності Бесселя ми отримали рівність

$\left\| x - \sum_{i=1}^n (x, e_i) e_i \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{i=1}^n |(x, e_i)|^2$. Отже, при $n \rightarrow \infty$ отримаємо $\sum_{i=1}^n (x, e_i) e_i \rightarrow x$. Отже, $\{e_i\}_{i=1}^{\infty}$ — ортонормований базис. ■

4.6 Ортогоналізація системи векторів

Задано H — гільбертів простір та $\{u_n\}_{n=1}^{\infty}$ — якась зліченна система ненулевих векторів. Ми хочемо цю систему ортогоналізувати. Тобто ми побудуємо ортонормовану систему $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ так, щоб $\text{span}\{e_n\} = \text{span}\{u_n\}$.

Перед стартом відкинемо з даної системи кожний вектор, що лінійно залежний від попередніх. У нас тоді буде система $\{v_n\}_{n=1}^{\infty}$, причому все одно $\text{span}\{v_n\} = \text{span}\{u_n\}$, а сама система може бути як і скінченною, так і зліченною.

Маємо вектор $e'_1 = v_1$. Його одразу нормалізуємо, тобто $e_1 = \frac{e'_1}{\|e'_1\|}$.

Маємо вектор $e'_2 = v_2 - \lambda_{11} e_1$, де число λ_{11} можна знайти з умови $e'_2 \perp e_1$. Ми вже таке робили в ліналі, тому, можливо, не повторятиму. Далі нормалізуємо, буде $e_2 = \frac{e'_2}{\|e'_2\|}$.

Маємо вектор $e_3 = v_3 - \lambda_{21} e_1 - \lambda_{22} e_2$, де числа $\lambda_{21}, \lambda_{22}$ можна знайти з умов $e'_3 \perp e_1, e'_3 \perp e_2$.

Робимо аналогічно, а далі нормалізуємо, буде $e_3 = \frac{e'_3}{\|e'_3\|} \dots$

Отримаємо не більш ніж зліченну систему $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$. Зауважимо, що за побудовою $\text{span}\{e_n\} = \text{span}\{v_n\}$. Також кожний вектор із системи $\{v_n\}_{n=1}^{\infty}$ записується в вигляді $v_{n+1} = e'_{n+1} + \lambda_{n1} e_1 + \dots + \lambda_{nn} e_n$, тобто звідси $v_{n+1} \in \text{span}\{e_1, \dots, e_{n+1}\}$, внаслідок чого $\text{span}\{v_n\} \subset \text{span}\{e_n\}$.

Остаточно, $\text{span}\{u_n\} = \text{span}\{e_n\}$ — ортогоналізували.

Corollary 4.6.1 Задано H — сепарабельний гільбертів простір. Тоді існує ортонормований базис.

Proof.

Оскільки H — сепарабельний, оберемо скрізь щільну підмножину $G = \{u_n\}_{n=1}^{\infty}$. Застосуємо вище описаний процес ортогоналізації — отримаємо ортонормовану систему $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$, причому $\text{span}\{e_n\}_{n=1}^{\infty} = H$. За означенням, $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ — ортонормований базис. ■

Theorem 4.6.2 Задано H — сепарабельний нескінченний гільбертів простір. Тоді $H \cong l_2$ ізоморфним чином. (якщо H скінченний, то там $H \cong \mathbb{C}^n$).

Proof.

Саме тому я спочатку навів наслідок вище, щоб можна було грамотно розписати цю теорему. У нас H — сепарабельний, тому є ортонормований базис $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$, звідси $\forall x \in H : x = \sum_{k=1}^{\infty} x_k e_k$.

Побудуємо оператор $A: H \rightarrow l_2$ ось таким чином: $Ax = (x_1, x_2, \dots)$, де числа x_i були взяті з розкладу елемента $x \in H$. Зауважимо, що $(x_1, x_2, \dots) \overset{\text{справді}}{\in} l_2$ (умовно можна пояснити це через рівність

Парсеваля). Оператор A — лінійний, це ясно. Також A — бієкція, тому що кожному $(x_1, x_2, \dots) \in l_2$ існуватиме (при тому єдиний) елемент $\sum_{k=1}^{\infty} x_k e_k \in H$, а він буде потрапляти в H (за теоремою про нерівність Бесселя). Нарешті,

$$(x, y)_H = \sum_{i=1}^{\infty} (x, e_i) \overline{(y, e_i)} = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \overline{y_i} = (\{x_k\}, \{y_k\})_{l_2}.$$

$$\|x\|_H = \sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^2 = \|\{x_k\}\|_{l_2}.$$

Corollary 4.6.3 Усі сепарабельні нескінченні гільбертові простори між собою ізометричним чином ізоморфні.

4.7 Коротко про ортонормовану систему векторів довільної потужності

Definition 4.7.1 Система векторів $\{e_\alpha\}_{\alpha \in I}$ називається **ортонормованою**, якщо

$$(e_\alpha, e_\beta) = \delta_{\alpha\beta} = \begin{cases} 1, & \alpha = \beta \\ 0, & \alpha \neq \beta \end{cases},$$

де δ — дельта-символ Кронекера.

Remark 4.7.2 Зрозуміло, що якщо в гільбертовому просторі існує незліченна ортонормована система, то тоді гільбертів простір не буде більше сепарабельним.

Lemma 4.7.3 Задано H — гільбертів простір та $\{e_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — незліченна ортонормована система. Розглянемо коефіцієнти Фур'є (x, e_α) , тоді кількість ненулевих коефіцієнтів — не більш, ніж зліченна.

Proof.

Розглянемо множину $I_n = \left\{ \alpha \in I \mid (x, e_\alpha) > \frac{1}{n} \right\}$. Такі множини будуть скінченними.

Припустимо, що ні. Тоді можна взяти зліченну кількість $(\alpha_k)_{k=1}^{\infty}$, для яких $(x, e_{\alpha_k}) > \frac{1}{n}$. Тоді з одного боку, $\sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_{\alpha_k})|^2 = \infty$, проте за нерівністю Бесселя, $\sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_{\alpha_k})|^2 \leq \|x\|^2 < \infty$. Суперечність!

Тепер зауважимо, що $\{\alpha \in I \mid (x, e_\alpha) \neq 0\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n$, така множина не більш, ніж зліченна. ■

Lemma 4.7.4 Нехай $\{e_\alpha\}_{\alpha \in I}$ — ортонормована система та $G = \overline{\text{span}\{e_\alpha\}_{\alpha \in I}} \subset H$. Тоді $\forall x \in H$: $\text{pr}_G x = \sum_{\alpha \in J} (x, e_\alpha) e_\alpha$. Сумуємо по множині J , де ненулеві коефіцієнти Фур'є.

Міркування аналогічні.

Definition 4.7.5 Задано H — гільбертів простір.

Система $\{e_\alpha\}_{\alpha \in I}$ називається **ортонормованим базисом**, якщо

$$\{e_\alpha\}_{\alpha \in I} \text{ — тотальна в } H \text{ ортонормована система.}$$

Аналогічним чином тоді $x = \sum_{\alpha \in J} (x, e_\alpha) e_\alpha$. Сумуємо по множині J , де ненулеві коефіцієнти Фур'є.

Аналогічно працює рівність Парсеваля та скалярний добуток.

4.8 Про форми в гільбертових просторах

Із курсу лінійної алгебри вже знаємо, що така півторалінійна форма b . Також ввводили таке поняття, як ермітові форми та квадратичні форми. У гільбертовому просторі поляризаційна тотожність все одно працює.

Definition 4.8.1 Півторалінійна форма $b: H \times H \rightarrow \mathbb{C}$ називається **обмеженою**, якщо

$$\exists C > 0 : \forall x, y \in H : |b(x, y)| \leq C \cdot \|x\| \cdot \|y\|$$

Аналогічним чином ми визначимо **норму** форми таким чином:

$$\|b\| = \inf\{C > 0 \mid \forall x, y \in H : |b(x, y)| \leq C\|x\|\|y\|\}$$

Example 4.8.2 Зокрема, по-перше, скалярний добуток $b(x, y) = (x, y)$ сам по собі є півторалінійною ермітовою формою. По-друге, він — обмежений. Дійсно, це випливає з нерівності Коші-Буняковського:

$$|b(x, y)| = |(x, y)| \leq \sqrt{(x, x)}\sqrt{(y, y)} = 1 \cdot \|x\| \cdot \|y\|.$$

Proposition 4.8.3 Задано $A \in \mathcal{B}(H)$. Тоді $b_A(x, y) = (Ax, y)$ задаватиме обмежену півторалінійну ермітову форму.

Вправа: довести.

Theorem 4.8.4 Нехай заданий b — обмежений півторалінійний функціонал. Тоді існує єдиний оператор $A \in \mathcal{B}(H)$, для якого $b(x, y) = (Ax, y)$.

Щось таке подібне було в лінійній алгебрі, проте я передоведу.

Proof.

Зафіксуємо $x \in H$, тоді зауважимо, що $f(y) = \overline{b(x, y)}$ буде обмеженим лінійним функціоналом на H . За теоремою Ріса, ми можемо знайти єдиний вектор $a_x \in H$, для якого $\overline{b(x, y)} = (y, a_x)$, або $b(x, y) = (a_x, y)$.

Таким чином, побудували відображення $A: H \rightarrow H$, що діє як $Ax = a_x$. Доведемо, що це той самий $A \in \mathcal{B}(H)$.

Нехай $x_1, x_2 \in H$ та $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}$. Маємо наступне:

$$(A(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2), y) = b(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2, y) = \alpha_1 b(x_1, y) + \alpha_2 b(x_2, y) = \alpha_1 (Ax_1, y) + \alpha_2 (Ax_2, y) = (Ax_1 + Ax_2, y).$$

Оскільки ця рівність виконується для всіх $y \in H$, то звідси $A(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) = \alpha_1 Ax_1 + \alpha_2 Ax_2$.

Ми вже знаємо, що $|(Ax, y)| = |(a_x, y)| = |b(x, y)| \leq c\|x\|\|y\|$. Якщо підставити $y = Ax$, то звідси випливатиме оцінка $\|Ax\| \leq c\|x\|$. Довели обмеженість.

Єдиність цілком зрозуміло. ■

Theorem 4.8.5 Нехай заданий b — обмежений півторалінійний функціонал. Уже відомо, що йому асоціюється єдиний оператор $A \in \mathcal{B}(H)$, де $b(x, y) = (Ax, y)$. Тоді $\|b\| = \|A\|$.

Proof.

Маємо $|b(x, y)| = |(Ax, y)| \leq \|Ax\|\|y\| \leq \|A\|\|x\|\|y\|$. Тобто $\|A\|$ — константа, що обмежує форму, тому за означенням норми форми, $\|b\| \leq \|A\|$.

Із іншого боку, $\|Ax\|^2 = |b(x, Ax)| \leq \|b\|\|x\|\|Ax\|$, внаслідок чого $\|Ax\| \leq \|b\|\|x\|$. Тобто $\|b\|$ — константа, що обмежує оператор, тому за означення норми оператора, $\|A\| \leq \|b\|$.

Отже, ці два міркування дають сказати нам $\|b\| = \|A\|$. ■

4.9 Про деякі типи операторів

4.9.1 Спряжений оператор (ще раз)

У гільбертовому просторі H' можна ототожнити з множиною H за теоремою Ріса. Також $l(x) = (x, l)$ звідти ж. Тепер розглянемо оператор $A \in \mathcal{B}(H_1, H_2)$. Ми вже визначали спряжений оператор $A^* \in \mathcal{B}(H_2', H_1') = \mathcal{B}(H_2, H_1)$, що задається як $(A^*l)(x) = l(Ax)$.

Відомо, що $(A^*l)(x) = l(Ax) = (Ax, l)$. Із іншого боку, $(A^*l)(x) = (x, A^*l)$.

Таким чином, ми маємо еквівалентне означення в гільбертовому просторі:

Theorem 4.9.1 Оператор $A^* \in \mathcal{B}(H_1, H_2)$ — спряжений в $A \iff (Ax, l) = (x, A^*l), \forall x \in H_1, \forall l \in H_2$.

4.9.2 Самоспряжений оператор

Definition 4.9.2 Оператор $A \in \mathcal{B}(H)$ називається **самоспряженим**, якщо

$$A = A^*$$

За отриманим результатом вище маємо чергове означення:

Theorem 4.9.3 Оператор $A \in \mathcal{B}(H)$ — самоспряжений $\iff \forall(Ax, l) = (x, Al), \forall x, l \in H$.

Theorem 4.9.4 Будь-який оператор $A \in \mathcal{B}(H)$ єдиним чином можна подати в вигляді $A = \operatorname{Re} A + i \operatorname{Im} A$, де $\operatorname{Re} A, \operatorname{Im} A$ — самоспряжені оператори.

Уже в курсі ліналу доводили.

Theorem 4.9.5 $A \in \mathcal{B}(H)$ — самоспряжений $\iff b_A$ — ермітова форма $\iff q_A(x) = b_A(x, x) \in \mathbb{R}$.

Proof.

Почну з першої еквівалентності.

$\Rightarrow$ Дано: $A \in \mathcal{B}(H)$ — самоспряжений. Тоді $b_A(x, y) = (Ax, y) = (x, Ay) = \overline{(Ay, x)} = \overline{b_A(y, x)}$.

$\Leftarrow$ Дано: b_A — ермітова форма. Тоді $(Ax, y) = b_A(x, y) = \overline{b_A(y, x)} = \overline{(Ay, x)} = (x, Ay)$.

Тепер доведемо другу еквівалентність.

$\Rightarrow$ Дано: b_A — ермітова форма. Тоді $b_A(x, x) = \overline{b_A(x, x)} \implies b_A(x, x) = q_A(x) \in \mathbb{R}$.

$\Leftarrow$ Дано: $q_A \in \mathbb{R}$. Використаємо поляризаційну тотожність:

$$4b_A(x, y) = q_A(x + y) - q_A(x - y) + i[q_A(x + iy) - q_A(x - iy)].$$

$$4b_A(y, x) = q_A(y + x) - q_A(y - x) + i[q_A(y + ix) - q_A(y - ix)] =$$

$$= \overline{q_A(y + x)} - \overline{q_A(y - x)} + i\overline{q_A(y + ix)} - i\overline{q_A(y - ix)} = q_A(y + x) - q_A(y - x) + \frac{1}{i}q_A(y + ix) - \frac{1}{i}q_A(y - ix)$$

$$= q_A(x + y) - q_A(x - y) + i[q_A(x + iy) - q_A(x - iy)].$$

Таким чином, $b_A(x, y) = \overline{b_A(y, x)}$, тобто b_A — ермітова. ■

4.9.3 Невід'ємні та напівобмежені оператори

Definition 4.9.6 Оператор $A \in \mathcal{B}(H)$ називається **невід'ємним**, якщо

$$\forall x \in H : b_A(x, x) \geq 0$$

Позначення: $A \geq 0$.

Будемо казати, що $A \geq B$, якщо $A - B \geq 0$. Це задає відношення часткового порядку на $\mathcal{B}(H)$.

Definition 4.9.7 Оператор $A \in \mathcal{B}(H)$ називається **напівобмеженим знизу** числом, якщо

$$\exists c \in \mathbb{R} : \forall x \in H : b_A(x, x) \geq c\|x\|^2$$

Оператор $A \in \mathcal{B}(H)$ називається **напівобмеженим зверху** числом, якщо

$$\exists d \in \mathbb{R} : \forall x \in H : b_A(x, x) \leq d\|x\|^2$$

Якщо переписати нерівність по-інакшому, то ми отримаємо, що

A — напівобмежений знизу числом $c \in \mathbb{R} \iff A \geq cI$;

A — напівобмежений зверху числом $d \in \mathbb{R} \iff A \leq dI$.

Remark 4.9.8 Нехай $A \in \mathcal{B}(H)$ — напівобмежений. Тоді A — самоспряжений.

Це впливає безпосередньо з означення напівобмежених операторів.

Remark 4.9.9 Нехай $A \in \mathcal{B}(H)$ — самоспряжений. Тоді A напівобмежений зверху числом $\|A\|$ та знизу числом $-\|A\|$. Просто тому що справедлива нерівність $|(Ax, x)| \leq \|A\|\|x\|^2$.

Proposition 4.9.10 Задано $A \in \mathcal{B}(H)$ — напівобмежений. Тоді A — оборотний.

TODO: доробити.

4.9.4 Проектор

Definition 4.9.11 Задано H — гільбертів простір та $G \subset H$ — замкнений підпростір.

Проектором в H на G назвемо оператор P_G , який діє таким чином:

$$P_g x = \operatorname{pr}_g x$$

Якщо $\{e_i\}_{i=1}^\infty$ — ортонормований базис, то $P_G x = \sum_{i=1}^\infty (x, e_i) e_i$.

Theorem 4.9.12 Проектор на G має такі властивості:

- 1) $P_G \in \mathcal{B}(H)$, причому $\|P_G\| = 1$ за умовою, що $G \neq \{0\}$;
- 2) P_G — ідемпотентний оператор;
- 3) P_G — самоспряжений оператор;
- 4) P_G — невід’ємний оператор.

Proof.

Доведемо кожну властивість окремо.

1) Маємо $x, y \in G$, треба довести $P_G(x + y) = P_G x + P_G y$, або теж саме $\text{pr}_G(x + y) = \text{pr}_G x + \text{pr}_G y$. Оскільки $x, y \in H$, то для них існують єдині $\text{pr}_G x, \text{pr}_G y \in G$. Ми доведемо, що $(x + y) - (\text{pr}_G x + \text{pr}_G y) \in G^\perp$, тим самим за єдиністю проєкції отримаємо бажану рівність.

$$(x + y - \text{pr}_G x - \text{pr}_G y, g) = (x - \text{pr}_G x, g) + (y - \text{pr}_G y, g) = 0 + 0 = 0.$$

Отже, ми довели $P_G(x + y) = P_G(x) + P_G(y)$.

Десь аналогічним чином доводиться, що $P_G(\lambda x) = \lambda P_G(x)$.

Далі зауважимо, що $\|P_G x\|^2 = \|\text{pr}_G x\|^2 = \|x\|^2 - \|\text{ort}_G x\|^2 \leq 1 \cdot \|x\|^2$. Останнє повністю доводить той факт, що $P_G \in \mathcal{B}(H)$, причому тут $\|P_G\| \leq 1$. Якби був $G = \{0\}$, то ми би отримали $P_G = 0$. Інакше $\forall g \in G : P_G g = g$, внаслідок чого $\|P_G\| = 1$.

2) Треба довести, що $P_G^2 = P_G$. Маємо $x \in H$, тоді звідси $P_G^2 x = P_G(P_G x) = P_G(\text{pr}_G x) = \text{pr}_G x = P_G x$.

3) $(P_G x, y) = (\text{pr}_G x, \text{pr}_G y + \text{ort}_G y) = (\text{pr}_G x, \text{pr}_G y) = (\text{pr}_G x, \text{ort}_G y) = (\text{pr}_G x, \text{pr}_G y) = (\text{pr}_G x, \text{pr}_G y) = (\text{ort}_G x, \text{pr}_G y) = (\text{pr}_G x + \text{pr}_G x, \text{pr}_G y) = (x, P_G y)$.

4) $(P_G x, x) = (\text{pr}_G x, \text{pr}_G x + \text{ort}_G x) = \|P_G x\|^2 \geq 0$.

Всі властивості довели. ■

Theorem 4.9.13 Задано $A \in \mathcal{B}(H)$ — самоспряжений, ідемпотентний оператор. Тоді існує замкнений підпростір $G \subset H$, в якому оператор A поводить себе як проектор на G , тобто $A = P_G$.

Proof.

Розглянемо множину $G = \{g \in H \mid Ag = g\}$, іншими словами множина $G = \ker(A - I)$. Оскільки A — ідемпотентний, то $\forall x \in H : Ax \in G$. Також зазначимо, що $P_G x \in G$. Тому нам досить довести, що $(Ax, g) = (P_G x, g), \forall g \in G$, а це гарантуватиме $Ax = P_G x$.

$$(Ax, g) = (x, Ag) = (x, g) = (x, P_G g) = (P_G x, g). \quad \blacksquare$$

4.9.5 Нормальні оператори

Definition 4.9.14 Оператор $A \in \mathcal{B}(H)$ називається **нормальним**, якщо

$$A^* A = A A^*$$

Існує таке поняття як комутатор, в цьому випадку $[A, B] = AB - BA$. Значить, означення нормального оператора можна переписати ось так:

$$[A, A^*] = O$$

Theorem 4.9.15 $A \in \mathcal{B}(H)$ — нормальний $\iff [\text{Re } A, \text{Im } A] = O$.

Proof.

Нам досить буде розписати комутатор $[A, A^*]$, а там стане зрозуміло.

$$\begin{aligned} [A, A^*] &= A A^* - A^* A = (\text{Re } A + i \text{Im } A)(\text{Re } A - i \text{Im } A) - (\text{Re } A - i \text{Im } A)(\text{Re } A + i \text{Im } A) = \\ &= \text{Re}^2 A - i \text{Re } A \text{Im } A + i \text{Im } A \text{Re } A + \text{Im}^2 A - \text{Re}^2 A - i \text{Re } A \text{Im } A + i \text{Im } A \text{Re } A - \text{Im}^2 A = \\ &= -2i \text{Re } A \text{Im } A + 2i \text{Im } A \text{Re } A = -2i[\text{Re } A, \text{Im } A]. \end{aligned}$$

Отже, ми автоматично довели, що A — нормований $\iff [\text{Re } A, \text{Im } A] = O$. ■

4.10 Унітарні та ізометричні оператори

Definition 4.10.1 Лінійний оператор $U: H \rightarrow H$ називають **унітарним**, якщо

$$\forall x, y \in H : (Ux, Uy) = (x, y);$$

$$\text{Im } U = H$$

Remark 4.10.2 Із означення випливає, що $\|Ux\| = \|x\|, \forall x \in H$, а тому звідси $U \in \mathcal{B}(H)$, $\|U\| = 1$.

Proposition 4.10.3 Якщо лінійний оператор зберігає норму, то він же зберігає скалярний добуток. Випливає з поляризаційної тотожності.

Remark 4.10.4 Якщо $\dim H < \infty$, то тоді в означенні унітарного оператора досить вимагати збереження скалярного добутку (як це було в ліналі).

Дійсно, маємо $\{e_1, \dots, e_n\}$ — ортонормований базис H . Тоді $(Ue_j, Ue_k) = (e_j, e_k) = \delta_{jk}$. Отже, $\{Ue_1, \dots, Ue_n\}$ — ортонормований базис H , причому

$$x = \sum_{j=1}^n x_j Ue_j = U \left(\sum_{j=1}^n x_j e_j \right).$$

Внаслідок чого $\text{Im } U = H$.

Example 4.10.5 Розглянемо $T(x_1, x_2, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots)$ — оператор в просторі l_2 . Зауважимо, що $(Tx, Ty) = (x, y)$. Проте $\text{Im } T \neq H$, оскільки вектор $(1, 0, 0, \dots) \perp \text{Im } T$.

Theorem 4.10.6 Задано U — унітарний оператор. Тоді U — оборотний, причому $U^{-1} = U^*$, який теж є унітарним.

Proof.

Оскільки $\text{Im } U = H$ та $\|Ux\| = \|x\|$, то ми доводимо оборотність. Доведемо, що U^{-1} — унітарний.

Покладемо $y = Ux$, тоді

$$\|y\| = \|Ux\| = \|x\| = \|U^{-1}y\|.$$

Тобто U^{-1} зберігає норму, а тому й скалярний добуток. Також зрозуміло, що $\text{Im } U^{-1} = H$.

Рівність $U^{-1} = U^*$ випливає з такого ланцюга: $(x, U^*y) = (Ux, y) = (Ux, UU^{-1}y) = (x, U^{-1}y)$. ■

Proposition 4.10.7 Задано U — унітарний оператор. Тоді U — нормальний.

Proof.

$$[U, U^*] = UU^* - U^*U = UU^{-1} - U^{-1}U = I - I = O. \quad \blacksquare$$

Definition 4.10.8 Лінійний оператор $V: H_1 \rightarrow H_2$ називається **ізометричним**, якщо

$$\forall x, y \in H : (Vx, Vy)_2 = (x, y)_1$$

Ця умова, як вже відомо, рівносильна умові $\|Vx\|_2 = \|x\|_1$.

4.11 Матричне представлення операторів у гільбертовому просторі

4.11.1 Лінійний оператор в сепарабельному просторі

Нехай H — нескінченний сепарабельний простір, тому є $\{e_n\}_{n=1}^{\infty}$ — ортонормований базис. Розглянемо оператор $A \in \mathcal{B}(H)$, який можна розкласти за базисом. Отримаємо наступне:

$$(Ax, e_j) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k (Ae_k, e_j) = \sum_{k=1}^{\infty} a_{jk} x_k.$$

Ми тут позначили $a_{jk} = (Ae_k, e_j)$. Визначені числа a_{jk} утворюють нескінченну матрицю $(a_{jk})_{j,k=1}^{\infty}$, елементами k -го стовпчика якого будуть координати вектора Ae_k .

Theorem 4.11.1 Будь-який оператор $A \in \mathcal{B}(H)$ допускає матрице представлення в будь-якому ортонормованому базисі H .

Remark 4.11.2 Не кожній нескінченній матриці відповідає лінійний обмежений оператор в гільбертовому просторі (на відміну від скінченновимірних просторів).

Theorem 4.11.3 Нехай матриця $(a_{jk})_{j,k=1}^{\infty}$ задовольняє умові $\sum_{j,k=1}^{\infty} |a_{jk}|^2 < \infty$. Тоді матриця $(a_{jk})_{j,k=1}^{\infty}$ визначає оператор $A \in \mathcal{B}(H)$.

Proof.

За нерівністю Коші-Буняковського, отримаємо

$$|(Ax, e_j)|^2 = \left| \sum_{k=1}^{\infty} a_{jk} x_k \right|^2 \leq \sum_{k=1}^{\infty} |a_{jk}|^2 \|x\|^2, \quad j \in \mathbb{N}.$$

Просумовуючи це все за j , отримаємо

$$\|Ax\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} |(Ax, e_j)|^2 \leq \sum_{j,k=1}^{\infty} |a_{jk}|^2 \|x\|^2.$$

Таким чином, $A \in \mathcal{B}(H)$, причому $\|A\| \leq \left(\sum_{j,k=1}^{\infty} |a_{jk}|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$. ■

Remark 4.11.4 Зауважимо, що одинична матриця $(a_{jk})_{j,k=1}^{\infty}$, де $a_{jk} = \delta_{jk}$, задає лінійний обмежений оператор $A = I \in \mathcal{B}(H)$. При цьому ця матриця не задовольняє умові теореми вище. Тому дана достатня умова є доволі строгою, треба послабити.

Theorem 4.11.5 Матриця $(a_{jk})_{j,k=1}^{\infty}$ задає оператор $A \in \mathcal{B}(H) \iff$ справедливі такі умови:

- 1) $\sum_{k=1}^{\infty} a_{jk} x_k$ збіжний для всіх $j \in \mathbb{N}$; де числа x_k беруться з розкладу $x = \sum_{k=1}^{\infty} x_k e_k$;
 - 2) $\sum_{j=1}^{\infty} \left| \sum_{k=1}^{\infty} a_{jk} x_k \right|^2 < \infty$;
 - 3) $\exists c > 0 : \forall x \in H : \sum_{j=1}^{\infty} \left| \sum_{k=1}^{\infty} a_{jk} x_k \right|^2 \leq c \|x\|^2$.
- (TODO: добути).

4.12 Оператори Гілберта-Шмідта

Нехай H — сепарабельний гільбертів простір та $\{e_n\}, \{f_n\}$ — два ортонормовані базиси в H . Припустимо, що $A \in \mathcal{B}(H)$ задовольняє умові $\sum_{j,k=1}^{\infty} |(Af_k, e_j)|^2 < \infty$.

Дана величина ніяк не залежить від вибору пари базису. Дійсно, зауважимо, що $\|Ae_j\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |(Ae_j, f_k)|^2$,

а тому ця величина вище $\sum_{j,k=1}^{\infty} |(Af_k, e_j)|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} \|Ae_j\|^2$. Тому неважливо, який базис буде другим.

Більш того, знаючи, що $(Ae_j, f_k) = (e_j, A^* f_k)$ можна аналогічно довести, що неважливо, який базис буде першим.

Отже, коректним буде ось таке означення:

Definition 4.12.1 Оператор $A \in \mathcal{B}(H)$ називається **оператором Гілберта-Шмідта**, якщо для деякого (а тому й для кожного) ортонормованого базиса $\{e_n\}$ збігається ряд:

$$\sum_{j=1}^{\infty} \|Ae_j\|^2 = \sum_{j,k=1}^{\infty} |a_{jk}|^2 < \infty$$

Позначення: $S_2(H)$ — набір всіх операторів Гілберта-Шмідта.

Абсолютною нормою (чи **нормою Гілберта-Шмідта**) оператора A називають величину

$$|A| = \left(\sum_{j=1}^{\infty} \|Ae_j\|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

Remark 4.12.2 $\emptyset \subsetneq S_2(H) \subsetneq \mathcal{B}(H)$.

Дійсно, розглянемо оператор $A \in \mathcal{B}(H)$, у якого лише скінченне число матричних елементів a_{jk} , для яких $a_{jk} \neq 0$. Тоді цілком зрозуміло, що такий $A \in S_2(H)$. Тобто $S_2(H) \neq \emptyset$.

Далі, $I \notin S_2(H)$, просто тому що $\sum_{j=1}^{\infty} \|Ie_j\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} \|e_j\|^2 = \infty$.

Proposition 4.12.3 $S_2(H)$ — нормований простір із нормою $|A|$ — нормою Гілберта-Шмідта. Причому про саму норму Гілберта-Шмідта відомо, що $\forall A \in S_2(H) : \|A\| \leq |A|$.

Proof.

Спочатку доведемо, що $S_2(H)$ буде підпростором. Дійсно, нехай $A, B \in S_2(H)$, тоді

$$\sum_{j=1}^{\infty} \|(\lambda A + \mu B)e_j\|^2 = \sum_{j=1}^{\infty} \|\lambda Ae_j + \mu Be_j\|^2 \leq |\lambda|^2 \sum_{j=1}^{\infty} \|Ae_j\|^2 + |\mu|^2 \sum_{j=1}^{\infty} \|Be_j\|^2 < \infty.$$

Отже, ми довели $\lambda A + \mu B \in S_2(H)$.

Тепер покажемо, що $|A| = \left(\sum_{j=1}^{\infty} \|Ae_j\|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$ задаватиме норму. Дійсно,

1) $|A| \geq 0$ — все ясно. Тепер $|A| = 0 \iff \|Ae_j\|^2 = 0, \forall j \geq 1 \iff Ae_j = 0, \forall j \geq 1 \iff A = O$.

2) $|\lambda A| = \left(\sum_{j=1}^{\infty} \|(\lambda A)e_j\|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \left(|\lambda|^2 \sum_{j=1}^{\infty} \|Ae_j\|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = |\lambda| |A|$.

3) $|A+B| = \left(\sum_{j=1}^{\infty} \|(A+B)e_j\|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum_{j=1}^{\infty} \|Ae_j\|^2 + \sum_{j=1}^{\infty} \|Be_j\|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum_{j=1}^{\infty} \|Ae_j\|^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{j=1}^{\infty} \|Be_j\|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = |A| + |B|$.

Всі властивості норми доведені.

Нехай $A \in S_2(H)$, тоді оцінимо даний оператор:

$$\|Ax\| = \left\| A \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) e_k \right\| = \left\| \sum_{k=1}^{\infty} (x, e_k) Ae_k \right\| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)| \|Ae_k\| \stackrel{\text{н-ть Гьольдера}}{\leq} \left(\sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k=1}^{\infty} \|Ae_k\|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \stackrel{\text{р-ть Парсеваля}}{=} \|x\| |A|.$$

Отже, ми довели, що $\|A\| \leq |A|$. До речі, рівність виконується $\iff \text{rank } A = 1$ (TODO: довести) ■

Proposition 4.12.4 $A \in S_2(H) \iff A^* \in S_2(H)$.

При цьому $|A| = |A^*|$.

Вправа: довести.

Все це можна повторити в випадку операторів $A \in \mathcal{B}(H_1, H_2)$, мені зараз лінь.

5 Компактні оператори

5.1 Спектр та резольвента оператора

Цей розділ про узагальнення поняття власних чисел та власних векторів операторів на нескінченний простір. На жаль, ці означення нам не підійдуть.

Example 5.1.1 Зокрема розглянемо оператор $A: L_2([0, 1], \lambda) \rightarrow L_2([0, 1], \lambda)$ таким чином: $(Af)(t) = t \cdot f(t)$. Якщо припустити, що μ — власне число, тоді існує ненульова функція $f \in L_2([0, 1], \lambda)$, для якої $Af = \lambda f$, тобто звідси $tf(t) = \mu f(t) \pmod{\lambda}$. Але тоді ми можемо отримати в результаті $f = 0 \pmod{\lambda}$, що суперечить.

Отже, такий оператор не містить власні числа.

Definition 5.1.2 Нехай E — нормований простір та $A \in \mathcal{B}(E)$.

Число $\lambda \in \mathbb{C}$ називатимемо **регулярною точкою** оператора A , якщо

$$\exists (A - \lambda I)^{-1} \stackrel{\text{позн.}}{=} R_\lambda(A)$$

Існуючий оператор називають **резольвентою оператора A в точці λ** .

Позначення: $\rho(A)$ — множина всіх регулярних точок оператора A .

Definition 5.1.3 Нехай E — нормований простір та $A \in \mathcal{B}(E)$.

Спектром оператора A називають множину

$$\sigma(A) = \mathbb{C} \setminus \rho(A)$$

По суті, спектр — це просто доповнення до множини всіх регулярних точок.

Example 5.1.4 Повертаючись до $A: L_2([0, 1], \lambda) \rightarrow L_2([0, 1], \lambda)$, що заданий як $(Af)(t) = t \cdot f(t)$, ми можемо довести, що $\sigma(A) = [0, 1]$.

Remark 5.1.5 Можна трошки детально про це говорити. От нехай $A: E \rightarrow E$ — лінійний оператор (не обов'язково навіть обмежений), оберемо $\lambda \in \mathbb{C}$. Будемо розглядати оператор $A - \lambda I$, який розбиває на кілька випадків:

1) $\ker(A - \lambda I) \neq \{0\}$, тоді існує ненульовий розв'язок x , для якого $(A - \lambda I)x = 0$. У цьому випадку справді λ називають власним числом. Множину всіх власних чисел позначають за $\sigma_T(A)$ — так званий **точковий спектр**.

Далі йде $\ker(A - \lambda I) = \{0\}$, який розбиває на ще три випадки:

2) $\text{Im}(A - \lambda I) \neq X$, але при цьому $\overline{\text{Im}(A - \lambda I)} = X$. Тоді число λ потрапляє в сукупність $\sigma_H(A)$ — так званий **неперервний спектр**.

3) $\overline{\text{Im}(A - \lambda I)} \neq X$. Тоді число λ потрапляє в сукупність $\sigma_3(A)$ — так званий **залишковий спектр**.

4) $\text{Im}(A - \lambda I) = X$. Тоді оскільки одночасно $\ker(A - \lambda I) = \{0\}$, то в нас буде існувати $(A - \lambda I)^{-1}$ — та сама резольвента оператора A в точці λ . Саме число λ потрапляє в сукупність $\rho(A)$ — множина **регулярних точок**.

Таким чином, ми розбили $\mathbb{C} = \sigma_T(A) \sqcup \sigma_H(A) \sqcup \sigma_3(A) \sqcup \rho(A)$. Якщо об'єднати перші три, то ми отримаємо **спектр** оператора A , тобто $\sigma(A) = \sigma_T(A) \sqcup \sigma_H(A) \sqcup \sigma_3(A)$. Таким чином, $\mathbb{C} = \sigma(A) \sqcup \rho(A)$.

Example 5.1.6 Зокрема маємо $A: l_2 \rightarrow l_2$, що задається як $A(x_1, x_2, x_3, \dots) = (0, x_1, x_2, \dots)$.

Нехай $(A - \lambda I)x = 0$, тобто $(-\lambda x_1, x_1 - \lambda x_2, x_2 - \lambda x_3, \dots) = (0, 0, 0, \dots)$. Звідси випливатиме $\lambda x_1 = 0$. Якщо $\lambda = 0$, то отримаємо $x_1 = x_2 = \dots = 0$. Якщо $x_1 = 0$, то звідси $\lambda x_2 = 0$, тут аналогічно не можемо брати $\lambda \neq 0$, тож $x_2 = 0, \dots$

Коротше, не існує власних чисел, тобто маємо $\sigma_T(A) = \emptyset$.

Тепер розглянемо спряжений оператор $A^*: l_2 \rightarrow l_2$, що задається як $A^*(y_1, y_2, \dots) = (y_2, y_3, \dots)$. Ми знаємо, що в гільбертовому просторі $l_2 = \ker(A - \lambda I) \oplus \text{Im}(A - \lambda I)^*$.

Theorem 5.1.7 Нехай E — нормований простір та $A \in \mathcal{B}(E)$. Тоді $\sigma(A)$ — замкнена множина та при цьому $\sigma(A) \subset B[0, \|A\|]$.

Proof.

Припустимо, що $\lambda \notin B[0, \|A\|]$, тобто це означає, що $|\lambda| < \|A\|$. Тоді звідси маємо:

$$(A - \lambda I) = -\frac{1}{\lambda} \left(I - \frac{A}{\lambda} \right).$$

Оскільки $\left\| \frac{A}{\lambda} \right\| < 1$, то тоді існує $\left(I - \frac{A}{\lambda} \right)^{-1}$, внаслідок чого існуватиме $(A - \lambda I)^{-1}$. Тобто звідси $\lambda \in \rho(A) \implies \lambda \notin \sigma(A)$. Отже, довели щойно $\sigma(A) \subset B[0, \|A\|]$.

Для доведення замкненості $\sigma(A)$ досить довести відкритість $\rho(A)$. Нехай $\lambda_0 \in \rho(A)$, тоді існує резольвента $(A - \lambda_0 I)^{-1}$. Ми хочемо довести, що λ_0 буде внутрішньою точкою. Для цього розглянемо оператор $A - \lambda I = (A - \lambda_0 I) - (\lambda - \lambda_0)I$. Оператор $(A - \lambda_0 I)$ оборотний, а на другий оператор хочемо оцінку $\|(\lambda - \lambda_0)I\| \leq \|(A - \lambda_0 I)^{-1}\|^{-1}$. Якщо покласти $r = \|(A - \lambda_0 I)^{-1}\|^{-1}$, то тоді $|\lambda - \lambda_0| < r$. За **Th. 3.3.7**, оператор $A - \lambda I$ — оборотний, тобто $\lambda \in \rho(A)$. Довели $B(\lambda_0, r) \subset \rho(A)$. ■

Remark 5.1.8 При $\lambda \in B(\lambda_0, r)$ матимемо рівномірну обмеженість $\|(A - \lambda I)^{-1}\|$.

Proof.

Дійсно, трошечки розпишемо необхідне:

$$A - \lambda I = (A - \lambda_0 I) - (\lambda - \lambda_0)I = (A - \lambda_0 I) (I - (\lambda - \lambda_0)(A - \lambda_0 I)^{-1}).$$

Візьмемо оборотність з двох боків:

$$(A - \lambda I)^{-1} = [I - (\lambda - \lambda_0)(A - \lambda_0 I)^{-1}]^{-1} (A - \lambda_0 I)^{-1}.$$

$$\|(A - \lambda I)^{-1}\| \leq \|(A - \lambda_0 I)^{-1}\| \|(I - (\lambda - \lambda_0)(A - \lambda_0 I)^{-1})^{-1}\| \leq$$

Тимчасово для зручності позначу $(\lambda - \lambda_0)(A - \lambda_0 I)^{-1} = T$. Ми заздалегідь зауважимо, що $\|T\| = |\lambda - \lambda_0| \|(A - \lambda_0 I)^{-1}\| < r \|(A - \lambda_0 I)^{-1}\|$. Тепер зробимо оцінку

$$\|(I - T)^{-1}\| = \|I + T + T^2 + \dots\| \leq \|I\| + \|T\| + \|T\|^2 + \dots = \frac{1}{1 - \|T\|} < \frac{1}{1 - r \|(A - \lambda_0 I)^{-1}\|}.$$

$$\leq \frac{\|(A - \lambda_0 I)^{-1}\|}{1 - r \|(A - \lambda_0 I)^{-1}\|}. \quad \blacksquare$$

Theorem 5.1.9 Тотожність Гілберта

Нехай E — нормований простір та $A \in \mathcal{B}(E)$. Також нехай $z_1, z_2 \in \rho(A)$. Тоді

$$R_{z_1}(A) - R_{z_2}(A) = (z_1 - z_2)R_{z_1}(A)R_{z_2}(A).$$

Remark 5.1.10 Щоб легше було запам'ятати. Резольвенту $R_\lambda(A) = (A - \lambda I)^{-1}$ можна асоціювати з числом $\frac{1}{A - \lambda}$ (тут A, λ теж числа). Тоді якщо розписати різницю, то

$$\frac{1}{A - z_1} - \frac{1}{A - z_2} = \frac{z_1 - z_2}{(A - z_1)(A - z_2)} = (z_1 - z_2) \frac{1}{A - z_1} \frac{1}{A - z_2}.$$

Proof.

Розглянемо ось таку різницю:

$$(A - z_2 I) - (A - z_1 I) = (z_1 - z_2)I.$$

Домножимо ліворуч на $R_{z_1}(A)$ та праворуч на $R_{z_2}(A)$ — отримаємо:

$$R_{z_1}(A)(A - z_2 I)R_{z_2}(A) - R_{z_1}(A)(A - z_1 I)R_{z_2}(A) = (z_1 - z_2)R_{z_1}(A)R_{z_2}(A).$$

Згадавши, що з себе представляє резольвента, отримаємо відповідну рівність:

$$R_{z_1}(A) - R_{z_2}(A) = (z_1 - z_2)R_{z_1}(A)R_{z_2}(A). \quad \blacksquare$$

Corollary 5.1.11 Резольвенти оператора A комутують між собою. Тобто $R_{z_1}(A)R_{z_2}(A) = R_{z_2}(A)R_{z_1}(A)$.

Theorem 5.1.12 Відображення $z \mapsto R_z(A)$ буде неперервним на $\rho(A)$.

Proof.

Дійсно, маємо $z_0 \in \rho(A)$. При $z \rightarrow z_0$ хочемо довести, що $R_z(A) \rightarrow R_{z_0}(A)$.

$$\|R_z(A) - R_{z_0}(A)\| = |z - z_0| \|R_z(A)R_{z_0}(A)\| \leq |z - z_0| C^2 \rightarrow 0.$$

Остання оцінка отрималася в результаті того, що в околі регулярної точки резольвенти рівномірно обмежені за першим зауваженням. ■

Theorem 5.1.13 Нехай E — нормований простір та $A \in \mathcal{B}(E)$. Також нехай $z \in \rho(A)$. Тоді

$$\exists \lim_{h \rightarrow 0} \frac{R_{z+h}(A) - R_z(A)}{h} = R_z^2(A).$$

Тобто ця теорема каже про диференційованість резольвенти в регулярних точках.

Proof.

$$\frac{R_{z+h}(A) - R_z(A)}{h} = \frac{1}{h}(z+h-z)R_{z+h}(A)R_z(A) \xrightarrow{R_z - \text{неперервна}} R_z(A)R_z(A) = R_z^2(A). \quad \blacksquare$$

Corollary 5.1.14 Нехай E — нормований простір. Зафіксуємо будь-яку точку $x \in E$ та функціонал $l \in E'$. Розглянемо комплекснозначну функцію $f_{x,l}(z) = l(R_z(A)x)$ на $\rho(A)$. Тоді така функція — аналітична на $\rho(A)$.

Theorem 5.1.15 Нехай E — нормований простір та $A \in \mathcal{B}(E)$. Тоді $\sigma(A) \neq \emptyset$.

Proof.

Припустимо, що $\sigma(A) = \emptyset$, тобто звідси $\rho(A) = \mathbb{C}$, а тому функція $l(R_z(A)x)$ — аналітична на всій комплексній площині. Виникає бажання застосувати теорему Луівілля, але спочатку треба показати обмеженість.

Для цього треба рівномірна обмеженість $\|R_z(A)\|$. Маємо два випадки:

1) $z \in B[0, 2\|A\|]$.

У цьому випадку $\|R_z(A)\|$ — неперервна функція на $B[0, 2\|A\|]$, тому звідси $\exists c_1 : \forall z \in B[0, 2\|A\|] : \|R_z(A)\| \leq c_1$.

2) $z \notin B[0, 2\|A\|]$.

$$\|R_z(A)\| = \|(A - zI)^{-1}\| = \frac{1}{|z|} \left\| \left(I - \frac{A}{z} \right)^{-1} \right\| \stackrel{\| \frac{A}{z} \| < \frac{1}{2}}{=} \left\| I + \frac{A}{z} + \frac{A^2}{z^2} + \dots \right\| \leq \frac{1}{|z|} \frac{1}{1 - \frac{1}{|z|}\|A\|} \leq \frac{2}{|z|} \leq \frac{1}{\|A\|}.$$

Отже, дійсно на $\mathbb{C}$ маємо рівномірну обмеженість $\|R_z(A)\|$. При цьому із того ланцюга нерівностей ми отримали $\|R_z(A)\| \rightarrow 0$ при $z \rightarrow \infty$.

Тепер покажемо обмеженість комплекснозначної функції:

$$|f_{x,l}(z)| = |l(R_z(A)x)| \leq \|l\| \|R_z(A)x\| \leq \|l\| \|R_z(A)\| \|x\| \leq C \|l\| \|x\|.$$

Отже, за теоремою Луівілля, $f_{x,l}(z) = C_{x,l}$ — стала функція. Тільки оскільки $|f_{x,l}(z)| \rightarrow 0$ при $z \rightarrow \infty$, то звідси $f_{x,l}(z) = 0$. Зокрема звідси отримаємо $R_z(A) = 0$. Тобто ми отримали оборотний оператор, який нульовий — суперечність! $\blacksquare$

5.2 Компактні оператори

Definition 5.2.1 Задано E_1, E_2 — нормовані простори та $A : E_1 \rightarrow E_2$ — лінійний оператор (не обов'язково обмежений).

Оператор A називається **компактним** (інколи називають **цілком неперервним**), якщо

$$\forall M \subset E_1 \text{ — обмежена : } A(M) \text{ — передкомпакт.}$$

Коротше кажучи, якщо образ довільної обмеженої множини E_1 — передкомпакт.

Позначення: $\mathcal{K}(E_1, E_2)$ — множина всіх компактних операторів.

Proposition 5.2.2 Задано E_1, E_2 — нормовані простори.

$A \in \mathcal{K}(E_1, E_2) \iff A(B[0; 1])$ — передкомпакт.

Proof.

$\Rightarrow$ Миттєво з означення.

$\Leftarrow$ Дано: $A(B[0; 1])$ — передкомпакт. Нехай $M \subset E_1$ — деяка обмежена множина. Тоді існує відкрита куля $B(x; R) \supset M$. Доведемо, що $A(M)$ буде передкомпактом.

Нехай $(y_n)_{n=1}^{\infty} \subset A(M)$ — обмежена, кожний $y_n = Ax_n$, $x_n \in M$. Розглянемо послідовність $\left(\frac{y_n - Ax}{R} \right)_{n=1}^{\infty} \subset A(B[0; 1])$, яка буде також обмеженою. Тоді можна виділити збіжну підпослідовність $\left(\frac{y_{n_k} - Ax}{R} \right)_{k=1}^{\infty}$, зокрема збіжною буде підпослідовність $(y_{n_k})_{k=1}^{\infty}$. $\blacksquare$

Proposition 5.2.3 $\mathcal{K}(E_1, E_2) \subset \mathcal{B}(E_1, E_2)$.

Іншими словами, всі компактні оператори — обмежені автоматично.

Proof.

Дійсно, нехай $A \in \mathcal{K}(E_1, E_2)$, тоді $A(B[0; 1])$ буде передкомпактом, яка автоматично обмежена. Нехай $x \in E_1$. Тоді зауважимо, що елемент $\frac{x}{\|x\|} \in B[0; 1]$. Звідси випливає, що $\left| A\left(\frac{x}{\|x\|}\right) \right| \leq C \implies \|Ax\| \leq C\|x\|$. Таким чином, $A \in \mathcal{B}(E_1, E_2)$. ■

Example 5.2.4 У зворотному це не працює.

Дійсно, розглянемо одиничний оператор $I \in \mathcal{B}(E)$. Стверджується наступне:
 $I \in \mathcal{K}(E) \iff \dim E < \infty$.

Але щоб мені це довести, треба відволіктися трошки та довести кілька тверджень.

Theorem 5.2.5 Лема Ріса

Задано E — нормований простір та $G \subsetneq E$ — замкнений підпростір. Тоді $\forall \varepsilon > 0 : \exists y_\varepsilon \notin G, \|y_\varepsilon\| = 1 : \forall x \in G : \|y_\varepsilon - x\| > 1 - \varepsilon$.

Remark 5.2.6 Цю теорему ще називають теоремою про існування майже ортогонального вектора. Ми обговорили цю ситуацію в частинному випадку нормованого простору, саме в гільбертовому просторі H та замкненому підпросторі $G \subset H$ (див. **Rm. 4.3.8**).

У загальному нормованому просторі E можуть не існувати такі вектори $y \notin G$, щоб $\|y - x\| \geq 1$, тобто можуть не існувати ортогональні вектори, так би мовити. Однак ми можемо скільки завгодно наблизитися до одиниці, тобто $\exists y_\varepsilon \notin G : \|y_\varepsilon\| = 1 : \|y_\varepsilon - x\| > 1 - \varepsilon$. Це й пояснює альтернативну назву "майже ортогональний".

Proof.

Оберемо елемент $z \notin G$. Позначимо $\delta = \rho(z, G)$, який в свою чергу $\delta > 0$. Якби $\delta = 0$, то за критерієм інфімуму ми би знайшли послідовність $(y_n)_{n=1}^\infty$, для якої $\|y_n - z\| < \frac{1}{n} \rightarrow 0$ — ми би отримали, що z — гранична G , де водночас $z \notin G$ — суперечить за рахунок замкненості G . Звідси $\forall \eta > 0 : \exists x_\eta \in G : \delta \leq \|z - x_\eta\| < \delta + \eta$ за критерієм інфімуму.

Нехай $\varepsilon > 0$. Ми підкрутимо таке значення η , щоб $\frac{\eta}{\delta + \eta} = \varepsilon$. Доведемо, що $y_\varepsilon = \frac{z - x_\eta}{\|z - x_\eta\|}$ буде шуканим вектором. Цілком зрозуміло, що $y_\varepsilon \notin G$, $\|y_\varepsilon\| = 1$. Доведемо нерівність.

$$\|y_\varepsilon - x\| = \left\| \frac{z - x_\eta}{\|z - x_\eta\|} - x \right\| = \frac{1}{\|z - x_\eta\|} \|z - (x_\eta + x\|z - x_\eta\|)\|.$$

Зазначимо, що вектор $x_\eta + x\|z - x_\eta\| \in G$, тому звідси $\|z - (x_\eta + x\|z - x_\eta\|)\| \geq \rho(z, G) = \delta$. Повертаючись до ланцюга рівностей, отримаємо:

$$\|y_\varepsilon - x\| \geq \frac{\delta}{\|z - x_\eta\|} > \frac{\delta}{\delta + \eta} = 1 - \frac{\eta}{\delta + \eta} = 1 - \varepsilon. \quad \blacksquare$$

Theorem 5.2.7 Задано E — нормований простір.

$\dim E < \infty \iff$ кожна підмножина E — передкомпактна.

Proof.

$\Leftarrow$ Дано: $\dim E = \infty$. Ми хочемо довести, що замкнена куля $B[0; 1]$ не буде компактом.

У якості x_1 оберемо будь-який вектор одиничної сфери та покладемо $G_1 = \text{span}\{x_1\}$. За лемою Ріса, знайдеться вектор $x_2 = y_{\frac{1}{2}} \notin G_1$ такий, що $\|x_2\| = 1$ та $\forall x \in G_1 : \|x_2 - x\| > \frac{1}{2}$, зокрема звідси

$$\|x_2 - x_1\| > \frac{1}{2}.$$

Покладемо $G_2 = \text{span}\{x_1, x_2\}$. Тоді знову за лемою Ріса, знайдеться вектор $x_3 = y_{\frac{1}{2}}$ такий, що $\|x_3\| = 1$ та $\forall x \in G_2 : \|x_3 - x\| > \frac{1}{2}$. Зокрема $\|x_3 - x_1\| > \frac{1}{2}$, $\|x_3 - x_2\| > \frac{1}{2}$.

$\vdots$

У силу того, що $\dim E = \infty$, то цей процес буде продовжуватися. Побудуємо послідовність $(x_n)_{n=1}^\infty \subset B[1; 0]$ таку, що $\forall m, n \geq 1 : \|x_m - x_n\| > \frac{1}{2}$. Така обмежена послідовність не містить збіжної підпослідовності.

$\Rightarrow$ Дано: $\dim E < \infty$, тоді відомо, що $E \cong \mathbb{C}^n$. Будь-яка обмежена підмножина $\mathbb{R}^n$ — передкомпактна за Больцано-Ваєрштраса. ■

Повертаємося назад до розмов про компактні простори.

Proposition 5.2.8 Припустимо, що $\dim E_2 < \infty$. Тоді $\mathcal{K}(E_1, E_2) = \mathcal{B}(E_1, E_2)$.

Інакше кажучи, за додатковими умовами обмежений оператор може бути компактным.

Proof.

Вкладення $\mathcal{K}(E_1, E_2) \subset \mathcal{B}(E_1, E_2)$ в нас уже є. Треба тепер тільки зворотний бік.

Припустимо, що $A \in \mathcal{B}(E_1, E_2)$. Оберемо довільну обмежену множину $M \subset E_1$. Тоді оскільки $\dim E_2 < \infty$, то $A(M) \subset E_2$ буде передкомпактною автоматично. Отже, $A \in \mathcal{K}(E_1, E_2)$. ■

Example 5.2.9 Розглянемо оператор $A: C([0, 1]) \rightarrow C([0, 1])$, що задається як $(Af)(t) = \int_0^1 k(t, s)f(s) ds$, де функція $k(t, s) = a(t)b(s)$, $a, t \in C([0, 1])$. Покажемо, що це — компактний оператор.

Дійсно, $(Af)(t) = a(t) \int_0^1 b(s)f(s) ds = C \cdot a(t)$. Тобто звідси $\dim \text{Im } A = 1$, що підтверджує компактність оператора.

5.3 Властивості компактного оператора

Theorem 5.3.1 Задано E — банахів простір. Розглянемо послідовність $(A_n)_{n=1}^\infty \subset \mathcal{K}(E)$, яка збігається за нормою (із $\mathcal{B}(E)$) до оператора A . Тоді $A \in \mathcal{K}(E)$.

Proof.

Фіксуємо обмежену послідовність $(x_n)_{n=1}^\infty$ із E . Ми хочемо зі послідовності $(Ax_n)_{n=1}^\infty$ відокремити збіжну підпослідовність. Будемо діагональним методом доводити.

$A_1 \in \mathcal{K}(E)$, тому зі послідовності $(A_1 x_n)_{n=1}^\infty$ відокремимо збіжну підпослідовність $(A_1 x_{n_1})_{n=1}^\infty$.

$A_2 \in \mathcal{K}(E)$, тому зі послідовності $(A_2 x_{n_1})_{n=1}^\infty$ відокремимо збіжну підпослідовність $(A_2 x_{n_2})_{n=1}^\infty$.

⋮

Розглянемо діагональну послідовність $(x_{nn})_{n=1}^\infty$. Нам треба довести, що саме підпослідовність $(Ax_{nn})_{n=1}^\infty$ буде фундаментальною, а внаслідок банаховості E — збіжною. Почнемо потроху оцінювати норму. Перед цим треба зауважити, що $(A_k x_{nn})_{n=1}^\infty$ при всіх $k \in \mathbb{N}$ буде збіжною, просто тому що $(x_{nn})_{n=1}^\infty \subset (x_{n_k})_{n=1}^\infty$ та $(A_k x_{n_k})_{n=1}^\infty$ збіжна.

$$\begin{aligned} \|Ax_{mm} - Ax_{nn}\| &\leq \|Ax_{mm} - A_k x_{mm}\| + \|A_k x_{mm} - A_k x_{nn}\| + \|A_k x_{nn} - A_k x_{mm}\| \stackrel{\mathcal{K}(E) \subset \mathcal{B}(E)}{\leq} \\ &\leq \|A - A_k\|(\|x_{mm}\| + \|x_{nn}\|) + \|A_k x_{nn} - A_k x_{mm}\| \stackrel{\square}{\leq} \end{aligned}$$

Оскільки $(x_n)_{n=1}^\infty$ обмежена, то обмеженою буде $(x_{nn})_{n=1}^\infty$, а там звідси $\|x_{nn}\| \leq c, \forall n \geq 1$.

Далі оскільки $(\|A_k\|)_{n=1}^\infty$ — збіжна, то існує такий номер k_0 , для якого $\|A - A_{k_0}\| < \frac{\varepsilon}{3c}$. Також в силу збіжності $(A_{k_0} x_{nn})_{n=1}^\infty$ ми отримаємо, що $\exists N : \forall n, m \geq N : \|A_{k_0} x_{nn} - A_{k_0} x_{mm}\| < \frac{\varepsilon}{3}$.

$$\stackrel{\square}{\leq} \frac{\varepsilon}{3c} \cdot 2c + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \quad \blacksquare$$

Theorem 5.3.2 $\mathcal{K}(E)$ — підпростір $\mathcal{B}(E)$ за умовою, що E — банахів.

(TODO: провести доведення)

Remark 5.3.3 Ці дві теореми працюють для операторів з $\mathcal{K}(E_1, E_2)$, тільки тут E_2 має бути банаховим.

Theorem 5.3.4 Нехай $A \in \mathcal{K}(E)$. Тоді $A^* \in \mathcal{K}(E')$.

Proof.

Нехай $(l_n)_{n=1}^\infty \subset E'$ — обмежена послідовність. Хочемо із $(A^* l_n)_{n=1}^\infty$ відокремити збіжну підпослідовність. Зауважимо наступне:

$$\|A^* l_n\| = \sup_{\|y\|=1} |(A^* l_n)(y)| = \sup_{y \in S(1;0)} |l_n(Ay)| = \sup_{z \in A(S(1;0))} |l_n(z)|.$$

Для доведення теореми нам досить буде встановити передкомпактність множини $\{l_n\}_{n=1}^\infty \subset C(\overline{AS(1;0)})$.

Перевіримо умови виконання теореми Арцела-Асколі.

$\forall n \geq 1 : |l_n(z)| \leq \|l_n\| \|z\| \leq c \cdot c_1$ — виконується рівномірна обмеженість.

$\forall n \geq 1 : |l_n(z_1) - l_n(z_2)| \leq c \|z_1 - z_2\|$ — виконується умова одностайної неперервності.

Отже, існує збіжна підпослідовність $(l_{n_k})_{n=1}^\infty$, причому $\|l_{n_k} - l_{n_m}\| = \max_{z \in AS(1;0)} |l_{n_k}(z) - l_{n_m}(z)| \rightarrow 0$.

Внаслідок чого $\|A^* l_{n_k} - A^* l_{n_m}\| \rightarrow 0$. ■

5.4 Компактні оператори в сепарабельному гільбертовому просторі

Розглянемо H — сепарабельний гільбертів простір, оберемо базис $\{e_j\}_{j=1}^\infty$. Розглянемо оператор $A \in S_2(H)$, тобто $\sum_{j,k=1}^\infty |a_{jk}|^2 < \infty$. Позначимо $\mathbb{A}$ за матрицю оператора A .

Theorem 5.4.1 $S_2(H) \subsetneq K(H)$.

Proof.

Розглянемо оператор P_j — проєктор на підпростір, породжений базисом $\{e_1, \dots, e_j\}$. Розглянемо послідовність операторів $A_j = P_j A$, їм відповідають матриці $\mathbb{A}_j$ — та сама матриця $\mathbb{A}$, тільки, починаючи з $j+1$ рядка, будуть одні нулі. Зауважимо також, що образ A_j буде скінченним, причому $A_j = P_j A \in \mathcal{B}(H)$ (як добуток обмежених), тому $A_j \in \mathcal{K}(H)$. Доведемо, що $\|A - A_j\| \rightarrow 0$ при $j \rightarrow \infty$.

Спочатку доведемо, що $|A - A_j| \rightarrow 0$ при $j \rightarrow \infty$ за нормою Гільберта-Шмідта.

$$|A - A_j|^2 = \sum_{k=j+1}^\infty \left(\sum_{l=1}^\infty |a_{lk}|^2 \right) \rightarrow 0 \text{ при } j \rightarrow \infty \text{ як залишковий ряд. При цьому ми маємо } \|A\| \leq |A|$$

(TODO: чому?), тоді звідси випливає, що $\|A - A_j\| \rightarrow 0$. Отже, за **Th. 5.3.1**, оператор $A \in \mathcal{K}(H)$.

Тепер розглянемо оператор A , яка має матрицю $\mathbb{A} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots)$. Зауважимо, що $A \in S_2(H) \iff \sum_{j=1}^\infty |\lambda_j|^2 < \infty$. Також маємо $A \in \mathcal{K}(H) \iff \lambda_j \rightarrow 0$. ■

Theorem 5.4.2 Нехай $A \in \mathcal{K}(H)$. Тоді існує послідовність операторів $(A_n)_{n=1}^\infty$, для яких $A_n \rightarrow A$, причому $\dim \text{Im } A_n < \infty$.

Proof.

Аналогічно розглянемо оператор P_j , як було вище, а також оператор $A_j = P_j A$. Доведемо, що $A_j \rightarrow A$, тобто ми хочемо $\|A - A_j\| = \|(I - P_j)A\| \rightarrow 0$.

Припустимо, що $\|(I - P_j)A\| \not\rightarrow 0$, тобто існує $c > 0$, для якої $\|(I - P_j)A\| \geq c$, тобто іншими словами $\sup_{\|x\|=1} \|(I - P_j)Ax\| \geq c$. Тоді можна відокремити послідовність $(x_j)_{j=1}^\infty$ з $\|x_j\| = 1$, для яких

$$\|(I - P_j)Ax_j\| \geq \frac{c}{2}. \text{ Для зручності позначимо } y_j = Ax_j. \text{ Оскільки } A \in \mathcal{K}(H), \text{ то можна відокремити}$$

збіжну підпослідовність $(y_{j_k})_{k=1}^\infty$, де $y_{j_k} \rightarrow y$. Власне, звідси $\|(I - P_j)y\| \geq \frac{c}{2}$. Проте раніше доводили

(TODO: ?), що $I - P_j \xrightarrow{s} 0$ при $j \rightarrow \infty$, тобто $(I - P_j)y \rightarrow 0$ — суперечність! ■

5.5 Спектри в компактних операторах

Theorem 5.5.1 Альтернатива Фредгольма

Задано E — банахів простір, оператор $A \in \mathcal{K}(E)$ та $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Тоді виконується рівно одна з умов:

- 1) λ — власне число A ;
- 2) λ — регулярна точка A .

Перед доведення теореми треба навести корисну лему.

Lemma 5.5.2 Нехай $A \in \mathcal{K}(E)$ та λ — не власне число. Тоді існує $c > 0$ такий, що $\forall x \in E$: $\|(A - \lambda I)x\| \geq c\|x\|$.

Proof.

Припустимо, що не виконується нерівність. Тоді для $\frac{1}{n} \in \mathbb{N}$ існують точки $z_n \in E$, для яких

$$\|(A - \lambda I)z_n\| < \frac{1}{n}\|z_n\|. \text{ Ми будемо розглядати точки } x_n = \frac{z_n}{\|z_n\|}, \text{ тобто з одиничною нормою (там,}$$

де раптом $z_n = 0$, можна просто пропустити), звідси $\|(A - \lambda I)x_n\| < \frac{1}{n} \rightarrow 0$.

Позначимо точку $y_n = Ax_n$. Зауважимо, що оскільки $(x_n)_{n=1}^\infty$ обмежена та $A \in \mathcal{K}(E)$, то тоді існує збіжна підпослідовність $y_{n_k} \rightarrow y$. Також справедлива така оцінка:

$$|\lambda| \stackrel{\text{з одного боку}}{=} \|\lambda x_n\| = \stackrel{\text{з іншого боку}}{=} \|(\lambda I - A)x_n + Ax_n\| \leq \|y_n\| + \|(A - \lambda I)x_n\|.$$

$$\implies \|y_n\| \geq |\lambda| - \|(A - \lambda I)x_n\|.$$

Оскільки це виконано $\forall n \in \mathbb{N}$, то зокрема й для n_k , а далі при $k \rightarrow \infty$ отримаємо $\|y\| \geq |\lambda|$.
 Утім із іншого боку, зараз доведемо, що $y = 0$. Дійсно, маємо
 $0 \leq \|(A - \lambda I)y_{n_k}\| = \|(A - \lambda I)Ax_{n_k}\| = \|A(A - \lambda I)x_{n_k}\|$.
 Якщо спрямувати $k \rightarrow \infty$, то ми отримаємо $0 \leq \|(A - \lambda I)y\| \leq 0$, що свідчить про $(A - \lambda I)y = 0$.
 Отже, y — власне число оператора A — суперечність! ■

Повернімося до доведення альтернативи Фредгольма.

Proof.

Якщо λ — власне число, то закінчили доведення.

Тому нехай λ таким не є. За щойно доведеною лемою, $\|(A - \lambda I)x\| \geq c\|x\|$ при всіх $x \in E$ для деякого $c > 0$. Тоді звідси (TODO: ?) існує $(A - \lambda I)^{-1} : \text{Im}(A - \lambda I) \rightarrow E$. За теоремою про замкнений графік, $\text{Im}(A - \lambda I)$ буде замкнутою множиною. Нам залишилося показати, що $\text{Im}(A - \lambda I) = E$.

Позначимо $\text{Im}(A - \lambda I) = E_1$ та припустимо, що $E_1 \neq E$.

Розглянемо образ $(A - \lambda I)E_1 \stackrel{\text{позн.}}{=} E_2$. Слід зазначити, що $E_2 \neq E_1$ (адже якби $E_2 = E_1$, то оскільки $(A - \lambda I)^{-1} : E \rightarrow E_1$ — бієкція, то $E_1 = (A - \lambda I)E_1 = E$, що не наш випадок).

Розглянемо образ $(A - \lambda I)E_2 \stackrel{\text{позн.}}{=} E_3$. Слід зазначити, що $E_3 \neq E_2$ (аналогічно).

⋮

Отримаємо ланцюг вкладень $E \supset E_1 \supset E_2 \supset E_3 \supset \dots$. На кожному з цих вкладень застосуємо лему Ріса. Для $\varepsilon = \frac{1}{2}$ будуть існувати точки $x_j \in E_j \setminus E_{j+1}$, причому $\|x_j\| = 1$, для яких $\forall y \in E_{j+1} : \|x_j + y\| > 1 - \frac{1}{2}$. Саме ці точки нам дадуть сказати, що $(Ax_n)_{n=1}^\infty$ не містить збіжної підпослідовності. Справді, при $m > n$ маємо

$$\|Ax_n - Ax_m\| = \|\lambda x_n + Ax_n - \lambda x_n - \lambda x_m - Ax_m + \lambda x_m\| = \|\lambda x_n + (A - \lambda I)x_n - \lambda x_m - (A - \lambda I)x_m\| \geq \lambda \cdot \frac{1}{2}.$$

Пояснення до нерівності: $(A - \lambda I)x_n \in E_{n+1}$, далі $\lambda x_m \in E_m \subset E_{n+1}$ та $(A - \lambda I)x_m \in E_{m+1} \subset E_n$. Тобто останні три доданки — це елемент з E_{n+1} , а далі нерівність з леми Ріса.

Проте $A \in \mathcal{K}(E)$, тому $(Ax_n)_{n=1}^\infty$ зобов'язана мати збіжну підпослідовність — суперечність! ■

Theorem 5.5.3 Задано E — банахів та $A \in \mathcal{K}(E)$. Тоді:

- 1) $\sigma(A)$ — не більш, ніж зліченна множина;
- 2) Якщо $\lambda \in \sigma(A) \setminus \{0\}$, то $\dim L_\lambda < \infty$ (тобто λ — власне число скінченної кратності);
- 3) Якщо $\dim E = \infty$, то $0 \in \sigma(A)$ — єдина гранична точка $\sigma(A)$.

Proof.

Нехай $\lambda \in \sigma(A) \setminus \{0\}$, тоді за альтернативою Фредгольма, λ — власне число A . Звужимо оператор $A|_{L_\lambda} \stackrel{\text{насправді}}{=} \lambda I$. Оскільки A компактний, то тоді обов'язково має бути $\dim L_\lambda < \infty$.

Оберемо $r > 0$ та покажемо, що існує скінченна кількість точок $\lambda_j \in \sigma(A)$, які лежать поза межами кола $B(0; r)$.

Припустимо, що там нескінченна кількість точок. Ми можемо взяти різний набір $\lambda_j \in \sigma(A)$, $j \geq 1$, для яких $|\lambda_j| \geq r$. Оскільки це власні числа, то $Ax_j = \lambda_j x_j$ для деяких $(x_j)_{j=1}^\infty$. Зауважимо, що будь-який скінченний набір $\{x_1, \dots, x_n\}$ буде лінійно незалежною. Адже, припустивши, що насту-

пна $\{x_1, \dots, x_n, x_{n+1}\}$ лінійно залежна, тобто $x_{n+1} = \sum_{j=1}^n c_j x_j$, то після дії оператора A отримаємо:

$$\sum_{j=1}^n c_j \lambda_{n+1} x_j = \lambda_{n+1} x_{n+1} \stackrel{\text{із одного боку}}{=} Ax_{n+1} \stackrel{\text{із іншого боку}}{=} \sum_{j=1}^n c_j \lambda_j x_j.$$

$$\sum_{j=1}^n (c_j \lambda_{n+1} - c_j \lambda_j) x_j = 0 \implies c_j \lambda_{n+1} - c_j \lambda_j = 0 \implies c_j = 0 \implies x_{n+1} = 0 \text{ (не наш випадок).}$$

Позначимо $E_n = \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}$, $n \geq 1$, тоді маємо вкладення $E_1 \subset E_2 \subset E_3 \subset \dots$. За лемою Ріса, існують вектори $y_j \in E_j \setminus E_{j-1}$, причому $\|y_j\| = 1$ та $\forall y \in E_{j-1} : \|y_j + y\| \geq \frac{1}{2}$. Аналогічними мірку-

ваннями (як у альтернативі Фредгольма), отримаємо $\|Ax_n - Ax_m\| \geq \frac{r}{2}$, тоді не можна відокремити

від $(Ax_n)_{n=1}^\infty$ збіжну підпослідовність — суперечність, бо $A \in \mathcal{K}(E)$!

Отже, 1) довели (TODO: додумати). Якщо $\dim E = \infty$, ■

5.6 Спектральний радіус оператора

5.6.1 Степеневі ряди з операторними коефіцієнтами

Definition 5.6.1 Маємо E — банахів та $(A_n)_{n=1}^\infty \subset \mathcal{B}(E)$, далі розглянемо **степеневий ряд з операторними коефіцієнтами**

$$\sum_{k=0}^{\infty} z^k A_k, \quad z \in \mathbb{C}$$

Цей ряд буде **збіжним в точці** $z_0 \in \mathbb{C}$, якщо послідовність часткових сум збігається за нормою в $\mathcal{B}(E)$.

Lemma 5.6.2 Нехай для деякого $z_0 \neq 0$ послідовність $(z_0^n A_n)_{n=1}^\infty$ — обмежена. Тоді при $|z| < |z_0|$ ряд $\sum_{k=0}^{\infty} z^k A_k$ — збіжний.

Proof.

Маємо нерівність $\left\| \sum_{k=n+1}^{n+p} z^k A_k \right\| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |z|^k \|A_k\|$. Значить, нам досить буде дослідити збіжність ряду $\sum_{n=0}^{\infty} |z|^n \|A_n\|$. Ми маємо $|z|^n \|A_n\| = \frac{|z|^n}{|z_0|^n} |z_0|^n \|A_n\| = q^n |z_0|^n \|A_n\| \leq c q^n$. Ряд $\sum_{n=0}^{\infty} c q^n$ збіжний як геометрична прогресія, бо $q < 1$, звідси за ознакою порівняння збіжним буде $\sum_{n=0}^{\infty} |z|^n \|A_n\|$. ■

Lemma 5.6.3 Заданий степеневий ряд $\sum_{k=0}^{\infty} z^k A_k$. Тоді радіус збіжності повністю збігається з радіусом збіжності числового степеневого ряду $\sum_{k=0}^{\infty} z^k \|A_k\|$.

Proof.

Дійсно, розглянемо степеневий ряд $\sum_{k=0}^{\infty} z^k \|A_k\|$. Його радіус збіжності r можна визначити за ознакою Коші-Адамара.

Припустимо, що $0 < r < +\infty$. Тоді ми вже отримували нерівність $\left\| \sum_{k=n+1}^{n+p} z^k A_k \right\| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} |z|^k \|A_k\|$.

Тоді якщо $|z| < r$, то отримаємо збіжність $\sum_{k=0}^{\infty} z^k A_k$.

Тепер припустимо, що $z_0 \in \mathbb{C}$ існує таке, що $|z_0| > r$ та при цьому в даній точці $\sum_{k=0}^{\infty} z_0^k A_k$ збіжний.

Тоді звідси випливатиме обмеженість $(z_0^n A_n)_{n=1}^\infty$, тому за попередньою лемою, збіжним буде ряд $\sum_{n=0}^{\infty} |z|^n \|A_n\|$ при $r < |z| < |z_0|$. При цьому r — радіус збіжності числового степеневого ряду — суцільна.

Якщо $r = 0$ чи $r = +\infty$, то все цілком зрозуміло з нерівності. ■

Lemma 5.6.4 Нехай $(\alpha_n)_{n=1}^\infty$ — послідовність невід'ємних чисел, що задовольняє умові $\alpha_{n+m} \leq \alpha_n \alpha_m$ для всіх $n, m \in \mathbb{N}$. Тоді $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\alpha_n} < \infty$.

Proof.

Спершу зауважимо, що $(\alpha_n^{\frac{1}{n}})_{n=1}^\infty$ — обмежена. Дійсно, це випливатиме безпосередньо з ланцюга $\alpha_n \leq \alpha_1 \alpha_{n-1} \leq \alpha_1^2 \alpha_{n-2} \leq \dots \leq \alpha_1^n$.

Зафіксуємо тепер $k \in \mathbb{N}$. Поділимо кожне n на k — отримаємо представлення $n = m_k k + l_n$ при остачі $0 \leq l_n < k$. Звідси випливатиме, що $\alpha_n \leq \alpha_k^{m_n} \alpha_{l_n}$ (при $l_n = 0$ може виникнути α_0 , але

покладемо $\alpha_0 = 1$). Отже, звідси $\alpha_n^{\frac{1}{n}} \leq \alpha_k^{\frac{m_n}{n}} \alpha_{l_n}^{\frac{1}{n}} = \beta_n$.

Оскільки $\left(\alpha_n^{\frac{1}{n}}\right)_{n=1}^{\infty}$ обмежена, то існує $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \alpha_n^{\frac{1}{n}} = \alpha$. Тобто можна відокремити підпослідовність

$\left(\alpha_{n_j}^{\frac{1}{n_j}}\right)_{j=1}^{\infty}$, для якої $\lim_{j \rightarrow \infty} \alpha_{n_j}^{\frac{1}{n_j}} = \alpha$. Дослідімо послідовність $(\beta_n)_{n=1}^{\infty}$.

$$\frac{m_{n_j}}{n_j} = \frac{m_{n_j}}{m_{n_j}k + l_{n_j}} = \frac{1}{k + \frac{l_{n_j}}{m_{n_j}}} \rightarrow \frac{1}{k} \text{ при } j \rightarrow \infty;$$

$$\alpha_{l_{n_j}}^{\frac{1}{n_j}} \rightarrow 1 \text{ (тут } \alpha_{l_{n_j}} \in \{\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{k-1}\}).$$

Отже, оскільки $\alpha_{n_j}^{\frac{1}{n_j}} \leq \beta_{n_j}$, то при $j \rightarrow \infty$ маємо $\alpha \leq \alpha_k^{\frac{1}{k}}, \forall k \in \mathbb{N}$, а тому відповідно $\alpha \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \alpha_k^{\frac{1}{k}}$,

коротше $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \alpha_n^{\frac{1}{n}} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n^{\frac{1}{n}}$. Єдина така можливість набуття нерівності — це коли послідовність

$\left(\alpha_n^{\frac{1}{n}}\right)_{n=1}^{\infty}$ збігається. ■

5.6.2 Спектральний радіус лінійного неперервного оператора

Definition 5.6.5 Маємо $A \in \mathcal{B}(E)$ та $\sigma(A)$ — спектр.

Спектральним радіусом оператора A назвемо число

$$\rho_A = \max_{z \in \sigma(A)} |z|$$

Theorem 5.6.6 Задано $A \in \mathcal{B}(E)$. Тоді $\rho_A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\|A^n\|}$.

Proof.

Розглянемо послідовність $(\alpha_n)_{n=1}^{\infty}$, де кожний $\alpha_n = \|A^n\|$. Зауважимо, що $\alpha_{n+m} = \|A^{n+m}\| \leq \|A^n\| \|A^m\| = \alpha_n \alpha_m$, а тому за лемою вище існує границя $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\|A^n\|}$. Залишилося довести, що саме ця границя буде спектральним радіусом оператора A .

Розглянемо резольвенту $R_z(A) = (A - zI)^{-1}$. Зауважимо, що $\sigma(A) \subset \overline{B(\rho_A, 0)}$ (TODO: ?), тож звідси R_z — аналітична поза межами $\overline{B(\rho_A, 0)}$. Але тоді функція $f(\zeta) = R_{\frac{1}{\zeta}}$ буде аналітичною всередині

шари $B\left(\frac{1}{\rho_A}, 0\right)$ (на межах є точки, де аналітичність порушується).

Представимо функцію f у вигляді степеневого ряду з операторними коефіцієнтами. При $|\zeta| \leq \|A^{-1}\|$ матимемо $f(\zeta) = (A - \zeta^{-1}I)^{-1} = -\zeta(I - \zeta A)^{-1} = -\zeta \sum_{n=0}^{\infty} \zeta^n A^n$ — це було все зроблено за

рахунок **Th. 3.3.4**. За другою лемою, радіусом збіжності в правій частині буде $\frac{1}{\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}} =$

$$\frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}}. \text{ Ба більше, функція } f(\zeta) \text{ аналітична всередині кола } B(\rho_A^{-1}, 0), \text{ тобто звідси } \rho_A^{-1} =$$

$$\frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}}. \quad \blacksquare$$

5.7 Спектральний розклад для компактних самоспряжених операторів

Lemma 5.7.1 Нехай A — самоспряжений оператор. Тоді $\|A^n\| = \|A\|^n$.

Proof.

Спочатку доведемо рівність при $n = 2$. У одну сторону все ясно, тобто $\|A^2\| \leq \|A\|^2$. Для іншої сторони матимемо наступне:

$$\|Ax\|^2 = (Ax, Ax) = (A^2x, x) \stackrel{\text{н-ть К-Б}}{\leq} \|A^2x\| \|x\|.$$

Взявши $\sup$ за векторами x , для яких $\|x\| = 1$, отримаємо $\|A\|^2 \leq \|A^2\|$.

Отже, отримали $\|A^2\| = \|A\|^2$, а внаслідок чого $\|A^{2^n}\| = \|A\|^{2^n}$ для всіх $n \in \mathbb{N}$.

Для кожного числа $m \in \mathbb{N}$ буде $m \leq 2^m$. Якщо припустити, що $\|A^m\| < \|A\|^m$, то отримаємо

$$\|A\|^{2^m} = \|A^{2^m}\| \leq \|A^m\| \|A^{2^m-m}\| < \|A\|^m \|A\|^{2^m-m}.$$

Така нерівність трошки суперечить, тому автоматично $\|A^m\| = \|A\|^m, \forall m \in \mathbb{N}$. ■

Remark 5.7.2 Зауважимо, що якщо $A \in \mathcal{K}(H)$ — самоспряжений, то $\rho_A = \|A\|$ (цілком ясно).

Theorem 5.7.3 Нехай $A \in \mathcal{K}(H)$ — самоспряжений. Тоді існує власне число λ , для якого $|\lambda| = \|A\|$.

Proof.

Дійсно, оскільки A — самоспряжений, то звідси $\|A^n\| = \|A\|^n$, але тоді звідси $\rho_A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\|A^n\|} = \|A\|$. ■

Нагадаю твердження, яке було в ліналі, яке копіюється в нашому випадку.

Lemma 5.7.4 Нехай A — самоспряжений, тоді:

- 1) Всі власні числа оператора — дійсні;
- 2) Власні вектори, що відповідають різним власним числам, ортогональні між собою.

Lemma 5.7.5 Нехай G — інваріантний для $A \in \mathcal{B}(H)$. Тоді $G^\perp$ — інваріантний для A^* .

Proof.

Дійсно, нехай $y \in G^\perp$, для кожного $x \in G$ маємо $Ax \in G$, внаслідок чого $(Ax, y) = 0$. Із іншого боку, $0 = (Ax, y) = (x, A^*y) \implies A^*y \perp x, \forall x$. Це означатиме, що $A^*y \in G^\perp$. ■

Theorem 5.7.6 Нехай $A \in \mathcal{K}(H)$ — самоспряжений. Тоді $H = \bigoplus_{\substack{\lambda_k \in \sigma(A) \\ \lambda_k \neq 0}} H_{\lambda_k} \oplus H_0$.

У цьому випадку H_{λ_k} — власний підпростір та H_0 — ядро оператора A .

Proof.

Уже знаємо, що існує λ_1 таке, що $|\lambda_1| = \|A\|$. Уже відомо ще давно, що власний підпростір H_{λ_1} — інваріантний відносно A , звідси $H_{\lambda_1}^\perp \stackrel{\text{позн.}}{=} H_1$ — інваріантний відносно A .

Розглянемо оператор $A_1 = A|_{H_1}$. Якщо раптом $A_1 = O$, то закінчили доведення. У протилежному випадку існує λ_2 таке, що $|\lambda_2| = \|A_1\|$. Причому зауважимо, що $|\lambda_2| = \|A_1\| \leq \|A\| = |\lambda_1|$, а також $\lambda_2 \neq \lambda_1$. Останнє якби було правдою, $\lambda_2 = \lambda_1$, то ми би мали вектор $x \in H_1$, для якого $Ax = \lambda_2 x = \lambda_1 x$, але тоді $x \in H_{\lambda_1}$, що неможливо. За лемою вище, власні підпростори $H_{\lambda_1}, H_{\lambda_2}$ ортогональні, тому покладемо $H_2 \stackrel{\text{позн.}}{=} (H_{\lambda_1} \oplus H_{\lambda_2})^\perp$, який досі залишається інваріантним.

Розглянемо оператор $A_2 = A|_{H_2}$. Якщо раптом $A_2 = O$, то закінчили доведення. Інакше

⋮

Покладемо $H' = \bigoplus_{\substack{\lambda_k \in \sigma(A) \\ \lambda_k \neq 0}} H_{\lambda_k}$, який інваріантний. Покладемо $H_0 = (H')^\perp$ — теж інваріантний. Тоді

звідси $H_0 = \ker A$.

!Якби це не так, то існував би вектор $x \in H_0 : Ax \neq 0$, тому $\|A|_{H_0}\| > 0$, внаслідок чого існувало би власне число $\lambda_0 \neq 0$, що суперечить! (бо ми всі перебрали вже). ■

6 Диференційовані відображення

Для спрощення ситуації всюди, де задається нормований простір, припускатимемо, що він — банахів.

6.1 Основні означення

Definition 6.1.1 Нехай E, F — простори, $U \subset E$ — відкрита підмножина.

Кажуть, що два відображення $f_1: U \rightarrow F$ та $f_2: U \rightarrow F$ **дотикаються одне одного в точці** $a \in U$, якщо функція

$$m(r) = \sup_{x \in B[a; r]} \|f_1(x) - f_2(x)\|,$$

яка визначена для всіх достатньо малих $r > 0$, задовольняє умову:

$$m(r) = o(r), \quad r \rightarrow 0 + 0.$$

Proposition 6.1.2 Умова дотикання двох відображень в точці задає відношення еквівалентності.
Вправа: довести.

Remark 6.1.3 Із означення випливає, що $f_1 - f_2$ — неперервна в точці a та дорівнює нулю.

Example 6.1.4 Нехай $g \in \mathcal{L}(E, F)$. Покладемо функцію $f(x) = g(x - a)$. Доведемо, що якщо f дотикається в точці a , то тоді $g \equiv 0$.

Спершу зауважимо, що має місце ланцюг рівностей:

$$m(r) = \sup_{x \in B[a; r]} \|f(x)\| = \sup_{x \in B[a; r]} \|g(x - a)\| = r \sup_{\frac{x-a}{r} \in B[0, 1]} \left\| g \left(\frac{x-a}{r} \right) \right\| = r \cdot \|g\|.$$

(оператор g не обов'язково обмежений, але формально це нормою позначив). Звідси випливає, що

$$\frac{m(r)}{r} = \|g\| \rightarrow 0, \quad r \rightarrow 0 + 0,$$

внаслідок чого $g \equiv 0$.

Definition 6.1.5 Відображення $f: U \rightarrow F$ **дотикається в точці** a , якщо

f та 0 (нулеве відображення) дотикаються в точці a .

Remark 6.1.6 Нехай f_1 та f_2 дотикаються в точці a . Тоді $f_1(a) = f_2(a)$. Зокрема якщо f_1 — неперервне в точці a , то f_2 — неперервна в точці a .

Definition 6.1.7 Нехай E, F — простори, $U \subset E$ — відкрита та $a \in U$.

Відображення $f: U \rightarrow F$ називається **диференційованою в точці** $a \in U$, якщо

- 1) f — неперервна в точці a ;
- 2) існує такий оператор $g \in \mathcal{L}(E, F)$, для якого відображення $x \mapsto f(x) - f(a)$ та $x \mapsto g(x - a)$ дотикаються в точці a .

Остання умова еквівалентним чином переписується ось так:

$$\|f(x) - f(a) - g(x - a)\| = o(\|x - a\|).$$

Наведу інше більш звичне означення диференційованості.

Definition 6.1.8 Нехай E, F — простори $U \subset E$ — відкрита та $a \in U$.

Відображення f називається **диференційованою в** $a \in U$, якщо існує єдине $g \in \mathcal{B}(E, F)$, для якого

$$\|f(x) - f(a) - g(x - a)\| = o(\|x - a\|), \quad x \rightarrow a.$$

Proposition 6.1.9 Нехай f — диференційована в точці a (в сенсі першого означення). Тоді $g \in \mathcal{B}(E, F)$, причому такий оператор єдиний.

Proof.

Досить довести, що g — неперервна в точці a . Дійсно,

$$\|g(x) - g(a)\| \leq \|f(x) - f(a)\| + \|-f(x) - f(a) + g(x - a)\| = \|f(x) - f(a)\| + o(\|x - a\|) \rightarrow 0, \quad x \rightarrow a.$$

Перша норма зникла в силу неперервності f .

Припустимо, що $f(x) - f(a)$ дотикається як і до $g(x - a)$, так і до $h(x - a)$ в точці a . Тоді за транзитивністю $g(x - a)$ дотикається до $h(x - a)$ в точці a , або $g(x - a) - h(x - a)$ дотикається в точці a . Однак за **Ех. 6.1.4**, оскільки $g - h \in \mathcal{L}(E, F)$, то тоді $g - h \equiv 0 \implies g = h$. ■

Proposition 6.1.10 Нехай f — диференційована в точці a (в сенсі другого означення). Тоді f — неперервна в точці a .

Proof.

Дійсно, маємо наступне:

$$\|f(x) - f(a)\| \leq \|f(x) - f(a) - g(x - a)\| + \|g(x - a)\| = o(\|x - a\|) + \|g(x - a)\| \rightarrow 0, \quad x \rightarrow a. \quad \blacksquare$$

Remark 6.1.11 Таким чином, із другого означення диференційованості випливає перше означення диференційованості.

Отже, ці два означення є еквівалентними. Регулярніше використаємо друге, а перше — то була певна мотивація.

Definition 6.1.12 Оператор $g \in \mathcal{B}(E, F)$ із означення диференційованої функції f в точці a будемо називати **похідною f в точці a** та позначати ось так:

$$g = f'(a).$$

Ще раз наголошу ось тут, $f'(a) \in \mathcal{B}(E, F)$. Часто це називають **похідною Фреше**.

Тоді означення диференційованої функції перепишеться ще звичніше:

$$\|f(x) - f(a) - f'(a)(x - a)\| = o(\|x - a\|), \quad x \rightarrow a.$$

Example 6.1.13 Нехай F — простір, $U \subset \mathbb{R}$ — відкрита та $f: U \rightarrow F$ — функція дійсного аргументу. Уже відомо, що $\mathcal{B}(\mathbb{R}, F) = F$ (канонічна ізометрія), тож диференційованість f в точці a еквівалентно існуванню $c \in F$, для якого

$$\|f(x) - f(a) - (x - a)c\| = o(\|x - a\|), \quad x \rightarrow a.$$

Або з цього випливатиме наступна рівність:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = c = f'(a).$$

Одержали стандартне означення похідної функції f в точці a .

Definition 6.1.14 Відображення $f: E \supset U \rightarrow F$ називається **диференційованою на U** , якщо

$$f \text{ — диференційована для всіх } a \in U.$$

Remark 6.1.15 Отже, кожному $a \in U$ відповідає похідна $f'(a)$, а тому маємо відображення

$$f': U \rightarrow \mathcal{B}(E, F),$$

яке називається **похідним відображенням** від $f: U \rightarrow F$.

Definition 6.1.16 Відображення f називається **неперервно-диференційованим** (тобто належить класу C^1), якщо

$$f \text{ — диференційована на } U \text{ та } f': U \rightarrow \mathcal{B}(E, F) \text{ — неперервне.}$$

Proposition 6.1.17 Нехай E, F — простори. Замінімо старі норми $\|\cdot\|$ еквівалентним чином на нові норми $\|\cdot\|_1$ в E та в F . Нехай f — диференційована в точці $a \in U$ відносно старої норми. Тоді f — диференційована в точці $a \in U$ відносно нової норми. Причому похідна від зміни норми не змінюється.

Proof.

Отже, станом на зараз відома лише границя відносно старої норми:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\|f(x) - f(a) - g(x - a)\|}{\|x - a\|} = 0.$$

Оскільки $\|\cdot\| \sim \|\cdot\|_1$ в просторі E , то справедлива нерівність

$$\frac{1}{\|x - a\|_1} \leq M \frac{1}{\|x - a\|}, \quad M > 0.$$

Оскільки $\|\cdot\| \sim \|\cdot\|_1$ в просторі F , то справедлива нерівність

$$\|f(x) - f(a) - g(x - a)\|_1 \leq M' \|f(x) - f(a) - g(x - a)\|.$$

Внаслідок чого маємо оцінку:

$$\frac{\|f(x) - f(a) - g(x - a)\|_1}{\|x - a\|_1} \leq MM' \frac{\|f(x) - f(a) - g(x - a)\|}{\|x - a\|} \rightarrow 0. \quad \blacksquare$$

6.2 Диференціювання складеної функції

Theorem 6.2.1 Нехай E, F, G — простори, $U \subset E$, $V \subset F$ — відкриті підмножини. Розглянемо неперервні відображення $f: U \rightarrow F$ та $g: V \rightarrow G$. Оберемо точки $a \in U$ та $b = f(a) \in V$ (тоді прообраз $U' = f^{-1}(V) \subset U$ буде відкритою та містити точку a). Припустимо, що f — диференційована в a та g — диференційована в b . Тоді $h = g \circ f$ — диференційована в a , причому

$$h'(a) = g'(b) \circ f'(a).$$

Proof.

Умова теореми дає нам такі рівності:

$$\begin{aligned} f(x) &= f(a) + f'(a)(x - a) + \varphi(x - a), \quad \|\varphi(x - a)\| = o(\|x - a\|); \\ g(y) &= g(b) + g'(b)(y - b) + \psi(y - b), \quad \|\psi(y - b)\| = o(\|y - b\|). \end{aligned}$$

Тепер розглянемо різницю $h(x) - h(a)$. Маємо наступне:

$$\begin{aligned} h(x) - h(a) &= g(f(x)) - g(f(a)) = g'(f(a))(f(x) - f(a)) + \psi(f(x) - f(a)) \\ &= g'(f(a))(f'(a)(x - a) + \varphi(x - a)) + \psi(f(x) - f(a)). \end{aligned}$$

Хочу довести, що

$$\|h(x) - h(a) - g'(f(a))f'(a)(x - a)\| = o(\|x - a\|), \quad x \rightarrow a.$$

Для цього буде досить довести, що виконуються

$$\begin{aligned} \|g'(f(a))\varphi(x - a)\| &= o(\|x - a\|), \quad x \rightarrow a; \\ \|\psi(f(x) - f(a))\| &= o(\|x - a\|), \quad x \rightarrow a. \end{aligned}$$

Перша рівність виконується, оскільки

$$\frac{\|g'(f(a))\varphi(x - a)\|}{\|x - a\|} \leq \frac{\|g'(f(a))\| \|\varphi(x - a)\|}{\|x - a\|} = \frac{\|g'(f(a))\| o(\|x - a\|)}{\|x - a\|} \rightarrow 0.$$

Друга рівність трохи складніше. Для початку зауважимо, що

$$\|f(x) - f(a)\| = \|f'(a)(x - a) + \varphi(x - a)\| \leq \|f'(a)(x - a)\| + o(\|x - a\|) \leq \|f'(a)\| \|x - a\| + o(\|x - a\|).$$

Тоді якщо $\|x - a\| \rightarrow 0$, то також $\|f(x) - f(a)\| \rightarrow 0$, але тоді

$$\frac{\|\psi(f(x) - f(a))\|}{\|x - a\|} = \frac{o(\|f(x) - f(a)\|)}{\|f(x) - f(a)\|} \cdot \frac{\|f(x) - f(a)\|}{\|x - a\|} = \frac{o(\|f(x) - f(a)\|)}{\|f(x) - f(a)\|} \left(\|f'(a)\| + \frac{o(\|x - a\|)}{\|x - a\|} \right) \rightarrow 0.$$

Разом довели диференційованість h . ■

6.3 Лінійність операції диференціювання

Proposition 6.3.1 Нехай $f, g: U \rightarrow F$, де U — відкрита підмножина E . Нехай f, g — диференційовані в точці a . Тоді

1) $f + g$ — диференційована в точці a , причому

$$(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a).$$

2) λf — диференційована в точці a при $\lambda \in \mathbb{R}$, причому

$$(\lambda f)'(a) = \lambda \cdot f'(a).$$

Вправа: довести.

Remark 6.3.2 $D_a(U, F)$ — множина всіх диференційованих відображень в точці a — задає підпростір простору всіх відображень $U \rightarrow F$, а оператор

$$V_a \rightarrow \mathcal{B}(E, F), \quad f \mapsto f'(a)$$

задає лінійне відображення.

Remark 6.3.3 Аналогічні міркування можна провести про $C_a^1(U, F)$ — множину всіх відображень класу C^1 в точці a , яке буде підпростором $D_a(U, F)$.

6.4 Похідні від деяких функцій

Proposition 6.4.1 Нехай $f: U \rightarrow F$ — статне відображення. Тоді $f'(x) = 0$ для всіх $x \in U$.

Вправа: довести.

Proposition 6.4.2 Нехай $g: U \rightarrow F$ буде звуженням деякого $f: E \rightarrow F$, причому $f \in \mathcal{B}(E, F)$. Тоді $g'(x) = f$ для всіх $x \in U$.

Тобто похідна від лінійної функції — стала.

Proposition 6.4.3 Нехай $f \in \mathcal{B}(E_1 \times E_2, F)$. Тоді f — диференційована в точці (a_1, a_2) , причому

$$f'(a_1, a_2)(h_1, h_2) = f(h_1, a_2) + f(a_1, h_2).$$

Proof.

Справді, маємо ось таку різницю:

$$f(a_1 + h_1, a_2 + h_2) - f(a_1, a_2) = f(h_1, a_2) + f(a_1, h_2) + f(h_1, h_2).$$

Все, що треба довести, так це $\|f(h_1, h_2)\| = o(\|(h_1, h_2)\|)$ при $(h_1, h_2) \rightarrow (0, 0)$. Ну дійсно,

$$\frac{\|f(h_1, h_2)\|}{\|(h_1, h_2)\|} \leq \frac{\|f\| \|h_1\| \|h_2\|}{\|(h_1, h_2)\|} \leq \frac{\|f\| (\|h_1\| + \|h_2\|)^2}{\|h_1\| + \|h_2\|} \rightarrow 0. \quad \blacksquare$$

Remark 6.4.4 Авжеж, це можна узагальнити для полілінійних відображень.

Перед одним результатом маю навести одну корисну теорему.

Theorem 6.4.5 Нехай E, F — (тут обов'язкові банахові) простори. Позначимо $\mathcal{B}_{\text{inv}}(E, F)$ за підмножину $\mathcal{B}(E, F)$ всіх оборотно-обмежених операторів. Тоді

1) $\mathcal{B}_{\text{inv}}(E, F)$ — відкрита в $\mathcal{B}(E, F)$;

2) Відображення $\varphi: \mathcal{B}_{\text{inv}}(E, F) \rightarrow \mathcal{B}(F, E)$, яке задається як $\varphi(u) = u^{-1}$, буде неперервним.

Proof.

Допускається, що $\mathcal{B}_{\text{inv}}(E, F) = \emptyset$, коли простори E, F неізоморфні, але тут все тривіально.

Нехай $u_0 \in \mathcal{B}_{\text{inv}}(E, F)$. Покажемо, що $B\left(u_0, \frac{1}{\|u_0^{-1}\|}\right) \subset \mathcal{B}_{\text{inv}}(E, F)$, тоді це доведе відкритість.

Нехай $u \in \mathcal{B}(E, F)$ таке, що $\|u - u_0\| < \frac{1}{\|u_0^{-1}\|}$. Тоді розглянемо ось такий оператор:

$$v = 1 - u_0^{-1}u = u_0^{-1}(u_0 - u).$$

Звідси випливає, що

$$\|v\| \leq \|u_0^{-1}\| \|u - u_0\| < 1,$$

а тому оператор $1 - v = u_0^{-1}u \in \mathcal{B}_{\text{inv}}(E, E)$ (тут банаховість E необхідна). Тоді $u \in \mathcal{B}_{\text{inv}}(E, F)$.

Тепер маємо наступне:

$$u^{-1} = (u_0(1 - v))^{-1} = (1 - v)^{-1}u_0^{-1} \implies u^{-1} - u_0^{-1} = ((1 - v)^{-1} - 1)u_0^{-1} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} v^n \right) u_0^{-1}.$$

Отже, тоді

$$\|u^{-1} - u_0^{-1}\| \leq \|u_0^{-1}\| \left\| \sum_{n=1}^{\infty} v^n \right\| \leq \|u_0^{-1}\| \frac{\|v\|}{1 - \|v\|}.$$

Нехай $u \rightarrow u_0$. Із нерівності $\|v\| \leq \|u_0^{-1}\| \|u - u_0\|$ випливає, що $\|v\| \rightarrow 0$, але тоді $u^{-1} \rightarrow u_0^{-1}$. ■

Тепер природне питання постає, чи можна буде продиференціювати функцію з тої теореми.

Theorem 6.4.6 Нехай E, F — простори. Тоді відображення $\varphi(u) = u^{-1}$ належить класу $C^1(\mathcal{B}_{\text{inv}}(E, F))$. Причому її похідна обчислюється за формулою:

$$\varphi'(u)h = -u^{-1} \circ h \circ u^{-1}, \quad h \in \mathcal{B}(E, F).$$

Proof.

I. φ — диференційоване.

Для початку зазначимо, що функція $u^{-1} \circ h \circ u^{-1} \in \mathcal{B}(F, E)$. Далі будемо доводити, що

$$\varphi(u + h) - \varphi(u) = -u^{-1} \circ h \circ u^{-1} + o(\|h\|), \quad h \rightarrow 0.$$

Дійсно, маємо наступне:

$$\varphi(u + h) - \varphi(u) = (u + h)^{-1} - u^{-1} = (u + h)^{-1} \circ (u - (u + h)) \circ u^{-1} = -(u + h)^{-1} \circ h \circ u^{-1}.$$

Тоді маємо таку різницю:

$$\varphi(u + h) - \varphi(u) - (-u^{-1} \circ h \circ u^{-1}) = (u + h)^{-1} \circ h \circ u^{-1} - (u + h)^{-1} \circ h \circ u^{-1} = (u^{-1} - (u + h)^{-1}) \circ h \circ u^{-1}.$$

Нарешті, оцінимо ось цей вираз:

$$\frac{\|(u^{-1} - (u + h)^{-1}) \circ h \circ u^{-1}\|}{\|h\|} \leq \frac{\|u^{-1} - (u + h)^{-1}\| \|u^{-1}\| \|h\|}{\|h\|} = \|\varphi(u) - \varphi(u + h)\| \|\varphi(u)\| \rightarrow 0, \quad h \rightarrow 0.$$

Тут дійсно все прямує до нуля, оскільки доводили, що φ — неперервне.

Довели, що φ — диференційована в кожній точці $u \in \mathcal{B}_{\text{inv}}(E, F)$.

II. φ' — неперервне.

Для відображень $u, v \in \mathcal{B}(F, E)$ розглянемо інше відображення $\psi(v, w): \mathcal{B}(E, F) \rightarrow \mathcal{B}(F, E)$, яке задається формулою:

$$\psi(v, w)h = -v \circ h \circ w.$$

Таким чином, установили білінійне відображення $\mathcal{B}(F, E) \times \mathcal{B}(F, E) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{B}(E, F), \mathcal{B}(F, E))$, яке працює як $(v, w) \mapsto \text{psi}(v, w)$. Ба більше, воно буде обмеженим. Маємо

$$\|\psi(v, w)h\| = \|v \circ h \circ w\| \leq \|v\| \|h\| \|w\|.$$

Оскільки це виконується для всіх h , то зокрема для таких, що $\|h\| = 1$, тому

$$\|\psi(v, w)\| \leq \|v\| \|w\|.$$

Тепер для чого ми пішли так далеко? Тому що насправді

$$\varphi'(u)h = -u^{-1} \circ h \circ u^{-1} = \psi(u^{-1}, u^{-1})h.$$

Отже, відображення $u \mapsto \varphi'(u)$ буде композицією неперервних відображень

$$u \mapsto (u^{-1}, u^{-1}) \mapsto \psi(u^{-1}, u^{-1}) = \varphi'(u).$$

Отже, φ' — неперервне як композиція. ■

Example 6.4.7 Розглянемо частинний випадок, коли $E = F = \mathbb{R}$. Беремо відображення $\varphi(u) = u^{-1}$, де $u \in \mathcal{B}_{\text{inv}}(E, F)$, яке можна ототожнити з ненульовим числом $u \in \mathbb{R}$. Тоді $\mathcal{B}_{\text{inv}}(E, F)$ можна ототожнити її з відкритою підмножиною $\mathbb{R}$, утворений елементами $u \neq 0$. За доведеною теоремою

$$\varphi'(u)h = -u^{-1} \circ h \circ u^{-1}.$$

Оператор $h \in \mathcal{B}(E, F)$ ототожнюється також з числом $h \in \mathbb{R}$. Тому можемо скоротити на дане число та одержати звичну формулу:

$$\varphi'(u) = -\frac{1}{u^2}.$$

Тобто щойно доведена теорема була певним узагальненням, як диференціювати обернені вирази.

6.5 Функції зі значеннями в добутку

Proposition 6.5.1 Нехай $F = F_1 \times \cdots \times F_k$. Розглянемо $f \in \mathcal{B}(U, F)$. Тоді f — диференційована в точці $a \in U \iff f_i = \pi_i \circ f$ — диференційовані в точці a , причому

$$f'(a) = \iota_1 \circ f'_1(a) + \cdots + \iota_k \circ f'_k(a).$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: f — диференційована. Також π_i буде диференційованою (*це неважко довести*), тому за композицією f_i — диференційована.

$\Leftarrow$ Дано: всі f_i — диференційовані. Тоді $f = \iota_1 \circ f_1 + \cdots + \iota_k \circ f_k$. Оскільки ι_j — диференційовані (*неважко довести*), то за композицією та лінійністю f — диференційована також, причому

$$f'(a) = \iota'_1(f_1(a)) \circ f'_1(a) + \cdots + \iota'_k(f_k(a)) \circ f'_k(a) = \iota_1 \circ f'_1(a) + \cdots + \iota_k \circ f'_k(a). \quad \blacksquare$$

Proposition 6.5.2 Нехай функції u, v — диференційовані в точці $a \in U$. Також нехай $f \in \mathcal{B}(E_1, E_2; F)$, визначимо відображення $w: U \rightarrow F$ за формулою:

$$w(x) = f(u(x), v(x)).$$

Тоді w — диференційована в точці $a \in U$, причому

$$w'(a)h = f(u'(a)h, v(a)) + f(u(a), v'(a)h), \quad h \in E.$$

Proof.

Відомо, що відображення $h \mapsto (u(x), v(x))$ тоді буде диференційованою в точці $a \in U$, а його похідна задається відображенням

$$h \mapsto (u'(a)h, v'(a)h).$$

Також відображення $f: E_1 \times E_2 \rightarrow F$ — диференційована всюди через обмеженість. Відображення ω є насправді композицією

$$U \xrightarrow{(u,v)} E_1 \times E_2 \xrightarrow{f} F.$$

Тоді w — також диференційована в точці a , а похідна тоді дорівнює

$$w'(a)h = f'(u(a), v(a)) \circ (u'(a)h, v'(a)h) = f'(u(a), v(a)) (u'(a)h, v'(a)h) = f(u'(a)h, v(a)) + f(u(a), v'(a)h). \quad \blacksquare$$

6.6 Функції з областю визначення як добуток

Нехай $E = E_1 \times \cdots \times E_n$ та U — відкрита підмножина E . Розглянемо відображення $f \in \mathcal{L}(U, F)$, а для кожного $a = (a_1, \dots, a_n) \in U$ розглянемо відображення $\lambda_i: E_i \rightarrow E$

$$\lambda_i(x_i) = (a_1, \dots, a_{i-1}, x_i, a_{i+1}, \dots, a_n).$$

Тоді композиція $f \circ \lambda_i$ визначена в $\lambda_i^{-1}(U) \subset E_i$, який містить $a_i \in E_i$. Цю композицію назовемо **частинним відображенням** в точці a .

Definition 6.6.1 Похідну від частинного відображення $f \circ \lambda_i$ в точці a назовемо **частинною похідною**.

Позначення: $f'_{x_i}(a)$ або $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$.

Proposition 6.6.2 Нехай f — диференційована в точці a . Тоді f має всі частинні похідні $f'_{x_i}(a_i)$, причому

$$f'(a)(h_1, \dots, h_n) = f'_{x_1}(a)h_1 + \dots + f'_{x_n}(a)h_n.$$

Proof.

Отже, маємо наступний переписаний вигляд λ_i :

$$\lambda_i(x_i) = a + \iota_i(x_i - a_i), \quad \lambda_i(a) = a.$$

Звідси одержимо, що

$$\lambda'_i(x_i) = \iota_i,$$

просто тому що беремо похідну від сталої a та від відображення $\iota_i \in \mathcal{B}(E_i, E)$.

Таким чином, $f \circ \lambda_i$ — диференційована в точці a_i як композиція, причому

$$f'_{x_i}(a) = (f \circ \lambda_i)'(a) = f'(a) \circ \iota_i.$$

Знаючи, що справедлива рівність

$$\iota_1 \circ \pi_1 + \dots + \iota_n \circ \pi_n = 1_F,$$

якщо підставити значення $f'(a)(h_1, \dots, h_n) \in F$, одержимо бажане. ■

Remark 6.6.3 Як було в матані, із існування $f'_{x_i}(a)$ ще не впливає диференційованість $f'(a)$.

Proposition 6.6.4 Нехай f — диференційована на U . Тоді

$$f \in C^1 \iff f'_{x_i} \text{ — неперервні відображення.}$$

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: $f \in C^1$. Зауважимо, що частинно-похідне відображення $f'_{x_i} : U \rightarrow \mathcal{B}(E_i, F)$ можна подати як композицію двох відображень

$$U \xrightarrow{f'} \mathcal{B}(E, F) \xrightarrow{A_i} \mathcal{B}(E_i, F).$$

Останнє відображення діє ось таким чином:

$$A_i(\varphi) = \varphi \circ \iota_i.$$

Відомо за умовою, що f' — неперервне. Також A_i — неперервне, оцінити норму нескладно. Отже, f'_{x_i} — неперервні як композиція.

$\Leftarrow$ Дано: f'_{x_i} — неперервні. Оскільки f — диференційована, то

$$f'(a) = (f'(a) \circ \iota_1) \circ \pi_1 + \dots + (f'(a) \circ \iota_n) \circ \pi_n.$$

Значить, f' можна подати як суму композицій двох відображень:

$$U \xrightarrow{f'_{x_i}} \mathcal{B}(E_i, F) \xrightarrow{B_i} \mathcal{B}(E, F).$$

Останнє відображення діє ось таким чином:

$$B_i(\varphi_i) = \varphi_i \circ \pi_i.$$

Відомо, що f'_{x_i} — неперервне, також B — неперервне (*ручками неважко*). Тоді сума неперервних дає неперервне відображення f' . ■

Back to лінійна алгебра

У рамках цього розділу будемо розглядати скінченновимірні простори L , тобто $\dim L < \infty$. Нам уже відомо, що $L \cong \mathbb{R}^n$, а в даному просторі задається норма $\|\vec{x}\| = \sqrt{|x_1|^2 + \dots + |x_n|^2}$.

Theorem 6.6.5 У кожному скінченновимірному просторі всі норми еквівалентні.

Proof.

Достатньо довести, що всі норми еквівалентні до $\|\cdot\|_2$.

Нехай $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_d\}$ — стандартний базис $\mathbb{R}^d$, тоді звідси $\vec{x} = \sum_{i=1}^d x_i \vec{e}_i$.

$$\left\| \sum_{i=1}^d x_i \vec{e}_i \right\| \leq \sum_{i=1}^d \|x_i \vec{e}_i\| = \sum_{i=1}^d |x_i| \|\vec{e}_i\| = \sqrt{\left(\sum_{i=1}^d |x_i| \|\vec{e}_i\| \right)^2} \stackrel{\text{К-Б}}{\leq} \sqrt{\sum_{i=1}^d \|e_i\|^2} \sqrt{\sum_{j=1}^d |x_j|^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^d \|e_i\|^2} \sqrt{\sum_{j=1}^{\infty} |x_j|^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^d \|e_i\|^2} \|\vec{x}\|_2 = M \|\vec{x}\|_2.$$

Зауважимо, що $M \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ та не залежить від $\vec{x}$. Отже, $\|\vec{x}\| \leq M \|\vec{x}\|_2$.

Розглянемо тепер S — одинична сфера на $(\mathbb{R}^d, \|\cdot\|_2)$. Відомо, що S — замкнена множина та обмежена. Тож за лемою Гейне-Бореля, S — компактна множина. Відомо, що відображення $\|\cdot\|: S \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ — неперервне відображення, тож вона досягає найменшого значення m для деякого $\vec{y} \in S$.

Припустимо $m = 0$, тоді звідси $\|\vec{y}\| = 0 \implies \vec{y} = \vec{0} \implies \vec{y} \notin S$ — неможливо. Отже, $m > 0$.

Значить, $\forall \vec{y} \in \mathbb{R}^d : \|\vec{y}\|_2 = 1 : \|\vec{y}\| \geq m$. Треба довести те саме для інших векторів.

Якщо $\vec{x} = \vec{0}$, то це виконано. Тому $\vec{x} \neq \vec{0}$. Покладемо вектор $\vec{y} = \frac{\vec{x}}{\|\vec{x}\|_2}$, причому $\|\vec{y}\|_2 = 1$. Із цього випливає, що $\|\vec{y}\| \geq m \implies m \|\vec{x}\|_2 \leq \|\vec{x}\|$.

Всі інші норми будуть еквівалентними в силу транзитивності. ■

Definition 6.6.6 Задано X, Y — нормовані простори.

Вони називаються **ізоморфними**, якщо існує бієктивний лінійний оператор $A: X \rightarrow Y$, для якого

$$\forall x \in X : \|Ax\|_Y = \|x\|_X$$

Водночас такий оператор A називають **ізоморфізмом**.

Позначення: $X \cong Y$