

## Бинарные отношения

Пусть  $A$  и  $B$  – два непустые множества.

**Бинарным отношением  $R$  между множествами  $A$  и  $B$**  называется всякое подмножество декартова произведения  $A \times B$ :

$$R \subset A \times B.$$

Тот факт, что  $(a, b) \in R$ , т. е. между элементами  $a \in A$  и  $b \in B$  существует отношение  $R$ , обозначается так:  $aRb$ .

## Бинарные отношения

Пример.

Рассмотрим множества

$$A = \{1, 2, 3\}, \quad B = \{1, 2, 3, 4, 5\}.$$

Декартово произведение  $A$  на  $B$  равно

$$A \times B = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5)\}.$$

Определим отношение  $R$  («больше») следующим образом:

$aRb$ , если  $a > b$ ,  $a \in A$  &  $b \in B$ .

$$R = \{(2, 1), (3, 1), (3, 2)\} \subset A \times B.$$

## Отношения на множестве

Если  $A = B$ , т. е.  $R \subset A^2$ , то говорят, что  $R$  есть отношение **на множестве  $A$** .

Примеры.

- отношения  $=$ ,  $<$ ,  $>$ ,  $\leq$ ,  $\geq$ ,  $\neq$ , определенные на множестве чисел (натуральных, целых, действительных);
- отношение «быть однокурсником» на множестве студентов направления «Прикладная информатика», обучающихся в ТюмГУ;
- отношение включения на множестве  $2^U$  ...

## Многоместные отношения

Обобщение бинарного отношения:

**$n$ -местное ( $n$ -арное) отношение  $R$**  – это подмножество декартова произведения множеств  $A_1, A_2, \dots, A_n$  (множество упорядоченных наборов – кортежей):

$$R \subset A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_1 \in A_1 \text{ \& } a_2 \in A_2 \text{ \& } \dots \text{ \& } a_n \in A_n\}.$$

## Дополнение отношения

Пусть  $R$  есть отношение между множествами  $A$  и  $B$ :  $R \subset A \times B$ .

**Дополнением отношения  $R$**  называется отношение  $\bar{R}$ , определяемое следующим образом:

$$\bar{R} \stackrel{\text{def}}{=} \{(a, b) \mid (a, b) \notin R\} \subset A \times B.$$

## Универсальное отношение

Пусть  $R$  есть отношение между множествами  $A$  и  $B$ :  $R \subset A \times B$ .

**Универсальное отношение  $U$**  содержит все пары  $(a, b)$ , принадлежащие декартову произведению  $A \times B$ :

$$U \stackrel{\text{def}}{=} \{(a, b) \mid a \in A \text{ \& } b \in B\} = A \times B.$$

## Композиция отношений

Пусть  $R_1 \subset A \times C$  – отношение между  $A$  и  $C$ ,  
 $R_2 \subset C \times B$  – отношение между  $C$  и  $B$ .

**Композицией двух отношений  $R_1$  и  $R_2$**   
 называется отношение  $R \subset A \times B$  между  $A$  и  $B$ ,  
 определяемое следующим образом:

$$R = R_1 \circ R_2 \stackrel{\text{def}}{=} \\ = \{(a, b) \mid a \in A \& b \in B \& \exists c \in C : aR_1c \& cR_2b\}.$$

Композиция отношений на множестве  $A$   
 является отношением на множестве  $A$ .

## Свойства композиции отношений:

1. Композиция отношений *ассоциативна*:

$$\forall R_1 \subset A \times B, R_2 \subset B \times C, R_3 \subset C \times D \\ (R_1 \circ R_2) \circ R_3 = R_1 \circ (R_2 \circ R_3).$$

2. Композиция отношений, в общем случае, не  
*коммутативна*:

$$R_1 \circ R_2 \neq R_2 \circ R_1.$$

Пример: отношения  $R_1$  – кровного родства и  
 $R_2$  – супружества на множестве людей.

$R_1 \circ R_2$  – супруги кровных родственников;

$R_2 \circ R_1$  – кровные родственники супругов.

## Представление отношений в компьютерных программах

Один из возможных способов – представление с  
 помощью булевых матриц.

Пусть  $R$  – отношение на множестве  $A$ :  $R \subset A^2$   
 и  $|A| = n$ . Перенумеруем элементы множества  
 $A$ :  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ .

Тогда отношение  $R$  можно представить булевой  
 матрицей  $R$ :

$$r_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если } a_i R a_j, \\ 0, & \text{если } a_i \bar{R} a_j. \end{cases}$$

### Примеры.

1. Пусть  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ,

$R$  – отношение «меньше либо равно» на  
 множестве  $A$ .

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 2), (2, 3), (2, 4), \\ (2, 5), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 4), (4, 5), (5, 5)\}.$$

Представление  
 булевой матрицей:

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

### Матрица отношения $\bar{R}$ .

Пусть отношение  $R \subset A^2$  имеет матрицу  $R$ .  
 Тогда отношение  $\bar{R}$  (дополнение отношения  $R$ )  
 имеет матрицу

$$\bar{R} = U - R,$$

т. е.

$$\bar{r}_{ij} = 1 - r_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$$

Разность  $S$  булевых матриц  $A$  и  $B$  определяется  
 правилом:

$$s_{ij} = a_{ij} \& (1 - b_{ij}), \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$$

## Рефлексивность

Пусть  $R \subset A^2$ .

Отношение  $R$  называется **рефлексивным**, если

$$\forall a \in A \quad aRa.$$

Матрица рефлексивного отношения содержит 1 на главной диагонали:

$$r_{ii} = 1, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

## 2.2.СВОЙСТА ОТНОШЕНИЙ

### Рефлексивность

Примеры.

- Отношения  $=, \leq, \geq$  на множестве чисел;
- отношение параллельности на множестве прямых;
- отношение «быть похожим» на множестве людей.

### Антирефлексивность

Отношение  $R$  называется **антирефлексивным**, если

$$\forall a \in A \quad \neg aRa.$$

Матрица антирефлексивного отношения содержит 0 на главной диагонали:

$$r_{ii} = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

### Симметричность

Отношение  $R$  называется **симметричным**, если  $\forall a, b \in A$  из  $aRb$  следует  $bRa$ .

Матрица симметричного отношения является симметричной:

$$r_{ji} = r_{ij}, \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$$

### Антисимметричность

Отношение  $R$  называется **антисимметричным**, если

$$\forall a, b \in A \text{ из } aRb \text{ \& } bRa \text{ следует } a=b.$$

Примеры.

- Отношения  $\leq, \geq$  на множестве чисел;
- отношение включения на множестве  $2^U$ .



## Антирефлексивность

### Примеры.

- › Отношения  $<, >, \neq$  на множестве чисел;
- › отношение перпендикулярности на множестве прямых.

## Полнота

Отношение  $R$  называется **полным**, если

$\forall a, b \in A$  имеет место

либо  $a=b$ , либо  $aRb$ , либо  $bRa$ .

### Примеры.

- › Отношения  $<, >, \leq, \geq$  на множестве чисел (целых, действительных);
- › отношение «быть старше» (по возрасту) на множестве людей.

## Замыкание отношения относительно свойства

Пусть  $R$  и  $R'$  – отношения на множестве  $A$ .

Отношение  $R'$  называется **замыканием**  $R$  относительно свойства  $C$ , если:

1.  $R'$  обладает свойством  $C$ :  $C(R')$ ;
2.  $R'$  является надмножеством  $R$ :  $R \subset R'$ ;
3.  $R'$  является наименьшим:

$$C(R'') \text{ \& } R \subset R'' \Rightarrow R' \subset R''.$$

В задачах обработки данных иногда требуется получить **транзитивное замыкание** (т. е. замыкание относительно свойства транзитивности) отношения  $R$ .

Одним из наиболее эффективных алгоритмов вычисления транзитивного замыкания отношения является **алгоритм Уоршалла**.

## Алгоритм Уоршалла

**Вход:**  $R$  – отношение, заданное на множестве  $A$ ,  $|A| = n$ , представленное булевой матрицей  $R$ ;

**выход:** транзитивное замыкание отношения  $R$ , представленное булевой матрицей  $T$ .