友邦人寿保险有限公司
上海市黄浦区中山东一路17号
友邦大厦3-8楼
邮编：200002
电话：021-53599988
AIA.COM.CN

保 险 合 同

保险合同编号： H122717572
被保险人姓名： 王硕
投保人姓名： 王硕
营销服务部： 朝阳第二/北京 北京

友邦人寿保险有限公司
保险合同专用章

友邦人寿保险有限公司

（此　页　空　白）

友邦人寿保险有限公司

〔以下简称本公司〕

保　　险　　单

Report Id : PIP001

保险合同编号: H122717572　　合同生效日:2025年11月19日（自当日24时开始）

被 保 险 人:　王硕　　合同成立日:2025年11月19日

保 险 品 种:　卓越海外特药医疗保险

被保险人年龄: 43　　性别: 女　　币种：人民币　　币值单位:元

投　保　人 : 王硕

保险合同及保险费

保险项目	基本保险金额	交费期间（付费年限）	生效日	保险期间	保险费
卓越海外特药医疗保险	4,000,000	1年	2025/11/19	1年	129.00

交费方式为年交，合计十二个月之保险费为：　129.00元

1、若保险合同中的保险条款仅定义“保险金额”，则以上“基本保险金额”栏中所显示的金额即为保险金额。

（此　页　空　白）

阅 读 指 引

本阅读指引帮助您（投保人，以下含义相同）理解保险合同主合同 《友邦卓越海外特药医疗保险》（以下简称本合同）的保险条款，保险合同的内容以保险条款为准。

您所拥有的重要权益

1. 被保险人享有本合同所提供的保险保障——— 第七条
2. 您享有解除合同的权利——— 第十四条

您应特别注意的事项

1. 发生责任免除情形之一的，本公司不承担保险责任——— 第八条、第九条
2. 请您特别注意本合同的保险期间与治疗期——— 第四条
3. 请您特别注意本合同的保障区域——— 第六条
4. 若发生保险事故，您应尽速通知本公司——— 第十条
5. 请您特别注意保险金申请的要求——— 第十一条
6. 您应当按时支付保险费——— 第十三条
7. 请您特别注意导致本合同效力终止的情况——— 第十五条
8. 您有如实告知的义务——— 第十六条
9. 保险条款对一些重要术语进行了解释，请您特别注意释义——— 第二十二条

保险合同中对于免除保险人责任等条款均作了特别提示，详见条款中加深显示的内容。保险条款是保险合同的重要内容，为充分保障您的权益，请仔细阅读本保险条款中的所有内容。

条款目录

第一条 合同构成
第二条 合同成立与生效
第三条 投保范围
第四条 保险期间与治疗期
第五条 保险金额
第六条 保障区域
第七条 保险责任
第八条 责任免除
第九条 其他免责条款
第十条 保险事故通知
第十一条 保险金申请
第十二条 保险金给付
第十三条 保险费的支付
第十四条 您解除合同的手续及风险
第十五条 合同终止
第十六条 明确说明与如实告知
第十七条 年龄错误的处理
第十八条 本公司合同解除权的限制
第十九条 合同内容变更
第二十条 联系方式变更
第二十一条 争议处理
第二十二条 释义

请扫描以查询验证条款

友邦卓越海外特药医疗保险

在本条款中，“您”指投保人，“我们”、“本公司”均指友邦人寿保险有限公司。

第一条　合同构成

《友邦卓越海外特药医疗保险》合同（以下简称本合同）由本保险条款、保险单或其他保险凭证、投保单、与本合同有关的投保文件、声明、批注、批单以及与本合同有关的其他书面材料共同构成。

第二条　合同成立与生效

您提出保险申请且我们同意承保，本合同成立，本合同成立日及生效日期在保险单上载明。保险费约定支付日以本合同生效日期计算。

第三条　投保范围

本合同的被保险人投保年龄为 0 周岁（释义一）（须出生满 7 日）至 65 周岁，若您在被保险人 66 周岁至 99 周岁期间投保本合同的，需要满足如下两种情形之一：

1. 您重新投保本产品，并在上一个保险期间届满后 60 日内交纳保险费；
2. 您已经投保我们指定产品，并经我们同意首次投保本产品。

第四条　保险期间与治疗期

一、保险期间

本合同是不保证续保产品，本合同保险期间为一年。

保险期间届满，您需要重新向我们申请投保本产品，并经我们同意，交纳保险费，获得新的保险合同。

若保险期间届满时，本产品已经停售，我们不再接受投保申请，但会向您提供转保建议。

二、治疗期

治疗期指被保险人自其在保险期间内首次提交《出国就医确认表》之日起的一段时间，若无特别约定，该期限为 2 年。在治疗期内，我们承担符合本合同约定的全球特药海外医疗费用保险金（第七条第二项）中约定的医疗费用、交通费用、住宿费用和遗体送返费用的保险责任。

若被保险人签署并提交《出国就医确认表》，在保险期间届满后，我们不再接受被保险人的投保申请。

第五条　保险金额

本合同的保险金额为人民币 400 万元，保险金额载于本合同的保险单上，本合同的保险金额不得变更。

第六条　保障区域

本合同的保障区域为除中华人民共和国（包括**中国大陆境内**（释义二）以及台湾、香港、澳门地区）以外的国家或地区。

第七条　保险责任

一、等待期

本合同生效日起 30 日内（含第 30 日）为本合同的等待期，我们对被保险人于上述期间确诊恶性肿瘤——重度（释义三）而导致的医疗费用不承担保险责任，且对在上述期间后因该疾病而导致的医疗费用，我们也不承担保险责任。

以下情形无等待期：

1. 您重新投保本产品，并在上一个保险期间届满后 60 日内交纳保险费；

2.您已经投保我们指定产品，并经我们同意首次投保本产品。

二、全球特药海外医疗费用保险金

在本合同保险期间内，若被保险人于等待期后被**中国大陆境内医院**（释义四）**专科医生**（释义五）首次确诊患有本合同定义的恶性肿瘤——重度，且该疾病所需用药符合本合同载明的《特定药品列表》及其对应适应症，并按照本合同“第十一条第一项全球特药海外医疗费用保险金理赔资格审核”的约定提交资格预评估及海外专家诊疗意见评估，在经我们理赔资格审核确认通过的前提下，我们对于在本合同约定的治疗期内被保险人经我们或指定的第三方服务供应商安排的、在**海外医院**（释义六）发生的符合《特定药品列表》中对应适应症的用药并接受针对该恶性肿瘤——重度的治疗所产生的**必须且合理**（释义七）的如下费用，依照下列约定在本合同的保险金额内按照100%的比例赔付。

被保险人未通过理赔资格审核的或未经我们或指定的第三方服务供应商安排的保障区域内就医，对于发生的任何费用我们均不承担保险责任。

我们承担的费用包括医疗费用、交通费用、住宿费用和遗体送返费用，具体如下：

1. 医疗费用

（1）床位费

指被保险人在海外医院住院期间发生的不超过标准单人间标准的费用。

标准单人间病房指每一病房设一张病床加独立卫生间的单人病房，若某一海外医院的病房拥有两种或两种以上符合本合同上述定义的病房，则应按其中价格最低的病房计算床位费。若被保险人住院的病房的级别高于标准单人间病房的级别，则床位费以标准单人间的收费标准为最高限额。

（2）陪床费

指被保险人住院期间由海外医院为其**陪同人员**（释义八）（限一名）提供床位产生的费用。

（3）膳食费

指根据医生（释义九）的医嘱，由海外医院专设为住院病人配餐的食堂配送膳食的费用，**不包括不在海外医院开具的医疗费用清单上的餐饮费用。**

（4）护理费

指被保险人在海外医院住院期间由该医院执业护士根据医嘱所示的护理等级提供医疗护理所发生的费用。

（5）重症监护病房费

指被保险人在海外医院住院期间在重症监护室接受治疗而产生的床位费。重症监护室指配有中心监护台、心电监护仪及其他监护抢救设施，相对封闭管理，符合重症监护病房（ICU）、冠心病重症监护病房（CCU）标准的单人或多人监护病房。

（6）药品费

指被保险人在海外医院接受治疗过程中，在保障区域使用的根据医生处方开具的药品费用。

（7）检查检验费

指被保险人在海外医院进行检查及检验所导致的医疗费用，包括拍片费、心电图费、B 超费、脑电图费、内窥镜费、造影费、病理穿刺费、肺功能仪费、分子生化检验费和血、尿、便常规检验费等。

（8）治疗费

指被保险人在海外医院接受治疗所导致的技术劳务费、医疗器械使用费以及消耗品的费用，具体以海外医院的费用项目划分为准。**本项责任不包含中医理疗（释义十）、物理治疗（释义十一）及其他特殊疗法（释义十二）费用。**

（9）海外转诊救护车费

指被保险人遵循医嘱且预先通过指定的第三方服务供应商批准使用的救护车在保障区域同一城市内进行转院或者运送时产生的费用。

（10）手术费

指被保险人在海外医院住院期间由医生在医院手术室内施行手术所收取的手术室费、手术材料费、术中用药费、麻醉费、手术监测费、手术设备使用费和手术操作费用的总和。

（11）门诊诊疗费

指被保险人在海外医院进行门诊治疗时，所发生的主诊医生或会诊医生的劳务费用，含挂号费、医生诊疗费或医事服务费。

（12）输血费

指被保险人在海外医院每次输血所实际发生的血浆费用、输血实施费用等。

（13）医学翻译费

指被保险人在海外医院就诊时与治疗相关的因医学翻译而产生的医学翻译费用。

（14）因治疗恶性肿瘤——重度而直接导致的急性危重并发症费用

指被保险人在海外医院因治疗恶性肿瘤——重度而直接导致的急性危重并发症的相关费用，且需同时满足以下两个条件：

1）被保险人遵医嘱需要立即在海外医院进行医疗处置；

2）治疗目的是使被保险人的身体状况满足归国行程所需。

不符合上述条件的治疗恶性肿瘤——重度导致的并发症费用或恶性肿瘤——重度本身的并发症治疗费用不在本合同保障范围内。

（15）骨髓移植(BMT)、外周血干细胞移植(PBSCT)捐赠者医疗费用

指骨髓或外周血干细胞捐赠者在被保险人接受骨髓移植(BMT)或外周血干细胞移植(PBSCT)过程中在海外医院发生的与骨髓移植或外周血干细胞移植直接相关的床位费、陪床费、膳食费、护理费、重症监护病房费、药品费、检查检验费、治疗费、手术费、门诊诊疗费、输血费、医学翻译费。

2. 交通费用

本项责任承担被保险人及一名陪同人员（如有），以治疗被保险人所罹患的符合本合同载明的《特定药品列表》对应的适应症的恶性肿瘤——重度为目的而前往保障区域所产生的，满足以下条件的交通费用，包括：

（1）从中国大陆境内常住地前往中国大陆境内指定机场或火车站的交通费用；

（2）从中国大陆境内指定机场或火车站前往治疗地的飞机、铁路的交通费用（飞机舱位以经济舱为限、铁路座位以二等座为限）；以及从治疗地指定机场或国际火车站到达治疗地指定酒店或医疗机构的交通费用；

（3）从保障区域治疗地指定酒店或指定医院到达治疗地指定机场或国际火车站的交通费用；

（4）从治疗地指定机场或国际火车站返回中国大陆境内指定机场或火车站的飞机、铁路的交通费用（飞机舱位以经济舱为限、铁路座位以二等座为限）；

（5）由中国大陆境内指定机场或火车站到达中国大陆境内常住地或医疗机构的交通费用。

未经我们认可的、由被保险人或其陪同人员自行做出的行程安排产生的费用或变更行程安排（包括出行日期或路线）而产生的相关费用，我们不予承担。

3. 住宿费用

本项责任承担被保险人及一名陪同人员（如有），因治疗被保险人所罹患的符合本合同载明的《特定药品列表》对应的适应症的恶性肿瘤——重度而在保障区域治疗城市所产生的，满足以下条件的住宿费用。

每一次治疗开始时间前一天至治疗结束时间后一天，在被保险人就诊的海外医院 10 公里以内的酒店产生的住宿费用（以 1 间标准不超过四星级酒店的双人标准间为限）。

住宿费用不包含除住宿费以外的酒店用餐、其他酒店费用以及因升级房间产生的费用。

未经我们认可的、由被保险人或其陪同人员自行做出的住宿安排产生的费用，或自行变更安排的酒店或安排的住宿日期而产生的相关费用，我们不予承担。

4. 遗体送返费用

若被保险人在海外医院因符合本合同载明的《特定药品列表》中对应的适应症的恶性肿瘤——重度而接受相关治疗过程中身故，我们承担将逝者遗体送返至中国大陆境内的费用，包括：

（1）进行国际遗体送返的殡葬公司提供的服务费用，包括在治疗地的防腐处理、当地火葬以及所有行政手续产生的费用；

（2）可容纳遗体的最小尺寸的灵柩或骨灰盒的费用；

（3）逝者遗体或骨灰从机场到达中国大陆境内指定地点的交通服务费用。

遗体送返费用不包括由于葬礼仪式或宗教仪式所产生的任何费用。

三、补偿原则

若被保险人已从其他途径（包括公费医疗、基本医疗保险、城乡居民大病保险、所有商业性费用补偿型医疗保险、其他政府机构或社会福利机构等）取得补偿，则我们所给付的各项补偿金最高不超过被保险人实际发生的以上各项费用扣除其所获补偿后的余额。

第八条 责任免除

因下列情形之一导致被保险人发生保险事故或造成费用支出的，我们不承担赔付全球特药海外医疗费用保险金的责任：

1. 既往症（释义十三）；

2. 投保人对被保险人的故意杀害、故意伤害；

3. 被保险人故意自杀或自伤、故意犯罪或者抗拒依法采取的刑事强制措施；

4.被保险人主动吸食或注射毒品（释义十四）；

5.核爆炸、核辐射与核污染、战争、军事冲突、恐怖袭击、暴乱或武装叛乱；

6.精神和行为障碍治疗（以世界卫生组织颁布的《疾病和有关健康问题的国际统计分类》第十次修订版（ICD-10）为准）；

7.遗传性疾病（释义十五）、先天性畸形、变形或染色体异常（释义十六）；

8.被保险人感染艾滋病病毒或患艾滋病（释义十七）期间的医疗费用；

9.姑息治疗（释义十八）、替代疗法（释义十九）、基因疗法（释义二十）、辅助疗法（如补钙、补充维生素等），再造手术、以及安全性和可靠性未经相关科学证明的诊断、治疗和外科手术所产生的任何费用；

10.预防性治疗、康复治疗（包括但不限于物理治疗、运动功能恢复、语言疗法等）或训练、休养或疗养、保健治疗、健康体检、医疗鉴定（释义二十一）、美容整形；

11.被保险人接受实验性治疗（未经科学或医学认可的医疗）；

12.各类耐用医疗设备及相关耗材（如助听器、呼吸机、血压计、体温计、雾化器、胰岛素泵、胰岛素笔、血糖仪、血糖试纸、听诊器、肿瘤电场治疗仪及电场贴片等）的购买、租赁、维修和置换费用；各类为生活提供便利和舒适的设备（如轮椅、拐杖等各类助行器械、自动床、电话托臂、床上多用桌等其他类似设备）的购买、租赁、维修和置换费用；各类矫治器械和防护医疗器械（如矫形鞋垫、足弓支撑器、步行靴、或其他矫治器材）的购买、租赁、维修和置换费用；假体、人造部件或器官；

13.被保险人未经医生建议自行进行的任何治疗，或未遵书面医嘱私自服用、涂用、注射药物；

14.未被治疗所在地政府监管机构批准或许可的治疗、药品或医疗器械；

15.未经执业药师配发或无医生处方的药品费用，滋补类中草药及其泡制的各类酒制剂涉及的药品费用；

16.除骨髓移植(BMT)、外周血干细胞移植(PBSCT)以外的器官移植所产生的相关费用；

17.被保险人在首次提交理赔申请之日(不含首次提交理赔申请当日)前 12 个月在中国大陆境内累计居住时间未超过 180 天的；若被保险人提交理赔申请时不满 1 周岁，被保险人在中国大陆境内累计居住时间少于自出生之日起至首次提交理赔申请之日（不含首次提交理赔申请当日）止累计日数的二分之一的。

第九条　其他免责条款

除本条款“第八条　责任免除”外，本合同中还有一些免除我们责任的条款，详见以下条款中加大加粗显示的内容：“第七条　保险责任”、“第十条　保险事故通知”、“第十一条　保险金申请”、“第十六条　明确说明与如实告知”、“第十七条　年龄错误的处理”和“第二十二条　释义”。

第十条　保险事故通知

您或被保险人知道保险事故发生后应当在 10 日内通知我们。

如果您或被保险人故意或者因重大过失未及时通知，致使保险事故的性质、原因、损失程度等难以确定的，我们对无法确定的部分不承担保险责任，但我们通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生或者虽未及时通知但不影响我们确定保险事故的性质、原因、损失程度的除外。

第十一条　保险金申请

在申请全球特药海外医疗费用保险金时，请按照下列方式办理：

一、理赔资格审核

1.资格预评估

被保险人向我们提交全球特药海外医疗费用保险金理赔资格审核，并提供下列证明和材料：

（1）保险合同；

（2）被保险人的有效身份证件；

（3）由中国大陆境内医院专科医生出具的被保险人的疾病诊断证明书，以及由中国大陆境内医院出具的与该疾病诊断相关的住院病历、门急诊病历、病理检查报告、血液检查报告、基因检测报告、影像学报告及其他科学方法检验报告等诊断证明文件；

（4）能证明被保险人在首次提交理赔申请日（不含首次提交理赔申请当日）前 12 个月内在中国大陆境内居住情况的材料（如：护照或出入境记录等）；若被保险人首次提交理赔申请时不满 1 周岁，则需提供能证明被保险人在中国大陆境内累

计居住时间不少于自出生之日起至首次提交理赔申请之日（不含首次提交理赔申请当日）止累计日数的二分之一的材料（如：护照或出入境记录等）；

（5）与确认保险事故的性质、原因等有关的其他证明和资料。

我们会根据被保险人提供的理赔资料进行资格预评估，**如果被保险人未提交资格预评估审核或者资格预评估未通过，我们不承担赔付相关保险金的责任。**

2.海外专家诊疗意见评估

资格预评估通过后，我们会进一步收集被保险人最新病历资料，并在收集和详细审阅被保险人提供的医学材料的基础上，安排与被保险人所患疾病相关的海外医疗专家出具海外**专家诊疗意见评估**（释义二十二），以确认被保险人是否符合本合同约定的恶性肿瘤——重度，以及是否需要使用本合同载明的《特定药品列表》中约定的特定药品进行相关治疗。

如果经海外医疗专家评估，被保险人所患恶性肿瘤——重度并非本合同载明的《特定药品列表》中所对应的适应症，或被保险人不适合使用本合同载明的《特定药品列表》中的任何一种药品进行治疗，即用药资格审核未通过，我们不承担赔付相关保险金的责任。

针对本合同载明的《特定药品列表》中约定的同一种恶性肿瘤——重度类型，我们仅为被保险人安排一次海外专家诊疗意见评估。

3.出具理赔资格审核结论

我们将根据被保险人提供的理赔申请材料和海外专家诊疗意见评估审核被保险人的理赔资格，并出具理赔资格审核结论给到被保险人。

如果被保险人理赔资格审核未通过，我们不承担赔付保险金的责任且不提供就医安排服务。

二、海外医院选择及《治疗方案授权书》签署

当被保险人理赔资格审核通过且提交海外就医书面申请后，我们将为被保险人推荐 3 所海外医院，被保险人在推荐的 3 所海外医院中选定 1 所接受治疗，并就所选海外医院以及就医计划等内容与我们达成一致，并签署《出国就医确认表》及**《治疗方案授权书》**（释义二十三）等相关文件。

三、就医安排

就医安排仅对《治疗方案授权书》中约定的海外医院有效。由于被保险人的健康状况可能发生变化，推荐海外医院名单和《治疗方案授权书》的有效期为 3 个月。在推荐的海外医院名单提供之后的 3 个月内，被保险人未选择推荐的海外医院，或在《治疗方案授权书》给出的 3 个月内，被保险人未在推荐的海外医院进行治疗的，我们将根据被保险人最新的健康状况重新提供推荐海外医院名单和《治疗方案授权书》。

被保险人在保障区域的海外医院首次治疗结束回国后，如根据海外主治医生的医嘱仍需再次前往海外医院针对其首次在海外医院治疗的同一种恶性肿瘤——重度进行持续治疗，或被保险人再次申请出国就医时仍有与该种类型恶性肿瘤——重度直接相关的阳性医学检查结果和临床疾病体征，我们会在确认上述情况后直接安排被保险人出国进行相关恶性肿瘤——重度的治疗。

第十二条　保险金给付

对于全球特药海外医疗费用保险金，我们会通过指定的第三方服务供应商与提供医疗服务的保障区域的海外医院以及提供交通服务、住宿服务和遗体送返服务的相关机构进行结算，我们不再赔付保险金。

如果发生的本合同保险责任范围内的费用的币种和我们应赔付的币种不同，我们将按费用支出日的中国人民银行公布的汇率中间价换算成应赔付的币种后，计算保险金。

第十三条　保险费的支付

您可选择以我们同意的方式支付保险费。第一期以后的保险费应在保险费约定支付日或以前由您自行支付，并根据本合同投保单或批注上所载的交费方式计算。

在本合同保险期间内，若您选择分期支付保险费，如果您到期未支付保险费，自保险费约定支付日的次日零时起 60 日内发生的保险事故，我们仍会承担保险责任，但在给付保险金时会扣减您应付而未付的保险费。如果您自保险费约定支付日的次日零时起 60 日时仍未支付保险费，我们不再承担保险责任，本合同终止。

第十四条　您解除合同的手续及风险

本合同成立后，您可以解除本合同，请填写解除合同通知书并向我们提供下列证明和资料：

1. 保险合同；

2. 您的有效身份证件。

自我们收到解除合同通知书时起，本合同终止。我们自收到解除合同通知书之日起 30 日内向您退还本合同的**未满期净保险费**（释义二十四）（释义二十五），且退费金额不超过您实际支付的保险费金额。

第十五条　合同终止

当发生下列情况之一时，本合同终止：

1. 在保险期间内解除本合同的；

2. 本合同保险期间届满的；

3. 被保险人身故的；

4. 本合同约定的其他终止事项。

第十六条　明确说明与如实告知

订立本合同时，我们应向您说明本合同的内容。对保险条款中免除我们责任的条款，我们在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起您注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明，未作提示或者明确说明的，该条款不成为合同的内容。

订立本合同时，我们就您和被保险人的有关情况提出询问，您应当如实告知。

如果您故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务，足以影响我们决定是否同意承保或者提高保险费率的，我们有权解除本合同。

如果您故意不履行如实告知义务，对于本合同解除前发生的保险事故，我们不承担给付保险金的责任，并不退还保险费。

如果您因重大过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响的，对于本合同解除前发生的保险事故，我们不承担给付保险金的责任，但会向您退还保险费。

第十七条　年龄错误的处理

您在申请投保时，应将与有效身份证件相符的被保险人的出生日期在投保单上填明，如果发生错误按照下列方式办理：

1. 您申报的被保险人年龄不真实，并且其真实年龄不符合本合同约定投保年龄限制的，我们有权解除合同，并向您退还本合同的未满期净保险费。对于本合同解除前发生的保险事故，我们不承担保险责任；

2. 您申报的被保险人年龄不真实，致使您实付保险费少于应付保险费的，我们有权更正并要求您补交保险费。如果已经发生保险事故，在给付保险金时按实付保险费和应付保险费的比例给付；

3. 您申报的被保险人年龄不真实，致使您实付保险费多于应付保险费的，我们向您退还多收的保险费。

第十八条　本公司合同解除权的限制

本条款第十六、十七条规定的合同解除权，自我们知道有解除事由之日起，超过 30 日不行使而消灭。

我们在合同订立时已经知道您未如实告知的情况的，我们不得解除合同；发生保险事故的，我们应当承担保险责任。

第十九条　合同内容变更

经您与我们协商一致，可以变更本合同的有关内容。变更本合同的，应当由我们在保险合同上批注或者附贴批单，或者由您与我们订立书面的变更协议。

第二十条　联系方式变更

为了保障您的合法权益，您的住所、通讯地址、电话或电子邮件等联系方式变更时，请及时以书面形式或双方认可的其他形式通知我们。若您未以书面形式或双方认可的其他形式通知我们，我们按本合同载明的最后联系方式所发送的有关通知，均视为已送达给您。

第二十一条　争议处理

本合同争议的解决方式，由当事人在保险合同中约定从下列两种方式中选择一种：

1. 因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，由双方达成仲裁协议通过仲裁解决；

2. 因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院提起诉讼。

第二十二条　释义

释义一.周岁：指按有效身份证件中记载的出生日期计算的年龄，自出生之日起为 0 周岁，每经过一年增加一岁，不足一年的不计。

释义二.中国大陆境内：指中国大陆地区，不含台湾、香港、澳门地区。

释义三.恶性肿瘤——重度

指恶性细胞不受控制的进行性增长和扩散，浸润和破坏周围正常组织，可以经血管、淋巴管和体腔扩散转移到身体其他部位，病灶经**组织病理学检查**（释义二十六）（涵盖骨髓病理学检查）结果明确诊断，临床诊断属于世界卫生组织（WHO，World Health Organization）《疾病和有关健康问题的国际统计分类》第十次修订版（ICD-10）（释义二十七）的恶性肿瘤类别及《国际疾病分类肿瘤学专辑》第三版（ICD-O-3）（释义二十七）的肿瘤形态学编码属于 3、6、9（恶性肿瘤）范畴的疾病。

下列疾病不属于“恶性肿瘤——重度”，不在本合同“恶性肿瘤——重度”定义范围内：

（1）ICD-O-3 肿瘤形态学编码属于 0（良性肿瘤）、1（动态未定性肿瘤）、2（原位癌和非侵袭性癌）范畴的疾病，如：

a.原位癌，癌前病变，非浸润性癌，非侵袭性癌，肿瘤细胞未侵犯基底层，上皮内瘤变，细胞不典型性增生等；

b.交界性肿瘤，交界恶性肿瘤，肿瘤低度恶性潜能，潜在低度恶性肿瘤等；

（2）TNM 分期（释义二十八）为Ⅰ期或更轻分期的甲状腺癌（释义二十九）；

（3）TNM 分期为 $T_1N_0M_0$ 期或更轻分期的前列腺癌；

（4）黑色素瘤以外的未发生淋巴结和远处转移的皮肤恶性肿瘤；

（5）相当于 Binet 分期方案 A 期程度的慢性淋巴细胞白血病；

（6）相当于 Ann Arbor 分期方案Ⅰ期程度的何杰金氏病；

（7）未发生淋巴结和远处转移且 WHO 分级为 G1 级别（核分裂像<10/50 HPF 和 ki-67≤2%）或更轻分级的神经内分泌肿瘤。

释义四.中国大陆境内医院：指在中国大陆境内具有系统性诊疗等程序或手术设备，且具有基本医疗保险定点资格并经国家卫生行政部门认定的二级或以上医院，**但前述医院并不包括观察室、联合病房和康复病房。**

释义五.专科医生：

专科医生应当同时满足以下四项资格条件：

（1）具有有效的中华人民共和国《医师资格证书》；

（2）具有有效的中华人民共和国《医师执业证书》，并按期到相关部门登记注册；

（3）具有有效的中华人民共和国主治医师或主治医师以上职称的《医师职称证书》；

（4）在国家《医院分级管理标准》二级或二级以上医院的相应科室从事临床工作三年以上。

释义六.海外医院：指保障区域内符合下列条件并在当地合法注册具备有效行医资质的医院及诊所：

符合下列所有条件的医院：

（1）必须具有符合所在国有关医院管理规则设置标准的医疗设备；

（2）以直接诊治病人为目的；

（3）有所在地区合法注册的医生和护士常驻执业，并提供全日 24 小时的医疗和护理服务。

符合下列所有条件的诊所：

（1）拥有所在国家的合法经营执照；

（2）拥有完备的诊疗设施；

（3）在正常营业时间内有合格的医生和护士队伍管理指导。

上述医院及诊所均不包括精神病院及专供康复、休养、戒毒、戒酒、护理、养老等非以直接诊治病人为目的的医疗机构。

释义七.必须且合理：指同时满足下列要求，

（1）治疗所必须的项目；

（2）不超过安全、足量治疗原则的项目；

（3）非试验性、非研究性的项目；

（4）与接受治疗当地普遍接受的医疗专业实践标准一致的项目。

对是否必须且合理由我们根据客观、审慎、合理的原则进行核定，若被保险人对核定结果有不同意见，可委托双方认可的权威医学机构或者权威医学专家进行审核鉴定。

释义八.陪同人员：指被保险人认可的，在被保险人在保障区域接受治疗的过程中陪伴在被保险人身边的人员。若被保险人为未成年人，陪同人员必须是被保险人的父母或监护人。

释义九.医生：指在所在国或地区合法注册的具有医师执业资格和诊断处方权且正在执业的医师。

释义十.中医理疗：指以治疗疾病为目的，被保险人接受由具有相应资格的医生实施的针灸治疗、推拿治疗、拔罐治疗或刮痧治疗等。

释义十一.物理治疗：指由具有相应资质的专业医生实施的、应用人工物理因子（如光、电、磁、声、温热、寒冷、力等）来治疗疾病。包括但不限于激光治疗、热脉动治疗、脉冲治疗、电刺激治疗、超声波、微波、红外线治疗、光疗、电疗、磁疗、按摩、推拿、捏脊、正骨、整骨、整脊、正脊、手法治疗、艾灸、拔罐、刮痧、冷热湿敷、穴位治疗、放血治疗、熏蒸治疗、穴位贴敷、经络治疗、水疗等。

释义十二.其他特殊疗法：包括顺势治疗、职业疗法及语音治疗。顺势治疗指一种通过小剂量药物治疗以使病人症状逐渐缓解或解除的治疗方法，比如对于腹泻的顺势治疗是给予小剂量的放松剂。

释义十三.既往症：指在保单生效之前被保险人已患有的且已知晓的有关疾病或症状。

释义十四.毒品：指中华人民共和国刑法规定的鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品，但不包括由医生开具并遵医嘱使用的用于治疗疾病但含有毒品成分的处方药品。

释义十五.遗传性疾病：指生殖细胞或受精卵的遗传物质（染色体和基因）发生突变或畸变所引起的疾病，通常具有由亲代传至后代的垂直传递的特征。

释义十六.先天性畸形、变形或染色体异常：指被保险人出生时就具有的畸形、变形或染色体异常。先天性畸形、变形和染色体异常依照世界卫生组织《疾病和有关健康问题的国际统计分类》第十次修订版（ICD-10）确定。

释义十七.感染艾滋病病毒或患艾滋病：艾滋病病毒指人类免疫缺陷病毒，英文缩写为HIV。艾滋病指人类免疫缺陷病毒引起的获得性免疫缺陷综合征，英文缩写为AIDS。在人体血液或其他样本中检测到艾滋病病毒或其抗体呈阳性，没有出现临床症状或体征的，为感染艾滋病病毒；如果同时出现了明显临床症状或体征的，为患艾滋病。

释义十八.姑息治疗：是指为无法治愈的患者（如晚期癌症、慢性疾病等）提供的以减轻痛苦、提高生活质量为主要目标的医疗护理。这种治疗并不以治愈疾病为目的，而是专注于缓解症状和改善患者的身体、心理和精神上的舒适度。它通常包括止痛、控制其他症状（如呼吸困难、恶心等），并为患者及其家属提供心理支持。

释义十九.替代疗法：目前传统医学或标准治疗之外的医疗卫生保健疗法和产品，包括但不限于针灸、芳香疗法、整脊疗法、顺势疗法、自然疗法和整骨疗法等。

释义二十.基因疗法：指通过各种手段修复缺陷基因，以减缓或治愈疾病的技术。

释义二十一.医疗鉴定：指各类医疗鉴定，包括但不限于医疗事故鉴定、精神疾病鉴定、孕妇胎儿性别鉴定、验伤鉴定、亲子鉴定、遗传基因鉴定等。

释义二十二.专家诊疗意见评估：指基于对被保险人医疗信息及基因检测报告等相关诊断资料的深度研究，由医疗专家提供的独立诊疗意见评估。

释义二十三.《治疗方案授权书》：指被保险人在保障区域接受与保险责任相关的检查、化验、治疗、用药和其他医疗服务之前，由指定的第三方服务供应商出具的包含指定医疗机构名称、保险人承担的治疗项目以及治疗开始时间等相关信息的书面文件。

释义二十四.净保险费：指不包含公司营业费用、佣金等其他费用的保险费。

释义二十五.未满期净保险费：其计算公式为“未满期净保险费=当期保险费×（1－35%）×（1－该保险费所保障的已经过日数÷该保险费所保障的日数）”，其中经过日数不足一日的按一日计算。

释义二十六.组织病理学检查

组织病理学检查是通过局部切除、钳取、穿刺等手术方法，从患者机体采取病变组织块，经过包埋、切片后，进行病理检查的方法。

通过采集病变部位脱落细胞、细针吸取病变部位细胞、体腔积液分离病变细胞等方式获取病变细胞，制成涂片，进行病理检查的方法，属于细胞病理学检查，不属于组织病理学检查。

释义二十七.ICD-10 与ICD-O-3：《疾病和有关健康问题的国际统计分类》第十次修订版（ICD-10），是世界卫生组织（WHO）发布的国际通用的疾病分类方法。《国际疾病分类肿瘤学专辑》第三版（ICD-O-3），是WHO发布的针对ICD中肿瘤形态学组织学细胞类型、动态、分化程度的补充编码。其中形态学编码：0代表良性肿瘤；1代表动态未定性肿瘤；2代表原位癌和非侵袭性癌；3代表恶性肿瘤（原发性）；6代表恶性肿瘤（转移性）；9代表恶性肿瘤（原发性或转移性未肯定）。如果出现ICD-10与ICD-O-3不一致的情况，以ICD-O-3为准。

释义二十八.TNM分期：TNM分期采用AJCC癌症分期手册标准。该标准由美国癌症联合委员会与国际抗癌联合会TNM委员会联合制定，是目前肿瘤医学分期的国际通用标准。T指原发肿瘤的大小、形态等；N指淋巴结的转移情况；M指有无其他脏器的转移情况。

释义二十九.甲状腺癌的TNM分期

甲状腺癌的 TNM 分期采用目前现行的 AJCC 第八版定义标准，我国国家卫生健康委员会2018年发布的《甲状腺癌诊疗规范（2018年版）》也采用此定义标准，具体见下：

甲状腺乳头状癌、滤泡癌、低分化癌、Hürthle细胞癌和未分化癌

pT_X：原发肿瘤不能评估

pT_0：无肿瘤证据

pT_1：肿瘤局限在甲状腺内，最大径≤2cm

T_{1a}肿瘤最大径≤1cm

T_{1b}肿瘤最大径＞1cm，≤2cm

pT_2：肿瘤2～4cm

pT_3：肿瘤>4cm，局限于甲状腺内或大体侵犯甲状腺外带状肌

pT_{3a}：肿瘤>4cm，局限于甲状腺内

pT_{3b}：大体侵犯甲状腺外带状肌，无论肿瘤大小

带状肌包括：胸骨舌骨肌、胸骨甲状肌、甲状舌骨肌、肩胛舌骨肌

pT_4：大体侵犯甲状腺外带状肌外

pT_{4a}：侵犯喉、气管、食管、喉反神经及皮下软组织

pT_{4b}：侵犯椎前筋膜，或包裹颈动脉、纵隔血管

甲状腺髓样癌

pT_X：原发肿瘤不能评估

pT_0：无肿瘤证据

pT_1：肿瘤局限在甲状腺内，最大径≤2cm

T_{1a}肿瘤最大径≤1cm

T_{1b}肿瘤最大径＞1cm，≤2cm

pT_2：肿瘤2～4cm

pT_3：肿瘤>4cm，局限于甲状腺内或大体侵犯甲状腺外带状肌

pT_{3a}：肿瘤>4cm，局限于甲状腺内

pT_{3b}：大体侵犯甲状腺外带状肌，无论肿瘤大小

带状肌包括：胸骨舌骨肌、胸骨甲状肌、甲状舌骨肌、肩胛舌骨肌

pT_4：进展期病变

pT_{4a}：中度进展，任何大小的肿瘤，侵犯甲状腺外颈部周围器官和软组织，如喉、气管、食管、喉反神经及皮下软组织

pT_{4b}：重度进展，任何大小的肿瘤，侵犯椎前筋膜，或包裹颈动脉、纵隔血管

区域淋巴结：适用于所有甲状腺癌

pN_x：区域淋巴结无法评估

pN_0：无淋巴结转移证据

pN_1：区域淋巴结转移

pN_{1a}：转移至Ⅵ、Ⅶ区（包括气管旁、气管前、喉前/Delphian或上纵隔）淋巴结，可以为单侧或双侧。

pN_{1b}：单侧、双侧或对侧颈淋巴结转移（包括Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ或Ⅴ区）淋巴结或咽后淋巴结转移。

远处转移：适用于所有甲状腺癌

M_0：无远处转移

M_1：有远处转移

乳头状或滤泡状癌（分化型）			
年龄＜55岁			
	T	N	M
Ⅰ期	任何	任何	0
Ⅱ期	任何	任何	1
年龄≥55岁			
Ⅰ期	1	0/x	0
	2	0/x	0
Ⅱ期	1～2	1	0
	3a～3b	任何	0

Ⅲ期	4a	任何	0
ⅣA 期	4b	任何	0
ⅣB 期	任何	任何	1
髓样癌（所有年龄组）			
Ⅰ期	1	0	0
Ⅱ期	2～3	0	0
Ⅲ期	1～3	1a	0
ⅣA 期	4a	任何	0
	1～3	1b	0
ⅣB 期	4b	任何	0
ⅣC 期	任何	任何	1
未分化癌（所有年龄组）			
ⅣA 期	1～3a	0/x	0
ⅣB 期	1～3a	1	0
	3b～4	任何	0
ⅣC 期	任何	任何	1

注：以上表格中“年龄”指患者病理组织标本获取日期时的年龄。

（此页内容结束）

（此　页　空　白）

友邦(附加)卓越海外特药医疗保险-特定药品列表

2024年11月（V1.0版）

说明：

本列表所含药品，须严格按照治疗地的医疗或药品监督管理机构（释义一）批准的适应症凭治疗地执业医师的处方使用。

释义一 医疗或药品监督管理机构：指所在国或地区负责监管药品、医疗器械、食品安全以及相关公共卫生事项的行政机构，各国有不同的监督管理机构。例如：美国食品药品监督管理局（FDA: Food and Drug Administration）欧洲药品管理局（EMA: European Medicines Agency）；日本医药品医疗器械管理局（PMDA: Pharmaceuticals and Medical Devices Agency）等。

序号	通用名/商品名	适应症 （若中文与英文适应症不一致，以英文为准）		恶性肿瘤-重度类型
1	Avelumab/Bavencio	Indicated for: ※ Adults and pediatric patients 12 years and older with metastatic Merkel cell carcinoma (MCC).	适用于： ※ 治疗转移性Merkel细胞癌的成人和12岁及以上儿童患者。	Merkel细胞癌
		Indicated for: ※ Maintenance treatment of patients with locally advanced or metastatic urothelial carcinoma (UC) that has not progressed with first-line platinum-containing chemotherapy. ※ Patients with locally advanced or metastatic UC who: • Have disease progression during or following platinum-containing chemotherapy. • Have disease progression within 12 months of neoadjuvant or adjuvant treatment with platinum-containing chemotherapy.	适用于： ※ 一线含铂化疗未进展的局部晚期或转移性尿路上皮癌患者的维持治疗。 ※ 符合以下条件的局部晚期或转移性尿路上皮癌患者： • 在含铂化疗期间或之后出现疾病进展。 • 在使用含铂化疗药物进行新辅助治疗或辅助治疗后12个月内出现疾病进展。	尿路上皮癌
		Indicated for: ※ First-line treatment, in combination with axitinib, of patients with advanced RCC.	适用于： ※ 与阿西替尼联合用于晚期肾细胞癌患者的一线治疗。	肾细胞癌
2	Cemiplimab-rwlc/Libtayo	Indicated for: ※ In combination with platinum‐based chemotherapy for the first‐line treatment of adult patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) with no EGFR, ALK or ROS1 aberrations and is: • Locally advanced where patients are not candidates for surgical resection or definitive chemoradiation or • Metastatic. ※ As single agent for the first-line treatment of adult patients with NSCLC whose tumors have high PD-L1 expression [Tumor Proportion Score	适用于： ※ 与铂类化疗联合用于一线治疗无EGFR、ALK或ROS1突变的非小细胞肺癌成人患者，并且符合以下条件： • 局部晚期的，不适合手术切除或根治性放化疗，或 • 转移性的。 ※ 作为单药一线治疗非小细胞肺癌成人患者，患者的肿瘤具有高PD-L1表达【肿瘤细胞阳性比例评分≥50%】（经FDA 批准的检测确定），且	非小细胞肺癌

		(TPS) ≥50%] as determined by an FDA-approved test, with no EGFR, ALK, or ROS1 aberrations, and is: • Locally advanced where patients are not candidates for surgical resection or definitive chemoradiation or • Metastatic.	无EGFR、ALK或ROS1突变，并且符合以下条件： • 局部晚期的，不适合手术切除或根治性放化疗，或 • 转移性的。	
		Indicated for: ※ The treatment of patients with metastatic cutaneous squamous cell carcinoma (mCSCC) or locally advanced CSCC (laCSCC) who are not candidates for curative surgery or curative radiation.	适用于： ※ 治疗不适合根治性手术或根治性放疗的转移性皮肤鳞状细胞癌 或局部晚期皮肤鳞状细胞癌患者。	皮肤鳞状细胞癌
		Indicated for: ※ The treatment of patients with locally advanced basal cell carcinoma (laBCC) previously treated with a hedgehog pathway inhibitor or for whom a hedgehog pathway inhibitor is not appropriate. ※ The treatment of patients with metastatic basal cell carcinoma (mBCC) previously treated with a hedgehog pathway inhibitor or for whom a hedgehog pathway inhibitor is not appropriate.	适用于： ※ 治疗既往接受过Hedgehog信号通路抑制剂治疗或不适合Hedgehog信号通路抑制剂治疗的局部晚期基底细胞癌患者。 ※ 治疗既往接受过Hedgehog信号通路抑制剂治疗或不适合Hedgehog信号通路抑制剂治疗的转移性基底细胞癌患者。	基底细胞癌
3	Necitumumab/Portrazza	Indicated for: ※ In combination with gemcitabine and cisplatin, for first-line treatment of patients with metastatic squamous non-small cell lung cancer.	适用于： ※ 与吉西他滨和顺铂联合用于一线治疗转移性鳞状非小细胞肺癌患者。	非小细胞肺癌
4	Cobimetinib/Cotellic	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with unresectable or metastatic melanoma with a BRAF V600E or V600K mutation, in combination with vemurafenib.	适用于： ※ 与维莫非尼联合治疗BRAF V600E或V600K突变的不可切除或转移性黑色素瘤成人患者。	黑色素瘤
		Indicated for: ※ As a single agent for the treatment of adult patients with histiocytic neoplasms.	适用于： ※ 单药治疗组织细胞肿瘤成人患者。	组织细胞肿瘤
5	Tucatinib/Tukysa	Indicated for: ※ In combination with trastuzumab and capecitabine for treatment of adult patients with advanced unresectable or metastatic HER2-positive breast cancer, including patients with brain metastases, who have received one or more prior anti-HER2-based regimens in the metastatic setting.	适用于： ※ 与曲妥珠单抗和卡培他滨联合用于治疗晚期不可切除或转移性HER2阳性乳腺癌成人患者，包括脑转移患者，这些患者之前在转移性环境中接受过一种或多种基于抗HER2的治疗方案。	乳腺癌
		Indicated for: ※ In combination with trastuzumab for the treatment of adult patients with RAS wild-type HER2-positive unresectable or metastatic colorectal cancer that has progressed following treatment with	适用于： ※ 与曲妥珠单抗联合用于治疗RAS野生型HER2阳性不可切除或转移性结直肠癌成人患者，这些患者在接受基于	结直肠癌

		fluoropyrimidine-, oxaliplatin-, and irinotecan-based chemotherapy.	氟嘧啶、奥沙利铂和伊立替康的化疗后病情进展。	
6	Alpelisib/Piqray	Indicated for: ※ In combination with fulvestrant for the treatment of postmenopausal women, and men, with hormone receptor (HR)-positive, human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-negative, PIK3CA-mutated, advanced or metastatic breast cancer as detected by an FDA-approved test following progression on or after an endocrine-based regimen.	适用于： ※ 与氟维司群联合治疗HR阳性、HER2阴性、PIK3CA突变、晚期或转移性乳腺癌的绝经后女性及男性患者，这些患者在内分泌治疗方案中或治疗后出现进展并经FDA批准的检测确认。	乳腺癌
7	Panitumumab/Vectibix	Indicated for: ※ The treatment of wild-type RAS (defined as wild-type in both KRAS and NRAS as determined by an FDA-approved test for this use) metastatic colorectal cancer (mCRC): • In combination with FOLFOX for first-line treatment. • As monotherapy following disease progression after prior treatment with fluoropyrimidine, oxaliplatin, and irinotecan-containing chemotherapy. Limitation of Use: VECTIBIX is not indicated for the treatment of patients with RAS-mutant mCRC or for whom RAS mutation status is unknown.	适用于： ※ 治疗野生型RAS（根据FDA批准的检测确定在KRAS和NRAS中定义为野生型）转移性结直肠癌患者，并且符合以下条件： • 与FOLFOX化疗方案联合用于一线治疗。 • 既往使用氟嘧啶、奥沙利铂和含伊立替康的化疗后疾病进展后的单一疗法。 使用限制：VECTIBIX不适用于治疗RAS突变转移性结直肠癌患者或RAS突变状态未知的患者。	结直肠癌
8	Ziv-aflibercept/Zaltrap	Indicated for: ※ In combination with fluorouracil, leucovorin, irinotecan (FOLFIRI), for the treatment of patients with metastatic colorectal cancer that is resistant to or has progressed following an oxaliplatin-containing regimen.	适用于： ※ 与氟尿嘧啶、亚叶酸钙、伊立替康（FOLFIRI化疗方案）联合治疗对含奥沙利铂方案耐药或病情进展的转移性结直肠癌患者。	结直肠癌
9	Encorafenib/Braftovi	Indicated for: ※ In combination with cetuximab, for the treatment of adult patients with metastatic colorectal cancer (mCRC) with a BRAF V600E mutation, as detected by an FDA-approved test, after prior therapy.	适用于： ※ 与西妥昔单抗联合治疗转移性结直肠癌成人患者，患者在既往治疗后经FDA批准的检测确定为BRAF V600E突变。	结直肠癌
		Indicated for: ※ In combination with binimetinib, for the treatment of adult patients with metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) with a BRAF V600E mutation, as detected by an FDA-approved test.	适用于： ※ 与比美替尼联合治疗经FDA批准的检测确定为BRAF V600E突变的转移性非小细胞肺癌成人患者。	非小细胞肺癌
		Indicated for: ※ In combination with binimetinib, for the treatment of patients with unresectable or metastatic melanoma with a BRAF V600E or V600K mutation, as detected by an FDA-approved test.	适用于： ※ 与比美替尼联合治疗经FDA批准的检测确定为BRAF V600E或V600K突变的不可切除或转移性黑色素瘤患者。	黑色素瘤

10	Rucaparib/Rubraca	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with a deleterious BRCA mutation (germline and/or somatic)-associated metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) who have been treated with androgen receptor-directed therapy and a taxane-based chemotherapy. Select patients for therapy based on an FDA-approved companion diagnostic for RUBRACA.	适用于： ※ 治疗存在有害BRCA突变（胚系和/或体细胞）相关的转移性去势抵抗性前列腺癌的成人患者，患者已接受雄激素受体导向疗法和紫杉烷类的化疗。根据FDA批准的RUBRACA伴随诊断选择患者治疗。	前列腺癌
		Indicated for: ※ The maintenance treatment of adult patients with recurrent epithelial ovarian, fallopian tube, or primary peritoneal cancer who are in a complete or partial response to platinum-based chemotherapy.	适用于： ※ 对铂类化疗完全或部分缓解的复发性上皮性卵巢癌、输卵管癌或原发性腹膜癌成人患者的维持治疗。	卵巢癌
11	Temsirolimus/Torisel	Indicated for: ※ Treatment of advanced renal cell carcinoma.	适用于： ※ 治疗晚期肾细胞癌。	肾细胞癌
12	Cabozantinib/Cabometyx	Indicated for: ※ The treatment of patients with advanced renal cell carcinoma (RCC). ※ The treatment of patients with advanced renal cell carcinoma, as a first-line treatment in combination with nivolumab.	适用于： ※ 治疗晚期肾细胞癌患者。 ※ 治疗晚期肾细胞癌患者，与纳武单抗联合作为一线治疗。	肾细胞癌
		Indicated for: ※ The treatment of patients with hepatocellular carcinoma (HCC) who have been previously treated with sorafenib.	适用于： ※ 治疗既往接受过索拉非尼治疗的肝细胞癌患者。	肝细胞癌
		Indicated for: ※ The treatment of adult and pediatric patients 12 years of age and older with locally advanced or metastatic differentiated thyroid cancer (DTC) that has progressed following prior VEGFR-targeted therapy and who are radioactive iodine-refractory or ineligible.	适用于： ※ 治疗12岁及以上患有局部晚期或转移性分化型甲状腺癌的成人和儿童患者，患者在既往接受过VEGFR靶向治疗后疾病进展，且放射性碘难治或不符合条件。	分化型假甲状腺癌
13	Cabozantinib/Cometriq	Indicated for: ※ The treatment of patients with progressive, metastatic medullary thyroid cancer (MTC).	适用于： ※ 治疗进展性转移性甲状腺髓样癌患者。	甲状腺髓样癌
14	Bosutinib/Bosulif	Indicated for: ※ The treatment of adult and pediatric patients 1 year of age and older with chronic phase Ph+ chronic myelogenous leukemia (CML), newly-diagnosed or resistant or intolerant to prior therapy. ※ The treatment of adult patients with accelerated, or blast phase Ph+ CML with resistance or intolerance to prior therapy.	适用于： ※ 治疗新确诊或对既往治疗耐药或不耐受的慢性期费城染色体阳性慢性髓性白血病成人和 1 岁及以上儿童患者。 ※ 治疗对既往治疗耐药或不耐受的加速期或急变期费城染色体阳性慢性髓性白血病成人患者。	慢性髓性白血病

15	Ponatinib/Iclusig	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with: Chronic Myeloid Leukemia (CML) • Chronic phase (CP) CML with resistance or intolerance to at least two prior kinase inhibitors. • Accelerated phase (AP) or blast phase (BP) CML for whom no other kinase inhibitors are indicated. • T315I-positive CML (chronic phase, accelerated phase, or blast phase). Limitations of Use: ICLUSIG is not indicated and is not recommended for the treatment of patients with newly diagnosed CP-CML.	适用于： ※ 治疗患有以下疾病的成人患者： 慢性髓性白血病 • 慢性期慢性髓性白血病，对既往至少两种激酶抑制剂具有耐药性或不耐受。 • 没有其他激酶抑制剂适用的加速期或急变期慢性髓性白血病。 • T315I阳性慢性髓性白血病（慢性期、加速期或急变期）。 使用限制：ICLUSIG不适用且不推荐用于治疗新确诊的慢性期慢性髓性白血病患者。	慢性髓性白血病
		Indicated for: ※ The treatment of adult patients with: Philadelphia Chromosome-Positive Acute Lymphoblastic Leukemia (Ph+ ALL) • Newly diagnosed Ph+ ALL, in combination with chemotherapy. • As monotherapy in Ph+ ALL for whom no other kinase inhibitors are indicated or T315I-positive Ph+ ALL.	适用于： ※ 治疗患有以下疾病的成人患者： 费城染色体阳性急性淋巴细胞白血病 • 联合化疗，治疗新确诊的费城染色体阳性急性淋巴细胞白血病。 • 作为单一疗法治疗无其他激酶抑制剂适应症的费城染色体阳性急性淋巴细胞白血病或T315I阳性费城染色体阳性急性淋巴细胞白血病。	急性淋巴细胞白血病
16	Midostaurin/Rydapt	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with: • Newly diagnosed acute myeloid leukemia (AML) that is FLT3 mutationpositive as detected by an FDA-approved test, in combination with standard cytarabine and daunorubicin induction and cytarabine consolidation. Limitations of Use: RYDAPT is not indicated as a single-agent induction therapy for the treatment of patients with AML.	适用于： ※ 治疗患有以下疾病的成人患者： • 新确诊的急性髓系白血病，经FDA批准的检测确定为FLT3突变阳性，并结合标准阿糖胞苷和柔红霉素诱导及阿糖胞苷巩固化疗。 使用限制：RYDAPT不适用于急性髓系白血病患者的单药诱导疗法。	急性髓系白血病
		Indicated for: ※ The treatment of adult patients with: • Aggressive systemic mastocytosis (ASM), systemic mastocytosis with associated hematological neoplasm (SM-AHN), or mast cell leukemia (MCL).	适用于： ※ 治疗患有以下疾病的成人患者： • 侵袭性系统性肥大细胞增多症、系统性肥大细胞增多症伴相关血液肿瘤或肥大细胞白血病。	侵袭性系统性肥大细胞增多症 系统性肥大细胞增多症伴相关血液肿瘤 肥大细胞白血病

17	Idelalisib/Zydelig	Indicated for: ※ The treatment of patients with: • Relapsed chronic lymphocytic leukemia (CLL), in combination with rituximab, in patients for whom rituximab alone would be considered appropriate therapy due to other co-morbidities. Limitations of use: • ZYDELIG is not indicated and is not recommended for first-line treatment of any patient, including patients with CLL, small lymphocytic lymphoma (SLL), follicular lymphoma (FL), and other indolent nonHodgkin lymphomas. • ZYDELIG is not indicated and is not recommended in combination with bendamustine and rituximab, or in combination with rituximab for the treatment of patients with FL, SLL, and other indolent non-Hodgkin lymphomas.	适用于： ※ 治疗以下患者： • 与利妥昔单抗联合治疗，因其他合并症而单独使用利妥昔单抗被认为是适当治疗的复发性慢性淋巴细胞白血病患者。 使用限制： • ZYDELIG不适合也不推荐用于任何患者的一线治疗，包括慢性淋巴细胞白血病、小淋巴细胞淋巴瘤、滤泡性淋巴瘤和其他惰性非霍奇金淋巴瘤患者。 • ZYDELIG不适合且不推荐与苯达莫司汀和利妥昔单抗联合使用，或与利妥昔单抗联合用于治疗滤泡性淋巴瘤、小淋巴细胞淋巴瘤和其他惰性非霍奇金淋巴瘤患者。	慢性淋巴细胞白血病
18	Ibritumomab Tiuxetan /Zevalin	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with: • relapsed or refractory, low-grade or follicular B-cell non-Hodgkin's lymphoma (NHL). • previously untreated follicular NHL who achieve a partial or complete response to first-line chemotherapy.	适用于： ※ 治疗患有以下疾病的成人患者： • 复发性或难治性、低级别或滤泡性B细胞非霍奇金淋巴瘤。 • 既往未经治疗的滤泡性非霍奇金淋巴瘤，患者对一线化疗取得部分或完全缓解。	非霍奇金淋巴瘤
19	Belinostat/Beleodaq	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with relapsed or refractory peripheral T-cell lymphoma (PTCL).	适用于： ※ 治疗复发性或难治性外周T细胞淋巴瘤的成人患者。	外周T细胞淋巴瘤
20	Romidepsin/Istodax	Indicated for: ※ The treatment of cutaneous T-cell lymphoma (CTCL) in adult patients who have received at least one prior systemic therapy.	适用于： ※ 治疗至少接受过一次全身治疗的皮肤T细胞淋巴瘤成人患者。	皮肤T细胞淋巴瘤
21	Vorinostat/Zolinza	Indicated for: ※ The treatment of cutaneous manifestations in patients with cutaneous T-cell lymphoma (CTCL) who have progressive, persistent or recurrent disease on or following two systemic therapies.	适用于： ※ 治疗在两次全身治疗后或期间出现进行性、持续性或复发性疾病的皮肤T细胞淋巴瘤患者的皮肤表现。	皮肤T细胞淋巴瘤
22	Elotuzumab/Empliciti	Indicated for: ※ Combination with lenalidomide and dexamethasone for the treatment of adult patients with multiple myeloma who have received one to three prior therapies.	适用于： ※ 与来那度胺和地塞米松联合治疗既往已接受过一到三种治疗的多发性骨髓瘤成人患者。	多发性骨髓瘤

		※ Combination with pomalidomide and dexamethasone for the treatment of adult patients with multiple myeloma who have received at least two prior therapies including lenalidomide and a proteasome inhibitor.	※ 与泊马度胺和地塞米松联合治疗既往接受过至少两种治疗（包括来那度胺和蛋白酶体抑制剂）的多发性骨髓瘤成人患者。	
23	Vismodegib/Erivedge	Indicated for: ※ The treatment of adults with metastatic basal cell carcinoma, or with locally advanced basal cell carcinoma that has recurred following surgery or who are not candidates for surgery and who are not candidates for radiation.	适用于： ※ 治疗转移性基底细胞癌或手术后复发的局部晚期基底细胞癌或不适合手术且不适合放疗的基底细胞癌成人患者。	基底细胞癌
24	Vandetanib/Caprelsa	Indicated for: ※ The treatment of symptomatic or progressive medullary thyroid cancer in patients with unresectable locally advanced or metastatic disease. Use CAPRELSA in patients with indolent, asymptomatic or slowly progressing disease only after careful consideration of the treatment related risks of CAPRELSA.	适用于： ※ 治疗不可切除的局部晚期或转移性有症状或进展性甲状腺髓样癌。 仅在审慎考虑CAPRELSA治疗的相关风险后，才可对惰性、无症状或展疾病进展缓慢的患者使用CAPRELSA。	甲状腺髓样癌
25	Glasdegib/Daurismo	Indicated for: ※ In combination with low-dose cytarabine, for the treatment of newly-diagnosed acute myeloid leukemia (AML) in adult patients who are ≥75 years old or who have comorbidities that preclude use of intensive induction chemotherapy.	适用于： ※ 与低剂量阿糖胞苷联合治疗年龄≥75岁或因合并症而无法使用强化诱导化疗的新确诊急性髓系白血病成人患者。	急性髓系白血病
26	Tafasitamab-cxix /Monjuvi 、 Minjuvi	Indicated for: ※ In combination with lenalidomide for the treatment of adult patients with relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) not otherwise specified, including DLBCL arising from low grade lymphoma, and who are not eligible for autologous stem cell transplant (ASCT).	适用于： ※ 与来那度胺联合治疗非特指型复发或难治性弥漫性大B细胞淋巴瘤，包括源自低级别淋巴瘤的弥漫性大B细胞淋巴瘤，以及不适合进行自体干细胞移植的成人患者。	弥漫性大B细胞淋巴瘤
27	Binimetinib/Mektovi	Indicated for: ※ In combination with encorafenib, for the treatment of patients with unresectable or metastatic melanoma with a BRAF V600E or V600K mutation, as detected by an FDA-approved test.	适用于： ※ 与恩拉非尼联合治疗经FDA批准的检测确定为BRAF V600E或V600K突变的不可切除或转移性黑色素瘤患者。	黑色素瘤
		Indicated for: ※ In combination with encorafenib, for the treatment of adult patients with metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) with a BRAF V600E mutation, as detected by an FDA-approved test.	适用于： ※ 与恩拉非尼联合治疗经FDA批准的检测确定为BRAF V600E突变的转移性非小细胞肺癌成人患者。	非小细胞肺癌
28	Tremelimumab/Imjudo	Indicated for: ※ In combination with durvalumab, for the treatment of adult patients with	适用于： ※ 与度伐利尤单抗联合治疗无法切除的肝细胞癌成人患者。	肝细胞癌

		unresectable hepatocellular carcinoma (uHCC).		
		Indicated for: ※ In combination with durvalumab and platinum-based chemotherapy for the treatment of adult patients with metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) with no sensitizing epidermal growth factor receptor (EGFR) mutation or anaplastic lymphoma kinase (ALK) genomic tumor aberrations.	适用于： ※ 与度伐利尤单抗和铂类化疗联合治疗无致敏性EGFR突变或ALK基因组肿瘤异常的转移性非小细胞肺癌成人患者。	非小细胞肺癌
29	Fedratinib/Inrebic	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with intermediate-2 or high-risk primary or secondary (post-polycythemia vera or post-essential thrombocythemia) myelofibrosis (MF).	适用于： ※ 治疗中度至2度或高风险原发性或继发性（真性红细胞增多症后或原发性血小板增多症后）骨髓纤维化的成人患者。	骨髓纤维化
30	Sotorasib/Lumakras	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with KRAS G12C-mutated locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC), as determined by an FDA-approved test, who have received at least one prior systemic therapy.	适用于： ※ 治疗经FDA批准的检测确定为KRAS G12C突变的既往至少接受过一次全身治疗的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者。	非小细胞肺癌
31	Asciminib/Scemblix	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with: • Philadelphia chromosome-positive chronic myeloid leukemia (Ph+ CML) in chronic phase (CP), previously treated with two or more tyrosine kinase inhibitors (TKIs). • Ph+ CML in CP with the T315I mutation.	适用于： ※ 治疗患有以下疾病的成人患者： • 处于慢性期的费城染色体阳性慢性髓性白血病，既往接受过两种或两种以上TKI治疗。 • 处于慢性期的T315I突变费城染色体阳性慢性髓性白血病。	慢性髓性白血病
32	Nivolumab & Relatlimab-rmbw/Opdualag	Indicated for: ※ The treatment of adult and pediatric patients 12 years of age or older with unresectable or metastatic melanoma.	适用于： ※ 治疗不可切除或转移性黑色素瘤成人及12岁或以上儿童患者。	黑色素瘤
33	Dostarlimab-gxly/ Jemperli	Indicated for: ※ In combination with carboplatin and paclitaxel, followed by JEMPERLI as a single agent for the treatment of adult patients with primary advanced or recurrent endometrial cancer that is mismatch repair deficient (dMMR), as determined by an FDA-approved test, or microsatellite instability-high (MSI-H). ※ As a single agent for the treatment of adult patients with dMMR recurrent or advanced endometrial cancer, as determined by an FDA-approved test, that has progressed on or following prior treatment with a platinumcontaining regimen in any setting and are not	适用于： ※ 与卡铂和紫杉醇联合使用，然后以JEMPERLI作为单药治疗经FDA批准的检测确定为dMMR或MSI-H的原发性晚期或复发性子宫内膜癌成人患者。 ※ 作为单药治疗经FDA批准的检测确定为dMMR的复发性或晚期子宫内膜癌成人患者，患者既往接受含铂方案治疗期间或之后病情出现进展，且不适合进行根治性手术或放疗。	子宫内膜癌

		candidates for curative surgery or radiation.		
		Indicated for: ※ As a single agent for the treatment of adult patients with dMMR recurrent or advanced solid tumors, as determined by an FDA-approved test, that have progressed on or following prior treatment and who have no satisfactory alternative treatment options.	适用于： ※ 作为单药治疗经FDA批准的检测确定为dMMR的复发性或晚期实体瘤成人患者，患者在既往治疗期间或治疗后病情出现进展，且无理想替代治疗方案。	实体瘤
34	Tagraxofusp-erzs /Elzonris	Indicated for: ※ The treatment of blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm (BPDCN) in adults and in pediatric patients 2 years and older.	适用于： ※ 治疗成人和2岁及以上儿童患者的母细胞性浆细胞样树突状细胞肿瘤。	母细胞性浆细胞样树突状细胞肿瘤
35	Tivozanib/Fotivda	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with relapsed or refractory advanced renal cell carcinoma (RCC) following two or more prior systemic therapies.	适用于： ※ 治疗既往接受过两次或两次以上全身治疗的复发或难治性晚期肾细胞癌成人患者。	肾细胞癌
36	Sirolimus protein-bound/Fyarro	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with locally advanced unresectable or metastatic malignant perivascular epithelioid cell tumor (PEComa).	适用于： ※ 治疗局部晚期不可切除或转移性恶性血管周上皮样细胞瘤成人患者。	血管周上皮样细胞瘤
37	Enasidenib/Idhifa	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with relapsed or refractory acute myeloid leukemia (AML) with an isocitrate dehydrogenase-2 (IDH2) mutation as detected by an FDA-approved test.	适用于： ※ 治疗经FDA批准的检测确定存在IDH2突变的复发或难治性急性髓系白血病成人患者。	急性髓系白血病
38	Cabazitaxel/Jevtana	Indicated for: ※ In combination with prednisone for treatment of patients with metastatic castration-resistant prostate cancer previously treated with a docetaxel-containing treatment regimen.	适用于： ※ 与泼尼松联合治疗既往接受过含多西他赛治疗方案的转移性去势抵抗性前列腺癌患者。	前列腺癌
39	Adagrasib/Krazati	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with KRAS G12C-mutated locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC), as determined by an FDA approved test, who have received at least one prior systemic therapy.	适用于： ※ 治疗经FDA批准的检测确定为KRAS G12C突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者，患者既往至少接受过一次全身治疗。	非小细胞肺癌
40	Mosunetuzumab-axgb /Lunsumio	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with relapsed or refractory follicular lymphoma after two or more lines of systemic therapy.	适用于： ※ 治疗既往接受两次或两次以上全身治疗后复发或难治性滤泡性淋巴瘤成人患者。	滤泡性淋巴瘤
41	Futibatinib/Lytgobi	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with previously treated, unresectable, locally advanced or metastatic intrahepatic cholangiocarcinoma harboring fibroblast growth factor receptor 2 (FGFR2) gene fusions or other rearrangements.	适用于： ※ 治疗既往接受过治疗的、不可切除的、局部晚期或转移性FGFR2基因融合或其他重排的肝内胆管癌成人患者。	胆管癌
42	Elacestrant/Orserdu	Indicated for:	适用于：	乳腺癌

		※ The treatment of postmenopausal women or adult men, with ERpositive, HER2-negative, ESR1-mutated advanced or metastatic breast cancer with disease progression following at least one line of endocrine therapy.	※ 治疗ER阳性、HER2阴性、ESR1突变的晚期或转移性乳腺癌绝经后女性或成年男性患者，且患者在接受至少一线内分泌治疗后病情出现进展。	
43	Olutasidenib/Rezlidhia	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with relapsed or refractory acute myeloid leukemia (AML) with a susceptible IDH1 mutation as detected by an FDA-approved test.	适用于： ※ 治疗经FDA批准的检测确定为易感IDH1突变的复发或难治性急性髓系白血病成人患者。	急性髓系白血病
44	Tisotumab vedotin-tftv /Tivdak	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with recurrent or metastatic cervical cancer with disease progression on or after chemotherapy.	适用于： ※ 治疗化疗期间或化疗后病情进展的复发性或转移性宫颈癌成人患者。	宫颈癌
45	Pacritinib/Vonjo	Indicated for: ※ The treatment of adults with intermediate or highrisk primary or secondary (post-polycythemia vera or post-essential thrombocythemia) myelofibrosis with a platelet count below 50×10^9/L.	适用于： ※ 治疗血小板计数低于50×10^9/L的中或高风险原发性或继发性（真性红细胞增多症后或原发性血小板增多症后）骨髓纤维化的成人患者。	骨髓纤维化
46	Retifanlimab-dlwr/Zynyz	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with metastatic or recurrent locally advanced Merkel cell carcinoma.	适用于： ※ 治疗转移性或复发性局部晚期Merkel细胞癌成人患者。	Merkel细胞癌
47	Gemtuzumab ozogamicin /Mylotarg	Indicated for: ※ Treatment of newly-diagnosed CD33-positive acute myeloid leukemia (AML) in adults and pediatric patients 1 month and older. ※ Treatment of relapsed or refractory CD33-positive AML in adults and pediatric patients 2 years and older.	适用于： ※ 治疗新确诊的CD33阳性成人和1个月及以上儿童患者的急性髓系白血病。 ※ 治疗成人和2岁及以上儿童患者的复发性或难治性CD33阳性 急性髓系白血病。	急性髓系白血病
48	Belzutifan/Welireg	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with von Hippel-Lindau (VHL) disease who require therapy for associated renal cell carcinoma (RCC), central nervous system (CNS) hemangioblastomas, or pancreatic neuroendocrine tumors (pNET), not requiring immediate surgery.	适用于： ※ 治疗无需立即手术，需要接受肾细胞癌、中枢神经系统血管母细胞瘤或胰腺神经内分泌肿瘤相关治疗的von Hippel—Lindau病成人患者。	von Hippel—Lindau病
		Indicated for: ※ The treatment of adult patients with advanced renal cell carcinoma (RCC) following a programmed death receptor-1 (PD-1) or programmed death-ligand 1 (PD-L1) inhibitor and a vascular endothelial growth factor tyrosine kinase inhibitor (VEGF-TKI).	适用于： ※ 治疗接受PD-1或PD-L1抑制剂和VEGF-TKI治疗后的晚期肾细胞癌成人患者。	肾细胞癌
49	Lutetium Lu 177 Dotatate /Lutathera	Indicated for: ※ The treatment of somatostatin receptor-positive gastroenteropancreatic	适用于： ※ 治疗生长抑素受体阳性胃肠胰神经内分泌肿瘤，包括	神经内分泌肿瘤

		neuroendocrine tumors (GEP-NETs), including foregut, midgut, and hindgut neuroendocrine tumors in adults.	成人患者前肠、中肠和后肠神经内分泌肿瘤。	
50	Lutetium Lu 177 vipivotide tetraxetan /Pluvicto	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with prostate-specific membrane antigen (PSMA)-positive metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) who have been treated with androgen receptor (AR) pathway inhibition and taxane-based chemotherapy.	适用于： ※ 治疗已接受AR通路抑制和紫杉烷类化疗治疗的PSMA阳性转移性去势抵抗性前列腺癌成人患者。	前列腺癌
51	Iobenguane I-131/Azedra	Indicated for: ※ The treatment of adult and pediatric patients 12 years and older with iobenguane scan positive, unresectable, locally advanced or metastatic pheochromocytoma who require systemic anticancer therapy.	适用于： ※ 治疗需要全身抗癌治疗的碘苄胍扫描阳性、不可切除、局部晚期或转移性嗜铬细胞瘤的成人和12岁及以上儿童患者。	嗜铬细胞瘤
		Indicated for: ※ The treatment of adult and pediatric patients 12 years and older with iobenguane scan positive, unresectable, locally advanced or metastatic paraganglioma who require systemic anticancer therapy.	适用于： ※ 治疗需要全身抗癌治疗的碘苄胍扫描阳性、不可切除、局部晚期或转移性副神经节瘤的成人和12岁及以上儿童患者。	副神经节瘤
52	Idecabtagene vicleucel /Abecma	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with relapsed or refractory multiple myeloma after two or more prior lines of therapy including an immunomodulatory agent, a proteasome inhibitor, and an anti-CD38 monoclonal antibody.	适用于： ※ 治疗既往接受过两种或两种以上疗法（包括免疫调节剂、蛋白酶体抑制剂和抗CD38单克隆抗体）的复发或难治性多发性骨髓瘤成人患者。	多发性骨髓瘤
53	Lisocabtagene maraleucel/Breyanzi	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with large B-cell lymphoma (LBCL), including diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) not otherwise specified (including DLBCL arising from indolent lymphoma), high-grade B-cell lymphoma, primary mediastinal large B-cell lymphoma, and follicular lymphoma grade 3B, who have: • refractory disease to first-line chemoimmunotherapy or relapse within 12 months of first-line chemoimmunotherapy; or • refractory disease to first-line chemoimmunotherapy or relapse after first-line chemoimmunotherapy and are not eligible for hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) due to comorbidities or age; or • relapsed or refractory disease after two or more lines of systemic therapy. Limitations of Use: BREYANZI is not indicated for the treatment of patients with primary central nervous system lymphoma.	适用于： ※ 治疗患有大B细胞淋巴瘤的成人患者，包括非特指型弥漫性大B细胞淋巴瘤（包括源自惰性淋巴瘤的弥漫性大B细胞淋巴瘤）、高级别B细胞淋巴瘤、原发性纵隔大B细胞淋巴瘤和3B级滤泡性淋巴瘤，且： • 一线化学免疫疗法难治或一线化学免疫疗法后12个月内复发；或 • 一线化学免疫疗法难治或一线化学免疫疗法后复发且因合并症或年龄不适合进行造血干细胞移植；或 • 既往接受二线或二线以上全身治疗后复发或难治。 使用限制：BREYANZI不适用于治疗原发性中枢神经系统淋巴瘤患者。	大B细胞淋巴瘤

		Indicated for: ※ The treatment of adult patients with relapsed or refractory chronic lymphocytic leukemia (CLL) or small lymphocytic lymphoma (SLL) who have received at least 2 prior lines of therapy, including a Bruton tyrosine kinase (BTK) inhibitor and a B-cell lymphoma 2 (BCL-2) inhibitor.	适用于： ※ 治疗复发或难治性慢性淋巴细胞白血病或小淋巴细胞淋巴瘤成人患者，且既往至少接受过2种疗法，包括BTK抑制剂和BCL-2抑制剂。	慢性淋巴细胞白血病 小淋巴细胞淋巴瘤
54	Tisagenlecleucel/Kymriah	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with relapsed or refractory (r/r) large B-cell lymphoma after two or more lines of systemic therapy, including diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) not otherwise specified, high grade B-cell lymphoma and DLBCL arising from follicular lymphoma. Limitations of Use: KYMRIAH is not indicated for treatment of patients with primary central nervous system lymphoma.	适用于： ※ 治疗既往接受过二线或二线以上全身治疗后复发或难治性大B细胞淋巴瘤成人患者，包括非特指型弥漫性大B细胞淋巴瘤、高级别B细胞淋巴瘤和由滤泡性淋巴瘤引起的弥漫性大B细胞淋巴瘤。 使用限制：KYMRIAH不适用于治疗原发性中枢神经系统淋巴瘤患者。	大B细胞淋巴瘤
		Indicated for: ※ The treatment of patients up to 25 years of age with B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia (ALL) that is refractory or in second or later relapse.	适用于： ※ 治疗难治性或两次及以上复发的25岁及以下B细胞前体急性淋巴细胞白血病患者。	急性淋巴细胞白血病
		Indicated for: ※ The treatment of adult patients with relapsed or refractory follicular lymphoma (FL) after two or more lines of systemic therapy.	适用于： ※ 治疗接受过二线或二线以上全身治疗后复发或难治性滤泡性淋巴瘤成人患者。	滤泡性淋巴瘤
55	Brexucabtagene autoleucel/Tecartus	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with relapsed or refractory B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia (ALL).	适用于： ※ 治疗复发或难治性B细胞前体急性淋巴细胞白血病成人患者。	急性淋巴细胞白血病
		Indicated for: ※ The treatment of adult patients with relapsed or refractory mantle cell lymphoma (MCL).	适用于： ※ 治疗复发或难治性套细胞淋巴瘤成人患者。	套细胞淋巴瘤
56	Ciltacabtagene autoleucel/Carvykti	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with relapsed or refractory multiple myeloma who have received at least 1 prior line of therapy, including a proteasome inhibitor and an immunomodulatory agent, and are refractory to lenalidomide.	适用于： ※ 治疗复发或难治性多发性骨髓瘤成人患者，患者既往接受过至少一线治疗，包括蛋白酶体抑制剂和免疫调节剂，且对来那度胺有耐药性。	多发性骨髓瘤
57	Tebentafusp-tebn /Kimmtrak	Indicated for: ※ The treatment of HLA-A*02:01-positive adult patients with unresectable or metastatic uveal melanoma.	适用于： ※ 治疗HLA-A*02:01阳性不可切除或转移性葡萄膜黑色素瘤成人患者。	葡萄膜黑色素瘤
58	Repotrectinib/Augtyro	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with locally advanced or metastatic ROS1-positive non-small cell lung cancer (NSCLC).	适用于： ※ 治疗局部晚期或转移性ROS1阳性非小细胞肺癌成人患者。	非小细胞肺癌

59	Capmatinib/Tabrecta	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) whose tumors have a mutation that leads to mesenchymal-epithelial transition (MET) exon 14 skipping as detected by an FDA-approved test.	适用于： ※ 治疗转移性非小细胞肺癌成人患者，患者肿瘤具有MET14号外显子跳跃突变（经 FDA 批准的检测确定）。	非小细胞肺癌
60	Talazoparib/Talzenna	Indicated for: ※ As a single agent, for the treatment of adult patients with deleterious or suspected deleterious germline BRCA-mutated (gBRCAm) HER2-negative locally advanced or metastatic breast cancer. Select patients for therapy based on an FDA-approved companion diagnostic for TALZENNA.	适用于： ※ 单药治疗存在有害或疑似有害胚系BRCA突变、HER2阴性局部晚期或转移性乳腺癌成人患者。根据FDA批准的TALZENNA伴随诊断选择患者治疗。	乳腺癌
		Indicated for: ※ In combination with enzalutamide for the treatment of adult patients with HRR gene-mutated metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC).	适用于： ※ 与恩扎卢胺联合治疗HRR基因突变转移性去势抵抗性前列腺癌成人患者。	前列腺癌
61	Erdafitinib/Balversa	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with locally advanced or metastatic urothelial carcinoma (mUC) with susceptible FGFR3 genetic alterations whose disease has progressed on or after at least one line of prior systemic therapy. Select patients for therapy based on an FDA-approved companion diagnostic for BALVERSA. Limitations of Use: BALVERSA is not recommended for the treatment of patients who are eligible for and have not received prior PD-1 or PD-L1 inhibitor therapy.	适用于： ※ 治疗存在易感FGFR3基因突变的局部晚期或转移性尿路上皮癌成人患者，且患者在既往接受过至少一种全身治疗期间或之后疾病出现进展。根据FDA批准的BALVERSA伴随诊断选择患者治疗。 使用限制：不建议将BALVERSA用于符合资格但既往未接受过PD-1或PD-L1抑制剂治疗的患者。	尿路上皮癌
62	Enfortumab Vedotin-ejfv /Padcev	Indicated for: ※ In combination with pembrolizumab for the treatment of adult patients with locally advanced or metastatic urothelial cancer. ※ As a single agent for the treatment of adult patients with locally advanced or metastatic urothelial cancer who: • have previously received a programmed death receptor-1 (PD-1) or programmed death-ligand 1 (PD-L1) inhibitor and platinumcontaining chemotherapy, or • are ineligible for cisplatin-containing chemotherapy and have previously received one or more prior lines of therapy.	适用于： ※ 与帕博利珠单抗联合治疗局部晚期或转移性尿路上皮癌成人患者。 ※ 作为单药治疗局部晚期或转移性尿路上皮癌成人患者，患者： • 既往接受过PD-1或PD-L1抑制剂和含铂化疗，或 • 不适合接受含顺铂化疗，既往接受过一种或多种治疗方案。	尿路上皮癌
63	Loncastuximab tesirine-lpyl/Zynlonta	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with relapsed or refractory large B-cell lymphoma after two or more lines of	适用于： ※ 治疗经过二线或二线以上全身治疗后复发或难治性大B细胞淋巴瘤，包括非特指型	弥漫性大B细胞淋巴瘤

		systemic therapy, including diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) not otherwise specified, DLBCL arising from low-grade lymphoma, and high-grade B-cell lymphoma.	弥漫性大B细胞淋巴瘤、源自低级别淋巴瘤的弥漫性大B细胞淋巴瘤和高级别B细胞淋巴瘤的成人患者。	
64	Isatuximab-irfc/Sarclisa	Indicated for: ※ In combination with pomalidomide and dexamethasone, for the treatment of adult patients with multiple myeloma who have received at least 2 prior therapies including lenalidomide and a proteasome inhibitor. ※ In combination with carfilzomib and dexamethasone, for the treatment of adult patients with relapsed or refractory multiple myeloma who have received 1 to 3 prior lines of therapy.	适用于： ※ 与泊马度胺和地塞米松联合治疗既往接受过至少2种治疗方案（包括来那度胺和蛋白酶体抑制剂）的多发性骨髓瘤成人患者。 ※ 与卡非佐米和地塞米松联合治疗既往接受过1至3种治疗方案的复发或难治性多发性骨髓瘤成人患者。	多发性骨髓瘤
65	Amivantamab-vmjw /Rybrevant	Indicated for: ※ In combination with carboplatin and pemetrexed for the first-line treatment of adult patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) with epidermal growth factor receptor (EGFR) exon 20 insertion mutations, as detected by an FDA-approved test. ※ As a single agent for the treatment of adult patients with locally advanced or metastatic NSCLC with EGFR exon 20 insertion mutations, as detected by an FDA-approved test, whose disease has progressed on or after platinum-based chemotherapy.	适用于： ※ 与卡铂和培美曲塞联合一线治疗经FDA批准的检测确定存在EGFR第20号外显子插入突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者。 ※ 作为单药治疗经FDA批准的检测确定存在EGFR第20号外显子插入突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌成人患者，且该患者在铂类化疗期间或之后病情出现进展。	非小细胞肺癌
66	Mirvetuximab soravtansine-gynx /Elahere	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with FRα positive, platinum-resistant epithelial ovarian cancer, who have received one to three prior systemic treatment regimens. Select patients for therapy based on an FDA-approved test.	适用于： ※ 治疗FRα阳性、铂耐药的卵巢上皮癌成人患者，既往已接受过一至三种全身治疗方案。根据FDA批准的检测选择患者进行治疗。	卵巢上皮癌
		Indicated for: ※ The treatment of adult patients with FRα positive, platinum-resistant fallopian tube cancer, who have received one to three prior systemic treatment regimens. Select patients for therapy based on an FDA-approved test.	适用于： ※ 治疗FRα阳性、铂耐药的输卵管癌成人患者，既往已接受过一至三种全身治疗方案。根据FDA批准的测试选择患者进行治疗。	输卵管癌
		Indicated for: ※ The treatment of adult patients with FRα positive, primary peritoneal cancer, who have received one to three prior systemic treatment regimens. Select patients for therapy based on an FDA-approved test.	适用于： ※ 治疗FRα阳性、铂耐药的原发性腹膜癌成人患者，既往已接受过一至三种全身治疗方案。根据FDA批准的测试选择患者进行治疗。	原发性腹膜癌
67	Pirtobrutinib/Jaypirca	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with relapsed or refractory mantle cell	适用于： ※ 治疗既往接受至少两线全身治疗（包括BTK抑制剂）	套细胞淋巴瘤

		lymphoma (MCL) after at least two lines of systemic therapy, including a BTK inhibitor.	的复发或难治性套细胞淋巴瘤成人患者。	
		Indicated for: ※ The treatment of adult patients with chronic lymphocytic leukemia or small lymphocytic lymphoma (CLL/SLL) who have received at least two prior lines of therapy, including a BTK inhibitor and a BCL-2 inhibitor.	适用于： ※ 治疗既往接受至少两线治疗（包括BTK抑制剂和BCL-2抑制剂）的慢性淋巴细胞白血病或小淋巴细胞淋巴瘤成人患者。	慢性淋巴细胞白血病 小淋巴细胞淋巴瘤
68	Teclistamab-cqyv /Tecvayli	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with relapsed or refractory multiple myeloma who have received at least four prior lines of therapy, including a proteasome inhibitor, an immunomodulatory agent and an anti-CD38 monoclonal antibody.	适用于： ※ 治疗既往接受过包括蛋白酶体抑制剂、免疫调节剂和抗CD38单克隆抗体在内的至少四线疗法的复发或难治性多发性骨髓瘤成人患者。	多发性骨髓瘤
69	Tazemetostat/Tazverik	Indicated for: ※ The treatment of adults and pediatric patients aged 16 years and older with metastatic or locally advanced epithelioid sarcoma not eligible for complete resection.	适用于： ※ 治疗不符合完全切除条件的转移性或局部晚期上皮样肉瘤的成人及16岁及以上的儿童患者。	上皮样肉瘤
		Indicated for: ※ The treatment of adult patients with relapsed or refractory follicular lymphoma whose tumors are positive for an EZH2 mutation as detected by an FDA-approved test and who have received at least 2 prior systemic therapies. ※ The treatment of adult patients with relapsed or refractory follicular lymphoma who have no satisfactory alternative treatment options.	适用于： ※ 治疗复发性或难治性滤泡性淋巴瘤的成人患者，其肿瘤经FDA批准的检测确定为EZH2突变阳性，并且既往已接受至少两种全身治疗。 ※ 治疗无任何理想替代治疗方案的复发性或难治性滤泡性淋巴瘤的成人患者。	滤泡性淋巴瘤
70	Capivasertib/Truqap	Indicated for: ※ In combination with fulvestrant for the treatment of adult patients with hormone receptor (HR)-positive, human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-negative, locally advanced or metastatic breast cancer with one or more PIK3CA/AKT1/PTEN-alterations as detected by an FDA-approved test following progression on at least one endocrine-based regimen in the metastatic setting or recurrence on or within 12 months of completing adjuvant therapy.	适用于： ※ 与氟维司群联合治疗HR阳性、HER2阴性、经FDA批准的检测确认伴有一种或多种生物标志物改变（PIK3CA、AKT1、PTEN）的局部晚期或转移性乳腺癌成人患者，患者在转移性环境中既往接受至少一种内分泌治疗后出现病情进展，或在完成辅助治疗后12个月内复发。	乳腺癌
71	Elranatamab/Elrexfio	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with relapsed or refractory multiple myeloma who have received at least four prior lines of therapy including a proteasome inhibitor, an immunomodulatory agent, and an anti-CD38 monoclonal antibody.	适用于： ※ 治疗患有复发性或难治性多发性骨髓瘤的成人患者，患者既往至少接受过四种疗法，包括蛋白酶体抑制剂、免疫调节剂和抗CD38单克隆抗体。	多发性骨髓瘤

72	Epcoritamab /Epkinly 、 Tepkinly	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL), not otherwise specified, including DLBCL arising from indolent lymphoma, and high-grade B-cell lymphoma after two or more lines of systemic therapy.	适用于： ※ 治疗既往接受过二线或多线全身治疗后的非特指型复发或难治性弥漫性大B细胞淋巴瘤成人患者，包括源自惰性淋巴瘤的弥漫性大B细胞淋巴瘤和高级别B细胞淋巴瘤。	弥漫性大B细胞淋巴瘤
73	Momelotinib /Ojjaara 、 Omjjara	Indicated for: ※ The treatment of intermediate or high-risk myelofibrosis (MF), including primary MF or secondary MF [post-polycythemia vera (PV) and post-essential thrombocythemia (ET)], in adults with anemia.	适用于： ※ 治疗成人贫血的中危或高危骨髓纤维化，包括原发性骨髓纤维化或继发性骨髓纤维化（真性红细胞增多症后或原发性血小板增多症后）。	骨髓纤维化
74	Nirogacestat/Ogsiveo	Indicated for: ※ Adult patients with progressing desmoid tumors who require systemic treatment.	适用于： ※ 需要全身治疗的进展性硬纤维瘤成人患者。	硬纤维瘤
75	Quizartinib/Vanflyta	Indicated for: ※ In combination with standard cytarabine and anthracycline induction and cytarabine consolidation, and as maintenance monotherapy following consolidation chemotherapy, for the treatment of adult patients with newly diagnosed acute myeloid leukemia (AML) that is FLT3 internal tandem duplication (ITD)-positive as detected by an FDA-approved test. Limitations of Use: VANFLYTA is not indicated as maintenance monotherapy following allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT); improvement in overall survival with VANFLYTA in this setting has not been demonstrated.	适用于： ※ 联合标准阿糖胞苷和蒽环类诱导治疗以及联合阿糖胞苷巩固治疗，并作为巩固化疗后的单药维持治疗经FDA批准的检测确认为FLT3-ITD阳性的新确诊的急性髓系白血病成人患者。 使用限制： VANFLYTA不适合作为同种异体造血干细胞移植后的维持单药治疗；尚未证明VANFLYTA在这种情况下可改善总生存期。	急性髓系白血病
76	Talquetamab/Talvey	Indicated for: ※ The treatment of adult patients with relapsed or refractory multiple myeloma who have received at least four prior lines of therapy, including a proteasome inhibitor, an immunomodulatory agent and an anti-CD38 monoclonal antibody.	适用于： ※ 治疗复发性或难治性多发性骨髓瘤成人患者，患者既往至少接受过四种疗法，包括蛋白酶体抑制剂、免疫调节剂和抗CD38单克隆抗体。	多发性骨髓瘤

（此页内容结束）

友邦卓越海外特药医疗保险
服务告知和客户确认书

尊敬的先生/女士：

本公司为友邦卓越海外特药医疗保险客户提供服务。具体服务详情请参见《友邦卓越海外特药医疗保险服务手册》。

敬请扫码获取电子版
服务手册

敬请扫码关注爱健康
即可获取服务申请

本人已阅读电子版《友邦卓越海外特药医疗保险服务手册》，知晓并同意本产品提供服务，且了解该服务的内容、流程、标准、期限以及注意事项和可能发生的风险。

[AIA – INTERNAL]

（此　页　空　白）

友邦人寿

个人人身保险投保单

保险合同编号：H122717572

保险营销员姓名:刘彦楚　　保险营销员编号:110381981　　营销员联系电话:13141492658

组 别:赢嘉星蕴　　营 销 服 务 部:朝阳光华路

投保须知

1.本产品由友邦人寿保险有限公司（以下简称“本公司”）承保，目前，本公司经营区域包括上海市、广东省（含深圳）、北京市、江苏省、天津市、河北省、四川省、湖北省、河南省。**本公司营业执照及保险许可证、业务范围、经营区域及主要负责人请参见我司官网“公开信息披露 – 基本信息 – 公司概况”中的相关信息，**https://www.aia.com.cn/zh-cn/gongkaixinxipilou/jibenxinxi/gongsigaikuang。

2.**为了维护您的合法权益，请您在投保前仔细阅读所投保产品的产品说明书（若有）和保险条款（您可以通过公司官网https://www.aia.com.cn的公开信息披露专区查询产品条款），在确认已充分理解该投保产品的保险责任、责任免除、犹豫期、等待期、保险金申请、解除合同等条款后，根据您的实际情况选择合适的保险金额、保险期间、交费期限、交费金额，再做出投保决定。**投保人所输入的信息需准确且真实有效，常驻（住）地及本次投保地应当在所属营销员展业范围内。

3.**如实告知义务：**指就投保人和被保险人的有关情况提出询问，投保人应当如实告知。投保人故意或者因重大过失未履行如实告知义务，足以影响本公司决定是否同意承保或者提高保险费率的，本公司有权解除合同。

4.**信息安全及交易安全：**请您仔细阅读本公司《个人信息处理规则告知书》、《向第三方提供及境外接收方清单》和《儿童个人信息处理规则告知书》（若需）后，如实填写投保人、被保险人和指定受益人等客户信息，以确保本公司各项通知能及时送达。若客户信息发生变更，请您及时办理变更手续。本公司采集客户信息特别是联系电话和联系地址的用途，包括但不限于计算保费、核保、寄送保单和客户回访等。我们严格遵守现行的关于个人信息、数据及隐私保护的法律法规，采取充分的技术手段和制度管理，保护您的交易安全及提供给我们的个人信息，数据和隐私不受到非法的泄露或披露给未获授权的第三方。

5.**合同生效：**以保险单上所载的生效时日为准，您的投保申请须经投保人支付保险费且本公司同意承保后，您的保险合同才生效。

6.**保险期间：**不保证续保且保险期间为一年的保险合同在保险期间届满时，您需要重新向本公司申请投保本产品，并经本公司同意，交纳保险费，获得新的保险合同。若保险期间届满时，本产品已经停售，本公司不再接受投保申请，但会向投保人提供转保建议。

7.**关于保单和发票：**本合同采用电子保险单形式承保，保险合同生效后，可登陆“友邦友享”app, 点击“我的保单”，查询到您购买的保单后在线下载电子保险合同，申请获取电子发票和纸质保险合同。

8.**保费支付：**付款人须为投保人本人。如投保人选择分期交纳保险费，请投保人根据自身的财务状况，选择合适的交费期间和交费金额，无法持续交纳保险费可能导致保险合同效力中止或合同解除。在投保人委托授权银行自动转账后，本保险合同的续期保险费通过投保人设立的银行账号进行自动扣款。

9.**投诉渠道：**如您有任何关于保险产品销售或服务方面的意见，请联系800-820-3588（固话）、400-820-3588（手机）。

10.**售后服务：**您可通过关注官方微信公众号“友邦保险”，或下载客户应用端“友邦友享”、或登录网站https://www.aia.com.cn，自助查询和办理保单后续服务。在线自助服务无法涵盖所有售后服务事项，如App内无法查询到您所需要的服务，您可拨打本公司服务电话800-820-3588（固话）、400-820-3588（手机）。如需亲临本公司客户服务中心办理保单后续服务，您可登录官网客服指南专栏查看友邦保险分支机构客户服务中心地址（https://www.aia.com.cn/zh-cn/zixun.html#dz）。

11.**特别提示：**为未成年子女投保的人身保险，因被保险人身故给付的保险金总和不得超过国家金融监督管理总局规定的限额，身故给付的保险金额总和约定也不得超过前述限额。

12.如需了解友邦人寿保险有限公司的偿付能力相关信息，请至友邦保险官网https://www.aia.com.cn/zh-cn/gongkaixinxipilou/zhuanxiangxinxi/changfunengli公开信息披露专栏或扫描二维码进行查询。

第一部分

A. 投保人个人资料

姓名：王硕	性别：女	出生日期：1982年07月01日	国籍：中国	与被保险人关系：本人
证件类型及号码 ：身份证 211202198207011760			证件有效期 ：2037年01月04日	
投保人住所：北京市朝阳区东三环南路54号华腾园12412			手机：18612267183	

B.被保险人个人资料

姓名：王硕	性别：女	出生日期：1982年07月01日	国籍：中国	与投保人关系：本人
证件类型及号码 ：身份证 211202198207011760			证件有效期 ：2037年01月04日	
被保险人住所：北京市朝阳区东三环南路54号华腾园12412				
社保情况： 有社保				

C. 通讯地址

地址：北京市朝阳区东三环南路54号华腾园12412	邮编：100000

第二部分

A. 被保险人告知事项

告知问题	被保险人回答
被保险人是否既往无恶性肿瘤、癌前病变或交界性肿瘤病史，且目前没有肿瘤就医计划？ 1）癌前病变是指：体内局部组织已有从正常细胞转变为恶性细胞的倾向，并有可能转变为癌症的，如:口腔黏膜白斑、胃黏膜不典型增生、萎缩性胃炎、胃肠上皮化生、结直肠腺瘤、子宫内膜不典型增生、肝硬化、慢性肝炎、乳腺结节（BI-RADS）和甲状腺结节（TI-RADS）三级以上的、肺部磨玻璃结节、多囊肾等。 2）交界性肿瘤是指：一种低度潜在恶性肿瘤，它同时具有良性肿瘤和恶性肿瘤的一些特征，如生长缓慢，复发迟，类似良性肿瘤，但又可以发生转移，组织形态和生物学行为介于良性与恶性之间的肿瘤，也称为中间性（或中间型）肿瘤。	是

第三部分

A. 申请保险项目 （币值单位:人民币元）

保险项目	基本保险金额	保险期间	缴费方式	首期保险费
友邦卓越海外特药医疗保险	4,000,000.00元	一年	年缴	0
			合计	0（公司资助保险费）

被保险人与投保人声明与授权

1.本投保单、与投保单有关的各份问卷及文件的各项告知与陈述确实无误。若不属实，除法律另有规定外，本合同无效。

2.本人已认真阅读并理解了保险条款样本，本人已了解了该产品的保险责任、责任免除、解除合同等内容，并知晓所有保险责任均以保险合同所载为准，除由贵公司经正式程序修改或批注的内容外，其它任何人的口头及书面陈述、报告或合约，贵公司无需负责。

3.本人授权贵公司从任何内、外科医生、医院、诊所、保险公司或任何组织单位，就有关保险事宜，查询、拷贝有关投保人、被保险人及受益人的资料或索取其它有关证明文件。

4.除在投保单个人资料部分填写的国籍信息以外，本人声明，本人并不拥有美国的国籍、永久居留权、绿卡、居留权等使得本人对美国有纳税义务。（备注：如果您开始拥有美国的国籍、永久居留权、绿卡、居留权等使得您对美国有纳税义务，请于相关身份信息更改日起30天内通知我司。如您已在投保单上告知您的国籍为美国，则本条不适用）

5.本人已了解如果投保人在保险费约定支付日的60天后仍未支付保险费，则合同效力中止。在效力中止后，投保人可以申请恢复合同效力。经保险公司与投保人协商并达成协议，在投保人补交保险费之日起，合同效力恢复。

友邦人寿重新投保业务确认书

保险合同编号： H122717572

投保人信息栏

姓名：王硕	性别：女
出生日期：1982-07-01	证件类型：身份证
证件号：211202198207011760	证件有效期：2037-01-04
手机号：18612267183	与被保人的关系：本人

被保人信息栏

姓名：王硕	性别：女
出生日期：1982-07-01	证件类型：身份证
证件号：211202198207011760	证件有效期：2037-01-04
社保身份： ☑ 以公费医疗或基本医疗保险身份投保 ☐ 以非公费医疗或非基本医疗保险身份投保	

保险项目

险种名称	基本保险金额	当期保险费
重新投保		
卓越海外特药医疗保险	4,000,000	129元
合计保险费：129.00元		
保险期间：2025/11/19 24时 - 2026/11/19 24时		

交费信息栏

交费方式	年交
交费账号	无

客户声明栏：

本人已阅读和同意《保险条款》《产品说明》《投保须知》《指定药品清单》《责任免除》《特别告知书》《服务告知和客户确认书》《银行自动转账授权书》的全部内容。 本人亦知晓若原保险产品有除外承保决定的，重新投保仍然维持该承保决定。若原保险产品有健康加费决定的，重新投保仍然维持该健康加费决定，但本期具体总保费以本次页面展示金额为准。如发生保险费调整的本公司将另行通知。

投保人： 王硕
申请日期： 2025/09/22
申请流水号： YRM25092211010006

友邦卓越海外特药医疗保险
服务告知和客户确认书

尊敬的先生/女士：

本公司为友邦卓越海外特药医疗保险客户提供服务。具体服务详情请参见《友邦卓越海外特药医疗保险服务手册》。

敬请扫码获取电子版
服务手册

敬请扫码关注爱健康
即可获取服务申请

本人已阅读电子版《友邦卓越海外特药医疗保险服务手册》，知晓并同意本产品提供服务，且了解该服务的内容、流程、标准、期限以及注意事项和可能发生的风险。

友邦卓越海外特药医疗保险产品投保须知书

尊敬的客户，您好！感谢您投保友邦人寿保险有限公司的保险产品。为了维护您的权益，请您认真阅读以下投保须知以及本产品合同条款相关内容。

【承保公司】

本保险产品为友邦人寿[2024]医疗保险 066 号《友邦卓越海外特药医疗保险》，由友邦人寿保险有限公司承保。

【偿付能力信息披露】

我司偿付能力信息可通过以下链接查看：

https://www.aia.com.cn/zh-cn/gongkaixinxipilou/zhuanxiangxinxi/changfunengli

【投保人如实告知义务及未如实告知会造成的后果】

我国《保险法》对投保人的如实告知行为进行了明确的规定。投保时，您填写的投保单应当属实；对于销售人员询问的有关被保险人的问题，您也应当如实回答，否则可能影响您和被保险人的权益。

本公司就投保人和被保险人的有关情况提出询问，投保人应当如实告知。

如果投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务，足以影响本公司决定是否同意承保或者提高保险费率的，本公司有权解除本合同。

如果投保人故意不履行如实告知义务，对于本合同解除前发生的保险事故，本公司不承担给付保险金的责任，并不退还保险费。

如果投保人因重大过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响的，对于本合同解除前发生的保险事故，本公司不承担给付保险金的责任，但应当退还保险费。

公司在合同订立时已经知道投保人未如实告知的情况的，本公司不得解除合同；发生保险事故的，本公司承担给付保险金的责任。

【保险责任】

一、等待期

本产品生效日起 30 日内（含第 30 日）为本产品的等待期，我们对被保险人于上述期间确诊恶性肿瘤——重度而导致的医疗费用不承担保险责任，且对在上述期间后因该疾病而导致的医疗费用，我们也不承担保险责任。

以下情形无等待期：

1. 您重新投保本产品，并在上一个保险期间届满后 60 日内交纳保险费；
2. 您已经投保我们指定产品，并经我们同意首次投保本产品。

二、全球特药海外医疗费用保险金

在本产品保险期间内，若被保险人于等待期后被中国大陆境内医院专科医生首次确诊患有本产品定义的恶性肿瘤——重度，且该疾病所需用药符合本产品载明的《特定药品列表》及其对应适应症，并按照本产品“第十一条第一项全球特药海外医疗费用保险金理赔资格审核”的约定提交资格预评估及海外专家诊疗意见评估，在经我们理赔资格审核确认通过的前提下，我们对于在本产品约定的治疗期内被保险人经我们或指定的第三方服务供应商安排的、在海外医院发生的符合《特定药品列表》中对应适应症的用药并接受针对该恶性肿瘤——重度的治疗所产生的必须且合理的如下费用，依照下列约定在本产品的保险金额内按照 100%的比例赔付。

被保险人未通过理赔资格审核的或未经我们或指定的第三方服务供应商安排的保障区域内就医，对于发生的任何费用我们均不承担保险责任。

我们承担的费用包括医疗费用、交通费用、住宿费用和遗体送返费用，具体如下：

1. 医疗费用

（1）床位费

指被保险人在海外医院住院期间发生的不超过标准单人间标准的费用。

标准单人间病房指每一病房设一张病床加独立卫生间的单人病房，若某一海外医院的病房拥有两种或两种以上符合本产品上述定义的病房，则应按其中价格最低的病房计算床位费。若被保险人住院的病房的级别高于标准单人间病房的级别，则床位费以标准单人间的收费标准为最高限额。

（2）陪床费

指被保险人住院期间由海外医院为其陪同人员（限一名）提供床位产生的费用。

（3）膳食费

指根据医生的医嘱，由海外医院专设为住院病人配餐的食堂配送膳食的费用，不包括不在海外医院开具的医疗费用清单上的餐饮费用。

（4）护理费

指被保险人在海外医院住院期间由该医院执业护士根据医嘱所示的护理等级提供医疗护理所发生的费用。

（5）重症监护病房费

指被保险人在海外医院住院期间在重症监护室接受治疗而产生的床位费。重症监护室指配有中心监护台、心电监护仪及其他监护抢救设施，相对封闭管理，符合重症监护病房（ICU）、冠心病重症监护病房（CCU）标准的单人或多人监护病房。

（6）药品费

指被保险人在海外医院接受治疗过程中，在保障区域使用的根据医生处方开具的药品费用。

（7）检查检验费

指被保险人在海外医院进行检查及检验所导致的医疗费用，包括拍片费、心电图费、B 超费、脑电图费、内窥镜费、造影费、病理穿刺费、肺功能仪费、分子生化检验费和血、尿、便常规检验费等。

（8）治疗费

指被保险人在海外医院接受治疗所导致的技术劳务费、医疗器械使用费以及消耗品的费用，具体以海外医院的费用项目划分为准。本项责任不包含中医理疗、物理治疗及其他特殊疗法费用。

（9）海外转诊救护车费

指被保险人遵循医嘱且预先通过指定的第三方服务供应商批准使用的救护车在保障区域同一城市内进行转院或者运送时产生的费用。

（10）手术费

指被保险人在海外医院住院期间由医生在医院手术室内施行手术所收取的手术室费、手术材料费、术中用药费、麻醉费、手术监测费、手术设备使用费和手术操作费用的总和。

（11）门诊诊疗费

指被保险人在海外医院进行门诊治疗时，所发生的主诊医生或会诊医生的劳务费用，含挂号费、医生诊疗费或医事服务费。

（12）输血费

指被保险人在海外医院每次输血所实际发生的血浆费用、输血实施费用等。

（13）医学翻译费

指被保险人在海外医院就诊时与治疗相关的因医学翻译而产生的医学翻译费用。

（14）因治疗恶性肿瘤——重度而直接导致的急性危重并发症费用

指被保险人在海外医院因治疗恶性肿瘤——重度而直接导致的急性危重并发症的相关费用，且需同时满足以下两个条件：

1）被保险人遵医嘱需要立即在海外医院进行医疗处置；

2）治疗目的是使被保险人的身体状况满足归国行程所需。

不符合上述条件的治疗恶性肿瘤——重度导致的并发症费用或恶性肿瘤——重度本身的并发症治疗费用不在本产品保障范围内。

（15）骨髓移植(BMT)、外周血干细胞移植(PBSCT)捐赠者医疗费用

指骨髓或外周血干细胞捐赠者在被保险人接受骨髓移植(BMT)或外周血干细胞移植(PBSCT)过程中在海外医院发生的与骨髓移植或外周血干细胞移植直接相关的床位费、陪床费、膳食费、护理费、重症监护病房费、药品费、检查检验费、治疗费、手术费、门诊诊疗费、输血费、医学翻译费。

2. 交通费用

本项责任承担被保险人及一名陪同人员（如有），以治疗被保险人所罹患的符合本产品载明的《特定药品列表》对应的适应症的恶性肿瘤——重度为目的而前往保障区域所产生的，满足以下条件的交通费用，包括：

（1）从中国大陆境内常住地前往中国大陆境内指定机场或火车站的交通费用；

（2）从中国大陆境内指定机场或火车站前往治疗地的飞机、铁路的交通费用（飞机舱位以经济舱为限、铁路座位以二等座为限）；以及从治疗地指定机场或国际火车站到达治疗地指定酒店或医疗机构的交通费用；

（3）从保障区域治疗地指定酒店或指定医院到达治疗地指定机场或国际火车站的交通费用；

（4）从治疗地指定机场或国际火车站返回中国大陆境内指定机场或火车站的飞机、铁路的交通费用（飞机舱位以经济舱为限、铁路座位以二等座为限）；

（5）由中国大陆境内指定机场或火车站到达中国大陆境内常住地或医疗机构的交通费用。

未经我们认可的、由被保险人或其陪同人员自行做出的行程安排产生的费用或变更行程安排（包括出行日期或路线）而产生的相关费用，我们不予承担。

3. 住宿费用

本项责任承担被保险人及一名陪同人员（如有），因治疗被保险人所罹患的符合本产品载明的《特定药品列表》对应的适应症的恶性肿瘤——重度而在保障区域治疗城市所产生的，满足以下条件的住宿费用。

每一次治疗开始时间前一天至治疗结束时间后一天，在被保险人就诊的海外医院 10 公里以内的酒店产生的住宿费用（以 1 间标准不超过四星级酒店的双人标准间为限）。

住宿费用不包含除住宿费以外的酒店用餐、其他酒店费用以及因升级房间产生的费用。

未经我们认可的、由被保险人或其陪同人员自行做出的住宿安排产生的费用，或自行变更安排的酒店或安排的住宿日期而产生的相关费用，我们不予承担。

4. 遗体送返费用

若被保险人在海外医院因符合本产品载明的《特定药品列表》中对应的适应症的恶性肿瘤——重度而接受相关治疗过程中身故，我们承担将逝者遗体送返至中国大陆境内的费用，包括：

（1）进行国际遗体送返的殡葬公司提供的服务费用，包括在治疗地的防腐处理、当地火葬以及所有行政手续产生的费用；

（2）可容纳遗体的最小尺寸的灵柩或骨灰盒的费用；

（3）逝者遗体或骨灰从机场到达中国大陆境内指定地点的交通服务费用。

遗体送返费用不包括由于葬礼仪式或宗教仪式所产生的任何费用。

三、补偿原则

若被保险人已从其他途径（包括公费医疗、基本医疗保险、城乡居民大病保险、所有商业性费用补偿型医疗保险、其他政府机构或社会福利机构等）取得补偿，则我们所给付的各项补偿金最高不超过被保险人实际发生的以上各项费用扣除其所获补偿后的余额。

【责任免除】

因下列情形之一导致被保险人发生保险事故或造成费用支出的，我们不承担赔付全球特药海外医疗费用保险金的责任：

1. 既往症；

2. 投保人对被保险人的故意杀害、故意伤害；

3. 被保险人故意自杀或自伤、故意犯罪或者抗拒依法采取的刑事强制措施；

4.被保险人主动吸食或注射毒品；

5.核爆炸、核辐射与核污染、战争、军事冲突、恐怖袭击、暴乱或武装叛乱；

6.精神和行为障碍治疗（以世界卫生组织颁布的《疾病和有关健康问题的国际统计分类》第十次修订版（ICD-10）为准）；

7.遗传性疾病、先天性畸形、变形或染色体异常；

8.被保险人感染艾滋病病毒或患艾滋病期间的医疗费用；

9.姑息治疗、替代疗法、基因疗法、辅助疗法（如补钙、补充维生素等），再造手术、以及安全性和可靠性未经相关科学证明的诊断、治疗和外科手术所产生的任何费用；

10.预防性治疗、康复治疗（包括但不限于物理治疗、运动功能恢复、语言疗法等）或训练、休养或疗养、保健治疗、健康体检、医疗鉴定、美容整形；

11.被保险人接受实验性治疗（未经科学或医学认可的医疗）；

12.各类耐用医疗设备及相关耗材（如助听器、呼吸机、血压计、体温计、雾化器、胰岛素泵、胰岛素笔、血糖仪、血糖试纸、听诊器、肿瘤电场治疗仪及电场贴片等）的购买、租赁、维修和置换费用；各类为生活提供便利和舒适的设备（如轮椅、拐杖等各类助行器械、自动床、电话托臂、床上多用桌等其他类似设备）的购买、租赁、维修和置换费用；各类矫治器械和防护医疗器械（如矫形鞋垫、足弓支撑器、步行靴、或其他矫治器材）的购买、租赁、维修和置换费用；假体、人造部件或器官；

13.被保险人未经医生建议自行进行的任何治疗，或未遵书面医嘱私自服用、涂用、注射药物；–

14.未被治疗所在地政府监管机构批准或许可的治疗、药品或医疗器械；

15.未经执业药师配发或无医生处方的药品费用，滋补类中草药及其泡制的各类酒制剂涉及的药品费用；

16.除骨髓移植(BMT)、外周血干细胞移植(PBSCT)以外的器官移植所产生的相关费用；

17.被保险人在首次提交理赔申请之日(不含首次提交理赔申请当日)前12个月在中国大陆境内累计居住时间未超过180天的；若被保险人提交理赔申请时不满1周岁，被保险人在中国大陆境内累计居住时间少于自出生之日起至首次提交理赔申请之日（不含首次提交理赔申请当日）止累计日数的二分之一的。

除上述责任免除款项外，本产品还有一些免除本公司责任的条款，详见以下条款中加大加粗的内容：

“第七条 保险责任”

“第十条 保险事故通知”

“第十一条 保险金申请”

“第十六条 明确说明与如实告知”

“第十七条 年龄错误的处理”

“第二十二条 释义”

【投保年龄】

本产品的被保险人投保年龄为0**周岁**（须出生满7日）至65周岁，若您在被保险人66周岁至99周岁期间投保本产品的，需要满足如下两种情形之一：

1.您重新投保本产品，并在上一个保险期间届满后60日内交纳保险费；

2.您已经投保我们指定产品，并经我们同意首次投保本产品。

【保险金额】

本产品的保险金额为人民币400万元，保险金额载于本产品的保险单上，本产品的保险金额不得变更。

【保险期间】

本产品是不保证续保产品，本产品保险期间为一年。

保险期间届满，您需要重新向我们申请投保本产品，并经我们同意，交纳保险费，获得新的保险合同。若保险期间届满时，本产品已经停售，我们不再接受投保申请，但会向您提供转保建议。

【免赔额】

本产品不适用。

【等待期】

本产品生效日起30日内（含第30日）为本产品的等待期，我们对被保险人于上述期间确诊恶性肿瘤——重度而导致的医疗费用不承担保险责任，且对在上述期间后因该疾病而导致的医疗费用，我们也不承担保险责任。

以下情形无等待期：

1. 您重新投保本产品，并在上一个保险期间届满后60日内交纳保险费；
2. 您已经投保我们指定产品，并经我们同意首次投保本产品。

【投保年龄与保费高低具有关联性】

疾病发生率、医疗费用等保障利益和年龄密切相关，在不同年龄的发生率或者医疗费用各不相同。因此短期健康保险在每个年龄或年龄段对应不同保险费率。

本投保人已认真阅读以上须知，了解并知晓投保须知相关内容。

银行自动转账授权书

立授权书人（账户所有人）兹对签发保单机构（以下简称友邦人寿）及以下所选择银行（简称授权银行）/第三方支付机构授权如下：

1.立授权书人同意友邦人寿有权决定相关账户是否可作为授权账户。

2.立授权书人知晓并同意在办理非个人养老金保险的其他业务交易时，使用普通个人银行结算账户注1作为授权账户。

3.立授权书人如对同一保险合同有多次自动转账授权，以友邦人寿收到并同意之最后一次有效授权为准，且以前提供之转账授权自动作废，并不予退还授权书。最后一次付款授权因任何原因被友邦人寿拒绝受理，则以之前提供之付款转账授权为准；最后一次取款授权因任何原因被友邦人寿拒绝受理，则之前该客户的取款转账授权自动作废，需要重新办理授权。

4.立授权书人承诺所提供的账户确为立授权书人本人所有。若因该账户之真实性、完整性、准确性而引起任何纠纷，均与友邦人寿无关，由立授权书人承担一切责任。

5.立授权书人承诺本授权书为立授权书人的真实意愿，并完全知晓若因该委托授权产生的任何纠纷（包括但不限于授权无效、失效等）及法律后果均由立授权书人本人自行承担。

(一)支付保险费注2及保险合同相关费用注3的转账授权

6.立授权书人同意用于支付保险费及保险合同相关费用的自动转账授权账户应限于立授权书人本人，账户所有人应为立授权书人本人。

7.投保人支付保险费及保险合同相关费用的声明及承诺：

(1)立授权书人同意立授权书人应限于投保人、经投保人委托授权的被保险人，账户所有人也应限于投保人、经投保人委托授权的被保险人。

(2)若被保险人代为支付保险费及代为支付保险合同相关费用的，投保人在此明示同意并委托授权被保险人代其支付以下保险合同的保险费以及保险合同相关费用，且投保人承诺因代为支付保险费以及代为支付保险合同相关费用的委托授权产生的任何纠纷（包括但不限于授权无效、失效等）及法律后果（包括但不限于保险合同中止、终止等）由投保人自行承担。

(3)若投保人委托授权被保险人代为支付以下保险合同的保险费及保险合同相关费用的，则立授权书人也包含被保险人。

(4)若投保人委托授权被保险人代为支付以下保险合同的保险费及保险合同相关费用的，投保人承诺完全知晓友邦人寿对以下保险合同的各类通知均始终采取向投保人通知的方式，被保险人可通过投保人了解详情。

8.立授权书人同意授权友邦人寿与授权银行/第三方支付机构，依照银行相关转账要求，从立授权书人的授权银行个人银行结算账户内扣取下列保险合同的保险费以及保险合同相关费用。

9.立授权人同意友邦人寿通过授权银行/第三方支付机构扣取保险费时，按照立授权书人本人签约授权时确认的“单笔保险费最大金额”、“保险费最大代扣次数”、“《网上支付委托扣款服务三方协议》失效日期”（具体信息记载于系统签约环节的“参数详情”中）的限额、限次、协议有效期内扣取保险费，并最终以实际扣款金额、代扣次数、保险合同之交费期间（付费年限）为准。

10.立授权书人同意于友邦人寿的转账日期前将足额到期保险费存于账户内。如账户内无足够余额时，授权银行/第三方支付机构将不予转账，由此产生的相关责任由立授权书人承担；如所转账金额大于银行转账上限要求，同意并授权可将总金额拆分批次转账。若宽限期/保险期间届满后的六十天内已转账金额不足到期保险费，立授权书人同意友邦人寿将应已收款项无息退回。

YRM202410003

11.如初算/首期保险费转账不成功，立授权书人同意以其它方式进行支付；如在拒绝/延期投保/撤销投保申请/犹豫期撤销保险合同等情况下需退还已支付款项，立授权书人同意友邦人寿将应退还款项无息退回该账户。

12.立授权书人同意如投保人在保险费约定支付日/保险期间届满前无意通过本授权账户支付到期保险费的，投保人应于保险费约定支付日前十天向友邦人寿递交书面申请终止或变更自动转账付款授权。

(二)领取保险款项注 4 的转账授权

13.立授权书人限于保险合同应付保险款项的所有人本人，且立授权人同意用于领取该等保险款项的自动转账授权账户应限于立授权书人本人，账户所有人应为立授权书人本人。

14.立授权书人同意友邦人寿将以下保险合同应付的保险合同款项（例如退保费用、生存利益等）直接划入或通过第三方支付机构划入立授权书人之授权账户，并保证账户所有人须为应付款项的所有权人本人。

15.立授权书人同意若应付款项金额超过一定限额，或因账户终止、不符友邦人寿对应付款项银行给付的账户要求而导致给付不成功的，友邦人寿将改用其它方式发放应付款项。立授权书人可以致电友邦人寿客户服务热线 800-820-3588（固定电话），400-820-3588（手机用户）咨询最新的保险款项转账给付限额规定。

16.在任何情况下,若因友邦人寿给付款项的金额或给付对象等有误而导致账户所有人并非基于法律规定或合同约定收到该误付款项,则立授权书人同意无条件地及时返还全部误付之款项予友邦人寿。立授权书人同意友邦人寿不对账户的失窃或冒领负责。

注 1：普通个人银行结算账户，是区别于个人养老金资金账户的银行借记卡账户。

注 2：保险费，是指在保险合同的投保单/重新投保申请上所列的初算/首期保险费/趸交保险费、以及保险合同成立后的各期保险费。

注 3：保险合同费相关费用，指除保险费外，该保险合同的其他费用(如变更费用、还款费用等）。

注 4：领取保险款项，是指在保险合同项下的给付于领款人的各类款项（如退保费用、生存利益、理赔金等）。

附表：目前已开通可用于保险费及保险款项自动转账的银行包括但不限于以下列表

银行名称	银行名称	银行名称	银行名称
中国工商银行	中国农业银行	中国银行	中国建设银行
招商银行	中国邮政储蓄银行	中信银行	交通银行
上海银行	北京银行	华夏银行	广发银行
中国光大银行	兴业银行	浦发银行	平安银行

友情提醒：

根据央行银发[2017]281号文规定，自即日起，友邦人寿通过第三方支付机构（如广州银联/通联等）首次扣取保险费时，应先由持卡人完成《网上支付委托扣款服务三方协议》签约。

您可扫描所附二维码，识别您所授权的支付保险费账号是否属于上述协议签约范围，并根据提示完成协议签约。

如您的授权账号未完成协议签约，将会影响您的保险费扣款，敬请留意。

YRM202410003

（此　页　空　白）

客户须知及服务指南

一、投保须知

- 在您收到我公司签发的正式保险合同后，请仔细审阅合同内容（如您所申请的保险项目、保险费、合同生效日等），及个人资料有无错漏（如姓名、地址等）并请留意合同中对保险合同生效日的说明、责任免除事项、投保人解除合同处理、各种疾病和残疾程度的解释等条款。若您收到纸质合同，请立即检查保险合同是否装订完好和齐全。如有疑问，请及时向我公司询问。
- 若您的保险合同附有客户回执，在您认真核对及阅读并理解保险合同内容后，请在该保险合同的客户回执上亲自签收以确认收到保险合同，您也可登陆我公司官方App“友邦友享”进行线上回执签收。
- 我公司对新承保的一年期以上的个人人身保险产品以及特定产品进行100%回访，向投保客户确认是否知悉合同重要事项，提示享有的权利，切实维护客户合法权益。
- 请妥善保管好您的保险合同、付费凭证以及相关的文件资料，如有遗失，可以联系您的保险营销员或致电我公司客户服务热线咨询相关事宜，也可登录“友邦友享”App查看相关信息。
- 请您全面理解购买的产品，确定选择了适合的保险金额和保险期间，并根据自身的财务状况选择适合的保险金额及交费期间（付费年限），以避免日后因无法继续支付保险费而可能导致的保险合同效力中止/终止。
- 请谨记相应的保险责任和利益，如保险费的支付以及生存现金、年金、红利或满期金的领取等，同时我公司也会适时通过书面或其他方式提醒您办理相关事宜，若逾期未收到相关通知，也请您及时联系您的保险营销员或致电我公司客户服务热线咨询。
- 您向我公司递交的各类书面申请，都应有您本人的亲笔签名或亲自确认（保险合同条款另有约定的除外），并请留意您的签名应与保留在我公司的签名样本一致。

二、保险合同内容阅读须知

您可以通过我公司官网链接https://www.aia.com.cn/zh-cn/fuwu/baoxianhetongyueduxuzhi的“保险合同内容阅读须知”界面查询，亦可扫描右侧二维码直达链接。

保险合同内容阅读须知

三、保单服务及理赔须知

- **保单服务指南：**若您需缴纳续期保费、变更个人信息、变更保险合同内容、领取保险款项、或终止保险合同效力，您可以通过官网链接https://www.aia.com.cn/zh-cn/fuwu/fuwuzhinan的 “保单服务”界面查询，亦可扫描右侧二维码直达链接。
- **理赔服务指南：**若您需申请理赔，您可以通过官网链接https://www.aia.com.cn/zh-cn/fuwu/fuwuzhinan的“理赔服务”界面查询，亦可扫描右侧二维码直达链接。二级及二级以上的医院名单可通过官网链接https://www.aia.com.cn/zh-cn/fuwu/changyongchaxungongju/yiyuanchaxun的常见理赔医院查询界面进行查询。对于部分合同内所称“医院”之定义为“公司指定或认可”的保险产品，请参阅该产品的相关合同条款，敬请留意。

保单服务指南

理赔服务指南　　理赔常见医院

四、客户咨询渠道

- **若您对我们的服务有任何疑问、异议或投诉，您可以通过以下方式与我公司联系：**

a. 联系您的保险营销员。

b. 登录我公司官方App“友邦友享”咨询在线客服。

c. 致电客户服务热线： 400-820-3588(支持固话和手机) 或800-820-3588(免费、支持固话)。

d. 亲临我公司客户服务中心。我公司在中国大陆各分支机构的客户服务中心地址可通过官网链接www.aia.com.cn/zh-cn/zixun.html的“客户服务中心地址一览”界面查询，亦可扫描右侧二维码直达链接。

客户服务中心

- **客户服务热线服务时间：**

a. 自助语音查询：7*24小时。

b. 人工服务：周一至周五 9:00 - 19:00，周六和周日 9:00 - 17:30，国家法定节假日暂停。

- **“友邦友享”App服务时间：**

a. 智能客服：7*24小时。

b. 在线人工服务：周一至周日9:00 - 21:00，国家法定节假日暂停。

五、线上服务平台简介

诚挚地邀请您使用我公司线上服务平台，您将轻松享有全新的自助服务体验。

- **登录方法：**您可通过手机安装“友邦友享”App，注册登录后即享在线自助服务；亦可关注“友邦保险”官方微信使用“保单服务”，或通过手机、电脑浏览器直接访问“网上客户服务中心”网址：www.aia.com.cn，查询保单信息。

友邦友享　　官方微信

- **温馨提示：**为保证您的合法权益，建议您妥善保管您的登录信息，切勿向他人泄露登录账号或密码。网上客户服务中心及“友邦友享”App需要投/被保人激活之后方可使用（被保人需成年才可激活）。部分功能仅针对已认证的客户开放。持有**身份证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、港澳居民居住证、台湾居民居住证、外国人永久居留身份证、华侨护照**的客户可在线自助认证，其它证件类型客户请携带本人有效身份证件亲临我公司各服务中心办理认证手续。

六、服务承诺

为保障和提升消费者权益，我公司对销售、回访、承保、保全、理赔、投诉等各类服务制定了详细的服务承诺，相关承诺事项可通过官网链接https://www.aia.com.cn/zh-cn/fuwu/quanyifuwuchengnuo的“友邦人寿提升消费者权益服务承诺”界面查询，亦可扫描右侧二维码直达链接。

服务承诺

特别提醒：

本《客户须知及服务指南》不构成保险合同的一部分。

友邦人寿保留权利根据法律法规、监管要求或公司实际需要，对本《客户须知及服务指南》中的内容作出增添、修改、更新。

友邦人寿保险有限公司
收 款 凭 证

开具日期：2026年01月15日　　行业分类：金融保险　　凭证号码：　B030062767

100000
北京市朝阳区东三环南路５４号华腾园１２４１２

王硕

保险合同编号：H122717572

被保险人姓名：王硕

保险款项：人民币　（大写）壹佰贰拾玖元整

（小写）129.00

承保期间：2025/11/19--2026/11/19

保险营销员姓名：刘彦楚　　保险营销员编号：110381981/ G11003651

尊敬的客户：

感谢您及时缴纳保险费，如有疑问请及时与本公司联系。

2026年01月15日

温馨提示详见背页

温馨提示

根据财政部国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知(财税〔2016〕36号）》文件规定。2016年5月1日起我司将成为增值税纳税人并向客户开具增值税普通发票。由于增值税发票的管理较为严格，即日起我司会提供收款凭证作为您的付款证明，收款凭证同样是我司承认的一项收款单证。请您放心！收款单证类型不会影响到您的保障利益。同时，您也可以登录我司网上客户服务中心自助查询电子收款凭证。

如您对收款凭证有疑问或需要开具发票，可亲临分公司客户服务中心或致电客户服务热线咨询。

为支持环保事业，我司推荐您自助查询电子凭证。感谢您为环保贡献的每一分力。

咨询服务：

- 网上客户服务中心：您可以下载我司官方APP“友邦友享”、关注公司官方微信号“友邦保险”或登录我司官网（https://www.aia.com.cn）我的专区-网上客户服务中心自助查询。

  官方微信　　**“友邦友享”APP**

- 客户服务热线：800-820-3588(免费、支持固话)或400-820-3588(支持固话和手机)。