CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Copies d'un graphe : premier moment

Énoncé

Pour un graphe G, s_G et a_G sont ses nombres de sommets et d'arêtes. On fixe $G_0 = (S_0, A_0)$ avec $s_0 = s_{G_0} \geqslant 2$ et $a_0 = a_{G_0} \geqslant 1$, et on étudie la propriété $\mathcal{P}_n$: « contenir une copie de G_0 ». $X_n^0(G)$ est le nombre de copies de G_0 contenues dans G. On note :

- $\mathcal{C}_0$ l'ensemble des copies $H = (S_H, A_H)$ de G_0 avec $S_H \subset [\![1, n]\!]$;
- pour H avec $S_H \subset [\![1, n]\!]$, $X_H(G) = 1$ si $H \subset G$, 0 sinon ;
- $\omega_0 = \min\limits_{H \subset G_0,\ a_H \geqslant 1} \dfrac{s_H}{a_H}$.

1. Montrer que $E(X_H) = p_n^{a_H}$.
2. Soit S_0' un ensemble fixé de cardinal s_0, et c_0 le nombre de graphes de sommets S_0' qui sont des copies de G_0. Exprimer $|\mathcal{C}_0|$ à l'aide de c_0 et, avec un majorant simple de c_0, justifier que $|\mathcal{C}_0| \leqslant n^{s_0}$.
3. Exprimer X_n^0 à l'aide des X_H et montrer que $E(X_n^0) = \sum_{H \in \mathcal{C}_0} P(H \subset G) \leqslant n^{s_0} p_n^{a_0}$.
4. En déduire que si $p_n = o(n^{-\omega_0})$, alors $\lim P(X_n^0 > 0) = 0$. Indication : introduire $H_0 \subset G_0$ réalisant le minimum ω_0.

On suppose désormais que $\lim (n^{\omega_0} p_n) = +\infty$.

1. Montrer que

$$E((X_n^0)^2) = \sum_{(H,H') \in \mathcal{C}_0^2} P(H \cup H' \subset G) = \sum_{(H,H') \in \mathcal{C}_0^2} p_n^{2a_0 - a_{H \cap H'}}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Chaque arête est présente avec probabilité p_n, indépendamment (partie II).
- $H \subset G$: $S_H \subset S$ et $A_H \subset A$.

Ce qu'on te demande. Compter les copies de G_0 dans un graphe aléatoire. Si $p_n \ll n^{-\omega_0}$, même la partie la plus « dense » de G_0 n'apparaît pas.

Corrigé

Question 17

Étape 1. Comprendre les notations

Ce que dit l'énoncé :

- $\mathcal{C}_0$: toutes les copies de G_0 qu'on peut dessiner avec les sommets $1, \dots, n$;
- $X_H(G)$ vaut 1 si le graphe aléatoire G contient H (toutes les arêtes de H sont dans G), 0 sinon : c'est une variable indicatrice ;
- $X_n^0(G)$: le nombre de copies de G_0 dans G.

Exemple : G_0 = un triangle ($s_0 = 3$, $a_0 = 3$), $n = 4$. Les copies dans $\{1,2,3,4\}$ sont les 4 triangles $\{1,2,3\}$, $\{1,2,4\}$, $\{1,3,4\}$, $\{2,3,4\}$. $X_n^0(G)$ compte combien de ces triangles sont entièrement présents dans G.

Étape 2. Une intersection d'événements indépendants

Les sommets de H sont dans $\{1, \dots, n\}$, donc dans G. $H \subset G$ signifie seulement : toutes les arêtes de H sont présentes dans G, c'est-à-dire $X_{\{i,j\}}(G) = 1$ pour tout $\{i,j\} \in A_H$. C'est une intersection de a_H événements indépendants, chacun de probabilité p_n. L'espérance d'une indicatrice est la probabilité de l'événement :

$$E(X_H) = P(H \subset G) = \prod_{\{i,j\} \in A_H} P(X_{\{i,j\}} = 1) = p_n^{a_H}.$$

Exemple : un triangle donné est présent avec probabilité p_n^3.

Question 18

Étape 1. Compter les copies

Toute copie de G_0 a s_0 sommets. Choisir $H \in \mathcal{C}_0$, c'est choisir son ensemble de sommets S_H parmi les $\binom{n}{s_0}$ parties à s_0 éléments de $\{1, \dots, n\}$, puis une des c_0 copies ayant exactement ces sommets. Le nombre c_0 ne dépend pas de l'ensemble choisi (deux ensembles de même taille sont en bijection, on transporte les copies). Donc

$$|\mathcal{C}_0| = \binom{n}{s_0} c_0.$$

Exemple du triangle : $c_0 = 1$ (sur 3 sommets, un seul triangle), $|\mathcal{C}_0| = \binom{n}{3}$; pour $n = 4$, 4 .

Étape 2. Majorer

Par la définition d'une copie (partie I), une copie de G_0 de sommets S_0' est déterminée par une bijection $\varphi : S_0' \to S_0$ (ses arêtes sont les $\{s', t'\}$ avec $\{\varphi(s'), \varphi(t')\} \in A_0$). Il y a $s_0!$ bijections entre deux ensembles à s_0 éléments (plusieurs peuvent donner la même copie), donc $c_0 \leqslant s_0!$. Ainsi

$$|\mathcal{C}_0| \leqslant \binom{n}{s_0} s_0! = \frac{n!}{s_0!\,(n-s_0)!}\, s_0! = \frac{n!}{(n-s_0)!} = n(n-1)\cdots(n-s_0+1).$$

C'est un produit de s_0 facteurs, tous $\leqslant n$:

$$|\mathcal{C}_0| \leqslant n^{s_0}.$$

Question 19

Étape 1. Somme d'indicatrices

$X_n^0(G)$ compte les $H \in \mathcal{C}_0$ tels que $H \subset G$: on ajoute $X_H(G) = 1$ pour chaque copie présente, 0 pour les autres :

$$X_n^0 = \sum_{H \in \mathcal{C}_0} X_H.$$

Par linéarité de l'espérance et Q17 (chaque $H \in \mathcal{C}_0$ est une copie de G_0, donc a a_0 arêtes) :

$$E(X_n^0) = \sum_{H \in \mathcal{C}_0} E(X_H) = \sum_{H \in \mathcal{C}_0} P(H \subset G) = |\mathcal{C}_0|\, p_n^{a_0}.$$

Avec Q18 :

$$E(X_n^0) = \sum_{H \in \mathcal{C}_0} P(H \subset G) \leqslant n^{s_0} p_n^{a_0}.$$

Question 20

Étape 1. Le morceau le plus dense

Ce que dit l'énoncé : ω_0 est le plus petit rapport $\frac{s_H}{a_H}$ (sommets / arêtes) parmi les sous-graphes H de G_0 ayant au moins une arête. Un petit rapport = beaucoup d'arêtes pour peu de sommets : c'est le morceau **le plus dense**.

L'ensemble de ces H est fini et non vide (G_0 lui-même en fait partie), donc le minimum est atteint en un H_0. On note $\alpha = a_{H_0} \geqslant 1$ et $\sigma = s_{H_0}$, de sorte que $\sigma = \omega_0 \alpha$.

Soit Y_n le nombre de copies de H_0 dans G. Q19 appliquée à H_0 (à la place de G_0) donne :

$$E(Y_n) \leqslant n^{\sigma} p_n^{\alpha} = n^{\omega_0 \alpha} p_n^{\alpha} = \left(n^{\omega_0} p_n\right)^{\alpha}.$$

Étape 2. Conclure

$p_n = o(n^{-\omega_0})$ signifie $\frac{p_n}{n^{-\omega_0}} = n^{\omega_0} p_n \to 0$, donc $E(Y_n) \leqslant (n^{\omega_0} p_n)^{\alpha} \to 0$ (car $\alpha \geqslant 1$). Par Q11, $P(Y_n > 0) \leqslant E(Y_n) \to 0$.

Si G contient une copie de G_0, il contient aussi une copie de son morceau H_0 : $(X_n^0 > 0) \subset (Y_n > 0)$. Donc

$$0 \leqslant P(X_n^0 > 0) \leqslant P(Y_n > 0) \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

Pourquoi H_0 et pas G_0 ? Q19 donnerait seulement $n^{s_0} p_n^{a_0}$, qui peut ne pas tendre vers 0. Exemple : G_0 = quatre sommets tous reliés (6 arêtes) plus un cinquième sommet relié à l'un d'eux (7 arêtes). Pour G_0 entier, $\frac{s}{a} = \frac{5}{7}$; pour le bloc des quatre sommets, $\frac{4}{6} = \frac{2}{3} < \frac{5}{7}$. C'est ce bloc, plus dense, qui est le plus difficile à voir apparaître et qui fixe le seuil.

Question 21

Étape 1. Développer le carré

Le carré d'une somme est la somme de tous les produits deux à deux :

$$(X_n^0)^2 = \Big(\sum_{H \in \mathcal{C}_0} X_H\Big)\Big(\sum_{H' \in \mathcal{C}_0} X_{H'}\Big) = \sum_{(H,H') \in \mathcal{C}_0^2} X_H X_{H'}.$$

$X_H X_{H'}$ vaut 1 si et seulement si les deux valent 1 : c'est l'indicatrice de $(H \subset G) \cap (H' \subset G)$, c'est-à-dire de $(H \cup H' \subset G)$ (toutes les arêtes de H et de H' sont présentes). Par linéarité :

$$E((X_n^0)^2) = \sum_{(H,H') \in \mathcal{C}_0^2} P(H \cup H' \subset G).$$

Étape 2. Compter les arêtes de H ∪ H'

Par Q17, $P(H \cup H' \subset G) = p_n^{a_{H \cup H'}}$. Combien d'arêtes dans $H \cup H'$? En ajoutant $a_H + a_{H'}$, les arêtes communes sont comptées deux fois, on les retire une fois :

$$a_{H \cup H'} = a_H + a_{H'} - a_{H \cap H'} = 2a_0 - a_{H \cap H'},$$

où $H \cap H' = (S_H \cap S_{H'}, A_H \cap A_{H'})$. Exemple : deux triangles qui partagent une arête : $3+3-1 = 5$ arêtes.

$$E((X_n^0)^2) = \sum_{(H,H') \in \mathcal{C}_0^2} P(H \cup H' \subset G) = \sum_{(H,H') \in \mathcal{C}_0^2} p_n^{2a_0 - a_{H \cap H'}}.$$

Le piège

En Q20, appliquer directement Q19 à G_0 ne marche pas en général : $n^{s_0} p_n^{a_0}$ ne tend pas forcément vers 0. Il faut passer par le sous-graphe le plus dense H_0.

La méthode

Pour compter des motifs dans un graphe aléatoire : écrire le nombre de motifs comme une somme d'indicatrices, puis utiliser la linéarité de l'espérance.

Rappels de cours utilisés

- **Indépendance.**

$$Y_1, \dots, Y_m \text{ indépendantes } \implies P\Big(\bigcap_k (Y_k \in B_k)\Big) = \prod_k P(Y_k \in B_k).$$

Coalitions : $I \cap J = \emptyset$:

$$f((Y_i)_{i\in I}) \perp\!\!\!\perp g((Y_j)_{j\in J}).$$

- **Indicatrices.**

$$\mathbf{1}_A \mathbf{1}_B = \mathbf{1}_{A\cap B}, \qquad E(\mathbf{1}_A) = P(A), \qquad X \sim \mathcal{B}(p) \Rightarrow X = \mathbf{1}_{(X=1)}.$$