CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Une équation du troisième degré « autorécipro

Énoncé

Soit $a \in \mathbb{C}$ et $(E) : P(z) = z^3 + az^2 - \bar{a}z - 1 = 0$, de racines z_1, z_2, z_3 (comptées avec multiplicité).

1. Discuter le nombre de racines réelles selon que a est réel ou non.
2. Montrer que $P(z) = -z^3\,\overline{P(1/\bar{z})}$. En déduire que si z est racine, $\frac{1}{\bar{z}}$ aussi, avec la même multiplicité.
3. Calculer $z_1 z_2 z_3$ et $z_1 + z_2 + z_3$.
4. Montrer qu'une racine multiple est de module 1.
5. Montrer que (E) a toujours une racine de module 1.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- 0 n'est pas racine ($P(0) = -1$).

Ce qu'on te demande. Étudier les racines d'un polynôme à symétrie.

Corrigé

1. Racines réelles

- a réel : $P = (z-1)(z^2 + (a+1)z + 1)$; le trinôme a des racines réelles ssi $(a+1)^2 \geqslant 4$. Trois racines réelles (avec multiplicité) si $a \leqslant -3$ ou $a \geqslant 1$, une seule sinon.
- a non réel : $x(x+1) = 0$, $x = 0$ exclu, $x = -1$: $P(-1) = 2\,\mathrm{Re}\,a - 2$. Une racine réelle (-1) si $\mathrm{Re}\,a = 1$, aucune sinon.

2. La symétrie z ↦ 1/z̄

$\overline{P(1/\bar{z})} = \frac{1}{z^3} + \frac{\bar{a}}{z^2} - \frac{a}{z} - 1$, et $-z^3$ fois cela donne $z^3 + az^2 - \bar{a}z - 1 = P(z)$. Donc $P(z_0) = 0 \iff P(1/\bar{z}_0) = 0$, et en dérivant l'identité, les multiplicités sont les mêmes.

3. Relations coefficients-racines

$z_1 z_2 z_3 = -(-1) = 1$ et $z_1 + z_2 + z_3 = -a$.

4. Racine multiple

Sinon on aurait deux racines doubles distinctes : $4 > 3$ racines. Donc $|z_0| = 1$.

5. Toujours une racine de module 1

Si aucune racine n'avait module 1, les racines se regrouperaient en paires $\{z, \frac{1}{\bar{z}}\}$ distinctes, de même multiplicité : un total pair, alors que $\deg P = 3$. Donc une racine au moins est de module 1.

Exemple : $a = 0$: $z^3 = 1$, toutes de module 1.

Le piège

Oublier les multiplicités dans l'argument de parité.

La méthode

Polynôme vérifiant $P(z) = cz^n\overline{P(1/\bar{z})}$: ses racines sont symétriques par rapport au cercle unité.

Rappels de cours utilisés

- **Relations coefficients-racines.** Si $P = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0$ a pour racines $z_1, \ldots, z_n$ (avec multiplicité) :

$$z_1 + \cdots + z_n = -a_{n-1}, \qquad z_1 z_2 \cdots z_n = (-1)^n a_0.$$

- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.