CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Produit d'éléments d'ordres premiers entre eux

Énoncé

Soit G un groupe abélien (noté multiplicativement).

1. Soient $x, y \in G$ d'ordres m et n avec $m \wedge n = 1$. Montrer que $\langle x \rangle \cap \langle y \rangle = \{e\}$, puis que xy est d'ordre mn.
2. Donner un contre-exemple si $m \wedge n \neq 1$.
3. Soient $p \neq q$ premiers et G abélien d'ordre pq. Montrer que G contient un élément d'ordre p et un élément d'ordre q (on pourra raisonner par l'absurde avec un sous-groupe de la forme $\langle x \rangle \langle y \rangle$), puis que G est cyclique.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- G abélien : $(xy)^k = x^k y^k$.

Ce qu'on te demande. Trouver l'ordre de xy, puis fabriquer un générateur.

Corrigé

1. Intersection triviale

Soit $z \in \langle x \rangle \cap \langle y \rangle$. Son ordre divise m et n, premiers entre eux : il vaut 1, donc $z = e$.

2. L'ordre de xy

$(xy)^k = e \iff x^k = y^{-k}$. Ce dernier élément est dans $\langle x \rangle \cap \langle y \rangle = \{e\}$, donc $x^k = e$ et $y^k = e$: $m \mid k$ et $n \mid k$, soit $mn \mid k$ (car $m \wedge n = 1$). Réciproquement $(xy)^{mn} = e$.

$$m \wedge n = 1 \implies \text{ordre}(xy) = mn.$$

3. Contre-exemple

Dans $\mathbb{U}_4$, $x = i$ et $y = -i$ sont d'ordre 4, mais $xy = 1$ est d'ordre $1 \neq 16$.

4. Des éléments d'ordre p et q

Supposons qu'aucun élément ne soit d'ordre q ni pq : tous les éléments $\neq e$ sont d'ordre p. Soit $x \neq e$, $H = \langle x \rangle$ (p éléments) ; comme $pq > p$, il existe $y \notin H$, $K = \langle y \rangle$. $H \cap K$ est un sous-groupe de H distinct de H, donc $\{e\}$ (Lagrange). HK est un sous-groupe (groupe abélien) de cardinal p^2, qui doit diviser pq : impossible. Donc G a un élément d'ordre q ou pq (et dans ce dernier cas z^p est d'ordre q). De même pour p.

5. G est cyclique

Avec x d'ordre p et y d'ordre q, $p \wedge q = 1$, donc xy est d'ordre $pq = |G|$:

$$G \text{ abélien d'ordre } pq \implies G \text{ cyclique.}$$

Exemple : $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ est engendré par $\bar{1}$, et aussi par $\bar{3} + \bar{2} = \bar{5}$ (ordres 2 et 3).

Le piège

Oublier l'hypothèse « abélien » : sans elle, $(xy)^k \neq x^k y^k$ en général, et HK n'est pas forcément un sous-groupe.

La méthode

Pour l'ordre d'un produit : séparer les puissances (groupe abélien) et utiliser une intersection triviale.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de Lagrange.**

  $$H \text{ sous-groupe de } G \text{ fini} \implies |H| \text{ divise } |G|.$$

  Car G est réunion disjointe des classes xH, qui ont toutes $|H|$ éléments.

- **Ordre d'un élément.** L'ordre de x est le plus petit $m \geqslant 1$ tel que $x^m = e$. Alors :

  $$x^k = e \iff m \mid k, \qquad \text{ordre}\,(x^d) = \frac{m}{d} \quad (d \mid m).$$

  Dans un groupe fini, l'ordre divise le cardinal (Lagrange).

- **Lemme de Gauss et Bézout.**

  $$a \wedge b = 1 \iff \exists u, v \in \mathbb{Z},\ au + bv = 1, \qquad a \mid bc \text{ et } a \wedge b = 1 \Rightarrow a \mid c.$$

- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.

- **Groupe cyclique.** G fini est cyclique s'il est engendré par un seul élément, ce qui équivaut à :

$$\exists x \in G, \quad \text{ordre}(x) = |G|.$$

Exemple : $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$, $\mathbb{U}_n$. **Contre-exemple :** $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$, dont tous les éléments sont d'ordre $\leqslant 2$.