CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Les matrices de Hilbert sont définies positives

Énoncé

Soit $H_n = \left(\dfrac{1}{i+j-1}\right)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$.

1. Sur $\mathbb{R}_{n-1}[X]$, on pose $\langle P, Q\rangle = \int_0^1 PQ$. Montrer que H_n est la matrice de ce produit scalaire dans la base $(1, X, \dots, X^{n-1})$.
2. En déduire que H_n est symétrique définie positive.
3. Par le déterminant de Cauchy, montrer que $\det H_n = \dfrac{c_n^4}{c_{2n}}$ avec $c_n = \prod_{k=1}^{n-1} k!$.
4. Vérifier pour $n = 2$ et $n = 3$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_0^1 t^{i-1}t^{j-1}dt = \frac{1}{i+j-1}$.

Ce qu'on te demande. Positivité et déterminant d'une matrice célèbre.

Corrigé

1. Une matrice de Gram

$\langle X^{i-1}, X^{j-1}\rangle = \int_0^1 t^{i+j-2}dt = \frac{1}{i+j-1}$: c'est le coefficient (i,j) de H_n.

2. Définie positive

$X^\top H_n X = \int_0^1 P(t)^2 dt$ avec $P = \sum x_i t^{i-1}$. C'est $\geqslant 0$, et nul ssi $P = 0$ sur $[0,1]$, ssi $X = 0$.

$$H_n \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R}).$$

3. Le déterminant

Formule de Cauchy avec $a_i = i$, $b_j = j-1$: $a_j - a_i = b_j - b_i = j - i$, donc le numérateur vaut $\left(\prod_{i<j}(j-i)\right)^2 = c_n^2$. Pour le dénominateur, à i fixé, $\prod_{j=1}^{n}(i+j-1) = \frac{(i+n-1)!}{(i-1)!}$, puis

$$\prod_{i=1}^{n}(i+n-1)! = n!\,(n+1)!\cdots(2n-1)! = \frac{c_{2n}}{c_n}, \qquad \prod_{i=1}^{n}(i-1)! = c_n.$$

Le dénominateur vaut $\frac{c_{2n}}{c_n^2}$, d'où

$$\det H_n = \frac{c_n^2}{c_{2n}/c_n^2} = \frac{c_n^4}{c_{2n}}.$$

4. Vérifications

- $n = 2$: $\frac{1}{12} = 1 \cdot \frac{1}{3} - \frac{1}{4}$.
- $n = 3$: $\frac{2^4}{34560} = \frac{1}{2160}$, la valeur trouvée dans l'exercice du déterminant de Cauchy.

Le piège

Conclure « coefficients positifs donc matrice positive » : c'est faux en général ; ici c'est la structure de Gram qui donne la positivité.

La méthode

Une matrice $\left(\int f_i f_j\right)$ est une matrice de Gram : symétrique positive, définie si les f_i sont libres.

Rappels de cours utilisés

- **Matrices symétriques positives.**

$$A \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R}) \iff \forall X,\ X^\top A X \geqslant 0 \iff \mathrm{sp}(A) \subset \mathbb{R}_+.$$

- **Opérations sur les lignes et colonnes.**
  - $C_j \leftarrow C_j + \lambda C_k$ $(k \neq j)$ ne change pas le déterminant.
  - Factoriser un nombre λ dans une ligne ou une colonne : det est multiplié par λ.
  - Échanger deux lignes change le signe.

$$\det(\dots, C_j + \lambda C_k, \dots) = \det(\dots, C_j, \dots).$$