CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

# Choisir la valeur en (0,0) pour rendre f régulière

## Énoncé

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ et $f(x,y) = \dfrac{x^4}{x^2+y^2+xy}$ si $(x,y) \neq (0,0)$, $f(0,0) = \alpha$.

1. Montrer que $x^2+y^2+xy \geqslant \frac{1}{2}(x^2+y^2)$ pour tous $x, y$.
2. (a) Justifier que $f$ est définie sur $\mathbb{R}^2$.

   (b) Déterminer $\alpha$ pour que $f$ soit continue sur $\mathbb{R}^2$.
3. On suppose $\alpha = 0$.

   (a) Calculer les dérivées partielles sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$.

   (b) Calculer les dérivées partielles en $(0,0)$.

   (c) $f$ est-elle de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$ ?

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $D(x,y) = x^2+y^2+xy$.

**Ce qu'on te demande.** Régularité de $f$ en $(0,0)$ selon $\alpha$.

## Corrigé

### 1. L'inégalité

On calcule la différence :

$$x^2+y^2+xy-\frac{1}{2}(x^2+y^2) = \frac{1}{2}x^2+xy+\frac{1}{2}y^2 = \frac{1}{2}(x^2+2xy+y^2).$$

C'est $\frac{1}{2}(x+y)^2 \geqslant 0$.

$$x^2+y^2+xy \geqslant \frac{1}{2}(x^2+y^2).$$

### 2. Définition et continuité

Pour $(x,y) \neq (0,0)$, $D(x,y) \geqslant \frac{r^2}{2} > 0$ : $f$ est bien définie. Et

On note $r = \sqrt{x^2+y^2}$ ; alors $x^4 \leqslant r^4$ (car $|x| \leqslant r$), et le dénominateur est $\geqslant \frac{r^2}{2}$ :

$$|f(x,y)| \leqslant \frac{r^4}{r^2/2} = 2r^2 \xrightarrow[(x,y)\to(0,0)]{} 0.$$

$f$ est continue hors de l'origine (quotient), et en $(0,0)$ si et seulement si $f(0,0) = \lim f = 0$.

$$f \text{ continue sur } \mathbb{R}^2 \iff \alpha = 0.$$

### 3. Dérivées partielles hors de l'origine

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{4x^3 D - x^4(2x+y)}{D^2}, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{x^4(2y+x)}{D^2}.$$

### 4. En (0,0)

$\frac{f(t,0)-f(0,0)}{t} = \frac{t^4}{t^2 \cdot t} = t \to 0$ et $f(0,t) = 0$ :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0.$$

### 5. Continuité des dérivées partielles

Majorations :

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}\right| \leqslant \frac{4r^3 \cdot \frac{3}{2}r^2 + r^4 \cdot 3r}{r^4/4} = 36\,r, \qquad \left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \leqslant \frac{r^4 \cdot 3r}{r^4/4} = 12\,r.$$

Les deux tendent vers 0 : les dérivées partielles sont continues en $(0,0)$, et ailleurs par opérations.

$$f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2).$$

**Le piège**

Oublier de vérifier que le dénominateur ne s'annule pas hors de l'origine : c'est le rôle de la question 1.

**La méthode**

Minorer le dénominateur par $c\,r^2$, majorer le numérateur par une puissance de $r$, comparer les degrés.

## Rappels de cours utilisés

- **Continuité en (0,0).** On majore $|f(x,y) - f(0,0)|$ par une quantité qui tend vers 0, en fonction de $r = \sqrt{x^2+y^2}$ :

$$|x| \leqslant r, \qquad |y| \leqslant r, \qquad |xy| \leqslant \frac{r^2}{2}.$$

- **Dérivabilité et taux d'accroissement.**

$$f \text{ dérivable en } x_0 \iff \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} \text{ a une limite finie quand } x \to x_0.$$

Pour un point « spécial », on revient toujours à cette définition.

- **Fonctions de classe $\mathbf{C^1}$ de deux variables.**

$$f \in \mathcal{C}^1(U) \iff \frac{\partial f}{\partial x},\ \frac{\partial f}{\partial y} \text{ existent et sont continues sur } U.$$

Alors $f$ est différentiable. En $(0,0)$, il faut calculer les dérivées partielles par taux d'accroissement, puis vérifier que les formules trouvées ailleurs tendent vers ces valeurs.