CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Un système différentiel à matrice symétrique

Énoncé

1. Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

(a) Justifier sans calcul que A est diagonalisable.

(b) Déterminer ses valeurs propres et une base de vecteurs propres.

2. Résoudre le système $x' = 2x + z$, $y' = 3y$, $z' = x + 2z$, où x, y, z sont dérivables sur $\mathbb{R}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $X' = AX$ avec $X = (x, y, z)^\top$.

Ce qu'on te demande. Diagonaliser A pour découpler le système.

Corrigé

1. Symétrique

$A^\top = A$: A est symétrique réelle. Par le théorème spectral, elle est diagonalisable (et même dans une base orthonormée).

2. Valeurs propres

On développe selon la deuxième ligne, qui ne contient que $X - 3$:

$$\chi_A = \begin{vmatrix} X-2 & 0 & -1 \\ 0 & X-3 & 0 \\ -1 & 0 & X-2 \end{vmatrix} = (X-3)\begin{vmatrix} X-2 & -1 \\ -1 & X-2 \end{vmatrix} = (X-3)((X-2)^2 - 1).$$

Et $(X-2)^2 - 1 = (X-2-1)(X-2+1) = (X-3)(X-1)$:

$$\chi_A = (X-3)^2(X-1), \qquad \mathrm{sp}(A) = \{3, 1\}.$$

3. Vecteurs propres

$\lambda = 3$: $A - 3I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$. Le système se réduit à $-x + z = 0$: $z = x$, y libre. $E_3 = \text{Vect}\left((1,0,1),(0,1,0)\right)$, de dimension 2.

$\lambda = 1$: $A - I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Le système donne $x + z = 0$ et $2y = 0$: $E_1 = \text{Vect}(1,0,-1)$.

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \qquad D = \text{diag}(3,3,1), \qquad A = PDP^{-1}.$$

4. Écrire le système

Avec $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$, le système s'écrit $X' = AX$: la première ligne de A donne $2x + 0y + 1z$, etc.

5. Découpler

Changement d'inconnue : $Y = P^{-1}X$, soit $X = PY$. Comme P est constante, $X' = PY'$, et

$$PY' = AX = PDP^{-1}PY = PDY \iff Y' = DY.$$

D est diagonale : $y_1' = 3y_1$, $y_2' = 3y_2$, $y_3' = y_3$, d'où $y_1 = \alpha e^{3t}$, $y_2 = \beta e^{3t}$, $y_3 = \gamma e^{t}$. On revient à $X = PY$ (combinaison des colonnes de P) :

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \alpha e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta e^{3t} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \gamma e^{t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}.$$

Vérification : $x = \alpha e^{3t} + \gamma e^{t}$, $z = \alpha e^{3t} - \gamma e^{t}$, et $2x + z = 3\alpha e^{3t} + \gamma e^{t} = x'$.

Le piège

Oublier une constante : l'espace des solutions est de dimension 3.

La méthode

$X' = AX$ avec A diagonalisable : $X = \sum c_k e^{\lambda_k t} V_k$.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème spectral.**

$$A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \implies \exists P \in O_n(\mathbb{R}),\ P^\top A P \text{ diagonale.}$$

Une matrice symétrique réelle est diagonalisable dans une base orthonormée, et ses sous-espaces propres sont orthogonaux.

- **Systèmes différentiels linéaires.** Pour $X' = AX$ avec $A = PDP^{-1}$ ou $A = PTP^{-1}$: on pose $Y = P^{-1}X$, qui vérifie

$$Y' = DY \quad (\text{ou } Y' = TY).$$

On résout coordonnée par coordonnée (de bas en haut pour T), puis $X = PY$.