CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

# Interpolation de Lagrange

## Énoncé

Soient $a_0, \dots, a_n$ des réels deux à deux distincts.

1. Montrer que pour tous réels $b_0, \dots, b_n$, il existe un unique $P$ de degré $\leqslant n$ avec $P(a_i) = b_i$ pour tout $i$.
2. Pour $k \in [\![0, n]\!]$, expliciter ce polynôme, noté $L_k$, lorsque $b_i = 1$ si $i = k$ et $b_i = 0$ sinon.
3. Montrer que $\sum_{k=0}^{n} a_k^p L_k = X^p$ pour tout $p \in [\![0, n]\!]$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $n+1$ abscisses distinctes.

**Ce qu'on te demande.** Existence, unicité et forme explicite du polynôme interpolateur.

## Corrigé

### 1. Un isomorphisme

$\varphi$ est linéaire. Si $\varphi(P) = 0$, $P$ a $n+1$ racines distinctes avec $\deg P \leqslant n$ : $P = 0$. $\varphi$ est injective entre espaces de même dimension, donc bijective : pour tout $(b_i)$, un unique $P$ convient.

### 2. Les polynômes L_k

Forme :

$$L_k = \prod_{i \neq k} \frac{X - a_i}{a_k - a_i}.$$

Il est de degré $n$, vaut 0 en $a_i$ $(i \neq k)$ et 1 en $a_k$ ; par unicité, c'est le polynôme cherché.

### 3. Interpoler X^p

$Q = \sum_k a_k^p L_k$ est de degré $\leqslant n$ et $Q(a_i) = a_i^p$. $X^p$ aussi $(p \leqslant n)$. Par unicité :

$$\sum_{k=0}^{n} a_k^p L_k = X^p.$$

Pour $p=0$ : $\sum L_k = 1$. **Exemple** ($a=0,1,2$, $p=2$) : $L_1 + 4L_2 = -X(X-2)+2X(X-1) = X^2$.

**Le piège**

Oublier que $p \leqslant n$ dans la question 3 : pour $p > n$, $X^p$ n'est pas dans $\mathbb{R}_n[X]$ et l'égalité est fausse.

**La méthode**

Unicité par l'injectivité de l'évaluation ; égalités de polynômes par « mêmes valeurs en $n+1$ points ».

## Rappels de cours utilisés

- **Nombre de racines d'un polynôme.**

$$P \neq 0,\ \deg P \leqslant n \implies P \text{ a au plus } n \text{ racines.}$$

- **Isomorphisme en dimension finie.**

$$\dim E = \dim F < \infty \text{ et } \varphi \text{ linéaire injective} \implies \varphi \text{ isomorphisme.}$$

- **Polynômes interpolateurs de Lagrange.**

$$L_k = \prod_{i \neq k} \frac{X - a_i}{a_k - a_i}, \qquad L_k(a_i) = \delta_{ik}, \qquad P = \sum_k P(a_k) L_k \quad (\deg P \leqslant n).$$