CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Si f(x + 1) − f(x) → ℓ, alors f(x)/x → ℓ

Énoncé

Soit $f : [0, +\infty[\to \mathbb{R}$ continue telle que $f(x+1) - f(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} \ell \in \mathbb{R}$. Montrer que $\dfrac{f(x)}{x} \xrightarrow[x\to+\infty]{} \ell$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les « accroissements d'une unité » de f tendent vers ℓ.
- f continue.

Ce qu'on te demande. Montrer que f grandit à peu près comme ℓx.

Corrigé

1. Se ramener à $\ell = 0$

On remplace f par $x \mapsto f(x) - \ell x$: on peut supposer $\ell = 0$. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $A \geqslant 0$ tel que $|f(x+1) - f(x)| \leqslant \varepsilon$ pour tout $x \geqslant A$.

2. Reculer d'unité en unité

Soit $x \geqslant A$ et $n = \lfloor x - A \rfloor$, de sorte que $x - n \in [A, A+1[$. Par télescopage :

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \left(f(x-k) - f(x-k-1)\right) + f(x-n).$$

3. Majorer

Chaque $x-k-1$ est $\geqslant x-n \geqslant A$, donc chaque terme de la somme est $\leqslant \varepsilon$ en valeur absolue. Et $|f(x-n)| \leqslant M$. Par l'inégalité triangulaire :

$$|f(x)| \leqslant n\varepsilon + M \leqslant x\varepsilon + M.$$

4. Diviser par x

$$\left|\frac{f(x)}{x}\right| \leqslant \varepsilon + \frac{M}{x}.$$

Pour $x \geqslant A' = \frac{M}{\varepsilon}$, on a $\frac{M}{x} \leqslant \varepsilon$.

5. Conclusion

Pour $x \geqslant \max(A, A')$ et $x > 0$: $\left|\frac{f(x)}{x}\right| \leqslant 2\varepsilon$. Comme ε est quelconque, $\frac{f(x)}{x} \to 0$, ce qui donne le résultat pour ℓ quelconque.

Le piège

Oublier le terme $f(x-n)$ du télescopage : c'est lui qui demande la continuité sur $[A, A+1]$.

La méthode

Pour passer d'une information sur $f(x+1)-f(x)$ à $f(x)$, télescope depuis un segment fixe et majore terme à terme.

Rappels de cours utilisés

- **Définition quantifiée d'une limite finie en $+\infty$.** $f(x) \to \ell$ quand $x \to +\infty$ signifie : $\forall \varepsilon > 0,\ \exists A,\ \forall x \geqslant A,\ |f(x) - \ell| \leqslant \varepsilon$.
- **Somme télescopique.** $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} (u_{k+1} - u_k) = u_n - u_0$: tous les termes intermédiaires se simplifient.
- **Partie entière.** $\lfloor x \rfloor$ est l'unique entier n tel que $n \leqslant x < n+1$. On en déduit l'encadrement utile $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leqslant x$.
- **Inégalité triangulaire.** $|a+b| \leqslant |a| + |b|$, et plus généralement $|\sum a_k| \leqslant \sum |a_k|$.
- **Théorème des bornes atteintes.** Une fonction continue sur un segment $[a, b]$ est bornée et atteint son minimum et son maximum. L'image d'un segment est un segment.