CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Le maximum glissant est continu

Énoncé

Soit $f : [0, +\infty[\to \mathbb{R}$ continue. Pour $x \geqslant 0$, on pose $g(x) = \max_{t \in [0,x]} f(t)$. Montrer que g est définie, continue et croissante.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f continue sur $[0, +\infty[$.
- $g(x)$ est le plus grand des $f(t)$ pour t entre 0 et x.

Ce qu'on te demande. Trois propriétés : g existe, elle est croissante, elle est continue.

Corrigé

1. g est bien définie

Pour $x \geqslant 0$, f est continue sur le segment $[0, x]$: elle y atteint son maximum. $g(x)$ existe.

2. g est croissante

Si $x \leqslant y$, alors $[0, x] \subset [0, y]$: le maximum sur un ensemble plus grand est plus grand. Donc $g(x) \leqslant g(y)$. C'est un record glissant.

3. Continuité : deux cas

Soit $a > 0$ (le cas $a = 0$ se traite de même, à droite seulement). On a toujours $f(a) \leqslant g(a)$. On distingue $f(a) < g(a)$ et $f(a) = g(a)$.

4. Cas f(a) < g(a)

Par continuité de f, il existe $\alpha > 0$ tel que $f(x) < g(a)$ sur $[a - \alpha, a + \alpha]$. Le record $g(a)$ est atteint en un $t_0 < a - \alpha$. Pour x dans $[a - \alpha, a + \alpha]$, le record reste donc $g(a)$: g est constante près de a, donc continue en a.

5. Cas f(a) = g(a) : encadrer

Soit $\varepsilon > 0$. Par continuité de f, il existe $\alpha > 0$ avec $f(a) - \varepsilon \leqslant f(x) \leqslant f(a) + \varepsilon$ sur $[a - \alpha, a + \alpha]$.

- $g(a - \alpha) \geqslant f(a - \alpha) \geqslant g(a) - \varepsilon$.
- Sur $[0, a]$, $f \leqslant g(a)$, et sur $[a, a + \alpha]$, $f \leqslant g(a) + \varepsilon$. Donc $g(a + \alpha) \leqslant g(a) + \varepsilon$.

6. Cas f(a) = g(a) : conclure

g est croissante, donc pour tout $x \in [a-\alpha, a+\alpha]$:

$$g(a) - \varepsilon \leqslant g(a-\alpha) \leqslant g(x) \leqslant g(a+\alpha) \leqslant g(a) + \varepsilon.$$

C'est la définition de la continuité de g en a.

Le piège

Croire que le maximum glissant est continu « parce que f l'est », sans preuve : c'est vrai, mais il faut traiter le cas où le record est en train d'être battu.

La méthode

Pour une fonction croissante, il suffit de contrôler deux valeurs, en $a-\alpha$ et $a+\alpha$, pour encadrer tout ce qui est entre les deux.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème des bornes atteintes.** Une fonction continue sur un segment $[a, b]$ est bornée et atteint son minimum et son maximum. L'image d'un segment est un segment.
- **Opérations sur les fonctions continues.** Sommes, produits, quotients (dénominateur non nul) et composées de fonctions continues sont continues. Les fonctions usuelles sont continues sur leur domaine. $x \mapsto |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$.