CORRIGÉ · EXERCICE · COMMANDO X-ENS MP

L'adhérence d'une boule ouverte est dans la boule fermée

Énoncé

Soit (E, d) un espace métrique, $a \in E$ et $r > 0$. Montrer que

$$\overline{B(a,r)} \subset B_f(a,r).$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $B(a,r) = \{x : d(a,x) < r\}$, la boule ouverte.
- $B_f(a,r) = \{x : d(a,x) \leqslant r\}$, la boule fermée.

Ce qu'on te demande. Montrer que tout point adhérent à la boule ouverte est dans la boule fermée.

Corrigé

1. La stratégie

On ne calcule pas l'adhérence directement. On utilise sa propriété clé : c'est le plus petit fermé contenant la boule. Il suffit donc de montrer deux choses :

1. $B(a,r) \subset B_f(a,r)$;
2. $B_f(a,r)$ est un fermé.

2. La première inclusion

Si $x \in B(a,r)$, alors $d(a,x) < r$, donc a fortiori $d(a,x) \leqslant r$: $x \in B_f(a,r)$.

3. Ce qu'il faut prouver pour « fermé »

Par définition, $B_f(a,r)$ est fermée si son complémentaire $U = \{x \in E : d(a,x) > r\}$ est ouvert. On doit donc trouver, autour de chaque point de U, une boule entièrement contenue dans U.

4. Choisir le rayon

Soit $x \in U$. On pose $\rho = d(a,x) - r$, qui est > 0 car $x \in U$. C'est la marge dont on dispose.

5. La boule reste dans U

Soit $y \in B(x,\rho)$, donc $d(x,y) < \rho$. Par l'inégalité triangulaire renversée :

$$d(a,y) \geqslant d(a,x) - d(x,y) > d(a,x) - \rho = r.$$

Donc $y \in U$. Ainsi $B(x,\rho) \subset U$: U est ouvert, et $B_f(a,r)$ est fermée.

6. Conclusion

$B_f(a,r)$ est un fermé qui contient $B(a,r)$. Comme $\overline{B(a,r)}$ est le plus petit fermé contenant $B(a,r)$:

$$\overline{B(a,r)} \subset B_f(a,r).$$

Le piège

Croire que l'égalité $\overline{B(a,r)} = B_f(a,r)$ est toujours vraie : elle est fausse dans certains espaces métriques (voir l'exercice suivant).

La méthode

Pour montrer $\overline{A} \subset F$: montrer que $A \subset F$ et que F est fermé. C'est souvent bien plus simple que de décrire $\overline{A}$.

Rappels de cours utilisés

- **Adhérence.** $\overline{A}$ est le plus petit fermé contenant A : si F est fermé et $A \subset F$, alors $\overline{A} \subset F$. On a les équivalences

  $$x \in \overline{A} \iff \forall \varepsilon > 0,\ B(x,\varepsilon) \cap A \neq \emptyset \iff d(x,A) = 0.$$

  Si F est fermé, $\overline{F} = F$.

- **Ouvert et fermé.** Ω est ouvert si pour tout $x \in \Omega$, il existe $\rho > 0$ avec $B(x,\rho) \subset \Omega$. F est fermé si son complémentaire $E \setminus F$ est ouvert.

- **Inégalité triangulaire renversée.** Pour tous x, y, z : $|d(x,z) - d(y,z)| \leqslant d(x,y)$. En particulier $d(a,y) \geqslant d(a,x) - d(x,y)$.