CORRIGÉ · EXERCICE · COMMANDO X-ENS MP

Une fonction uniformément continue est sous-affine

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ uniformément continue. Montrer qu'il existe $\alpha, \beta > 0$ tels que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad |f(x)| \leqslant \alpha x + \beta.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f est uniformément continue sur $[0, +\infty[$.

Ce qu'on te demande. Majorer $|f(x)|$ par une fonction affine de x, avec des constantes qui ne dépendent pas de x.

Corrigé

1. L'idée

La continuité uniforme fournit un pas fixe η sur lequel f bouge peu. Pour aller de 0 à x, il faut environ $\frac{x}{\eta}$ pas : f varie donc au plus d'environ $\frac{x}{\eta}$. D'où une borne affine.

2. Le pas η

On applique la définition avec $\varepsilon = 1$: il existe $\eta_0 > 0$ tel que $|x - y| < \eta_0 \implies |f(x) - f(y)| < 1$. On pose $\eta = \frac{\eta_0}{2}$. Alors

$$\forall x, y \geqslant 0, \quad |x - y| \leqslant \eta \implies |f(x) - f(y)| \leqslant 1. \qquad (*)$$

3. Découper [0, x]

Soit $x \geqslant 0$. On pose $n = \left\lfloor \frac{x}{\eta} \right\rfloor$, de sorte que $n\eta \leqslant x < (n+1)\eta$. On écrit $f(x) - f(0)$ comme une somme télescopique :

$$f(x) - f(0) = (f(x) - f(n\eta)) + \sum_{k=0}^{n-1} (f((k+1)\eta) - f(k\eta)).$$

4. Majorer chaque morceau

Deux points consécutifs $k\eta$ et $(k+1)\eta$ sont à distance η, et $0 \leqslant x - n\eta < \eta$. D'après $(*)$, chacun des $n+1$ morceaux vaut au plus 1 en valeur absolue :

$$|f(x) - f(0)| \leqslant 1 + n.$$

5. Faire apparaître x

Comme $n \leqslant \frac{x}{\eta}$:

$$|f(x)| \leqslant |f(0)| + |f(x) - f(0)| \leqslant |f(0)| + 1 + \frac{x}{\eta}.$$

6. Conclusion

Avec $\alpha = \frac{1}{\eta} > 0$ et $\beta = |f(0)| + 1 > 0$, qui ne dépendent pas de x :

$$\forall x \geqslant 0, \quad |f(x)| \leqslant \alpha x + \beta.$$

Le piège

Utiliser seulement la continuité : le pas η dépendrait alors du point, et on ne pourrait pas compter les sauts. D'ailleurs $x \mapsto x^2$ est continue mais pas sous-affine.

La méthode

La continuité uniforme donne un pas universel : pour contrôler f loin, on avance pas à pas et on télescope.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité uniforme.** f est uniformément continue si $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \alpha > 0,\ \forall x, y,\ d(x,y) < \alpha \implies d'(f(x), f(y)) < \varepsilon$. Le α est le même pour tous les points : c'est toute la différence avec la continuité.
- **Partie entière.** $\lfloor x \rfloor$ est l'unique entier n tel que $n \leqslant x < n+1$. On en déduit l'encadrement utile $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leqslant x$.
- **Somme télescopique.** $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} (u_{k+1} - u_k) = u_n - u_0$: tous les termes intermédiaires se simplifient.
- **Inégalité triangulaire.** $|a+b| \leqslant |a| + |b|$, et plus généralement $\left|\sum a_k\right| \leqslant \sum |a_k|$.