CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Diagramme potentiel-pH du manganèse

Énoncé

Diagrammes potentiel-pH superposés du manganèse (traits fins, domaines numérotés de 1 à 6) et de l'éthanol (traits épais : CH_3COOH, CH_3COO^-, CH_3CH_2OH). Concentration totale en espèces dissoutes $C = 10^{-2}$ mol · L^{-1} ; égalité des concentrations aux frontières entre deux espèces dissoutes. Sur le graphique : la frontière entre les domaines 3 et 4 part de $E \approx 1{,}3$ V à pH $= 0$; le domaine 2 est un petit domaine vers pH ≈ 14.

1. Associer aux domaines les espèces Mn, MnO_2, $Mn(OH)_2$, Mn^{2+}, MnO_4^- et MnO_4^{2-}, en justifiant, avec le nombre d'oxydation de chacune.
2. Déterminer l'équation de la frontière verticale entre l'espèce 4 et l'espèce 5.
3. Donner l'équation de la frontière verticale entre CH_3COOH et CH_3COO^-, et celle de la frontière entre CH_3COOH et CH_3CH_2OH.
4. Avec le graphique, déterminer $E^\circ(MnO_2/Mn^{2+})$.
5. Donner, en justifiant, la configuration électronique de Mn^{2+}.

Données : $Z(\text{Mn}) = 25$, $Z(\text{Rh}) = 45$; $M(\text{Rh}) = 103$, $M(\text{C}) = 12$, $M(\text{O}) = 16$, $M(\text{H}) = 1{,}0$ g · mol^{-1} ; $N_A = 6{,}0 \times 10^{23}$ mol^{-1} ; $R = 8{,}3$ J · K^{-1} · mol^{-1} ; $F = 96\,500$ C · mol^{-1} ; $\frac{RT}{F}\ln 10 = 0{,}06$ V ; $\sqrt{2} \approx \frac{10}{7}$, $\sqrt{3} \approx \frac{7}{4}$; une courbe de $\ln x$ pour $x \in [1, 10]$ est fournie.

à 298 K	$\Delta_f H^\circ$ (kJ/mol)	S_m° (J/K/mol)	$C_{p,m}^\circ$ (J/K/mol)
C_2H_5OH(g)	−235	283	
C_2H_5OH( )	−277	161	112
O_2(g)	0	205	29
CO_2(g)	−394	214	37
H_2O(g)	−242	189	34
H_2O( )	−286	70	75

$C_6H_{12}O_6(s) + 6\,O_2(g) \to 6\,CO_2(g) + 6\,H_2O(g)$: $\Delta_{comb}H^\circ = -2816$ kJ · mol^{-1}. p$K_s(Mn(OH)_2) = 12{,}7$; $K_e = 10^{-14}$; p$K_a(CH_3COOH/CH_3COO^-) = 4{,}8$; $E^\circ(CH_3COOH/CH_3CH_2OH) = 0{,}037$ V, $E^\circ(O_2/H_2O) = 1{,}23$ V.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Frontières entre espèces dissoutes : concentrations égales ; frontière d'apparition d'un solide : l'espèce dissoute est à $C = 10^{-2}$ mol · L^{-1}.

Ce qu'on te demande. Placer les espèces, calculer des frontières, lire un potentiel standard.

Corrigé


Question 7

Étape 1. Q7. Nombres d'oxydation et placement des espèces

Nombres d'oxydation (l'oxygène compte −II, l'hydrogène +I, la somme vaut la charge) :

- Mn : 0 ;
- Mn^{2+} : +II ; $Mn(OH)_2$: $x + 2(-2+1) = 0$, donc +II ;
- MnO_2 : $x + 2(-2) = 0$, donc +IV ;
- MnO_4^{2-} : $x + 4(-2) = -2$, donc +VI ;
- MnO_4^- : $x + 4(-2) = -1$, donc +VII.

Placement : le n.o. croît quand E augmente. Tout en bas (6) : Mn. Au-dessus, deux espèces au n.o. +II séparées par une verticale : l'ion libre Mn^{2+} en milieu acide (4), l'hydroxyde $Mn(OH)_2$ en milieu basique (5). Ensuite MnO_2 (3), puis MnO_4^- en haut (1). Le petit domaine (2) en milieu très basique est MnO_4^{2-}, stable seulement à pH élevé.



En bleu (traits fins) le manganèse, en noir épais l'éthanol. Le nombre d'oxydation croît de bas en haut ; le pH croissant favorise les espèces basiques (hydroxyde, anion).

(1) MnO_4^-, (2) MnO_4^{2-}, (3) MnO_2, (4) Mn^{2+}, (5) $Mn(OH)_2$, (6) Mn.

Question 8

Étape 1. Q8. Frontière \{}mathrm{Mn^{2+}} / \{}mathrm{Mn(OH)_2}

Équilibre : $Mn(OH)_2(s) \rightleftharpoons Mn^{2+} + 2\,HO^-$, de constante $K_s = 10^{-12,7}$.

À la frontière, le précipité apparaît juste, avec $[Mn^{2+}] = C = 10^{-2}$ mol · L^{-1} :

$$[HO^-]^2 = \frac{K_s}{C} = \frac{10^{-12,7}}{10^{-2}} = 10^{-10,7} \quad \Longrightarrow \quad [HO^-] = 10^{-5,35}.$$

Avec $K_e = [H_3O^+][HO^-] = 10^{-14}$: $[H_3O^+] = 10^{-14+5,35} = 10^{-8,65}$.

$$\mathrm{pH} = 8{,}65.$$

Question 9

Étape 1. Q9. Les frontières de l'éthanol

Frontière CH_3COOH/CH_3COO^- (même n.o., échange de H^+) : $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$, et à la frontière les deux concentrations sont égales :

$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a = 4{,}8.$$

Frontière CH_3COOH/CH_3CH_2OH (pour pH $< 4{,}8$). Demi-équation : C passe de $-$I à $+$III pour le carbone fonctionnel, soit 4 électrons :

$$CH_3COOH + 4\,H^+ + 4\,e^- \rightleftharpoons CH_3CH_2OH + H_2O.$$

Nernst : $E = 0{,}037 + \frac{0{,}06}{4} \log \frac{[CH_3COOH][H^+]^4}{[CH_3CH_2OH]}$. À la frontière, concentrations égales, et $\frac{0{,}06}{4} \times 4 \log[H^+] = -0{,}06\,\mathrm{pH}$:

$$E = 0{,}037 - 0{,}06\,\mathrm{pH} \qquad (\mathrm{pH} < 4{,}8).$$

Question 10

Étape 1. Q10. Potentiel standard de \{}mathrm{MnO_2/Mn^{2+}}

Demi-équation : $\mathrm{MnO_2 + 4\,H^+ + 2\,e^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 2\,H_2O}$ (Mn passe de +IV à +II).

Nernst ($\mathrm{MnO_2}$ solide et eau d'activité 1) :

$$E = E^\circ + \frac{0{,}06}{2}\log\frac{[\mathrm{H^+}]^4}{[\mathrm{Mn^{2+}}]} = E^\circ - 0{,}12\,\mathrm{pH} - 0{,}03\log[\mathrm{Mn^{2+}}].$$

Sur la frontière, $[\mathrm{Mn^{2+}}] = C = 10^{-2}$, donc $-0{,}03\log 10^{-2} = +0{,}06$: $E = E^\circ + 0{,}06 - 0{,}12\,\mathrm{pH}$.

Lecture : $E = 1{,}3$ V à pH $= 0$, donc

$$E^\circ(\mathrm{MnO_2/Mn^{2+}}) = 1{,}3 - 0{,}06 \approx 1{,}24\ \mathrm{V}.$$

(La valeur tabulée est 1,23 V : la lecture est bonne.)

Question 11

Étape 1. Q11. Configuration de \{}mathrm{Mn^{2+}}

Atome ($Z = 25$), règle de Klechkowski (remplissage $1s\,2s\,2p\,3s\,3p\,4s\,3d$), Pauli (2 électrons au plus par orbitale) :

$$\mathrm{Mn} : 1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,4s^2\,3d^5 = [\mathrm{Ar}]\,4s^2\,3d^5.$$

Ion : on retire d'abord les électrons de nombre quantique principal le plus grand, ici les deux électrons $4s$:

$$\mathrm{Mn^{2+}} : 1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6\,3d^5 = [\mathrm{Ar}]\,3d^5.$$

La sous-couche $3d$ est à moitié remplie (5 électrons de spins parallèles, règle de Hund) : configuration particulièrement stable, ce qui explique la grande stabilité de $\mathrm{Mn^{2+}}$.

Le piège

En Q10, oublier le terme en $\log[\mathrm{Mn^{2+}}]$: avec $C = 10^{-2}$, il décale la frontière de +0,06 V.

La méthode

Diagramme E-pH : n.o. de bas en haut ; frontières verticales par K_a ou K_s ; frontières obliques par Nernst avec la convention de tracé.

Rappels de cours utilisés

- **Lire un diagramme potentiel-pH.**
  - E croissant $\Rightarrow$ nombre d'oxydation croissant ;
  - frontière verticale : acide (gauche) / base, ion (gauche) / précipité ;

> domaines disjoints $\implies$ réaction favorable.

- **Formule de Nernst.** $\alpha\,\mathrm{Ox} + m\,\mathrm{H^+} + n\,e^- \rightleftharpoons \beta\,\mathrm{Red}$, à 298 K :

$$E = E^\circ + \frac{0{,}06}{n}\log\frac{[\mathrm{Ox}]^\alpha[\mathrm{H^+}]^m}{[\mathrm{Red}]^\beta}.$$

$$a(\text{solide}) = a(\mathrm{H_2O}) = 1.$$

- **Configuration électronique.**

$$1s\ 2s\ 2p\ 3s\ 3p\ 4s\ 3d\ 4p\ 5s\ 4d\ldots \qquad (n+\ell\nearrow,\ \text{puis } n\nearrow).$$

  - Pauli : $\leqslant 2$ électrons par orbitale ;
  - Hund : spins parallèles à énergie égale ;
  - cation de transition : retirer $4s$ avant $3d$.