CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Le modèle d'Ising : la matrice de transfert

Énoncé

Cadre. $n \geqslant 2$, $\beta > 0$, $\Lambda_n = \{-1, 1\}^n$, J_n symétrique et $H_n(h, x) = -\frac{\beta}{2}\sum_{i,j} J_n(i,j)x_i x_j - h\sum_i x_i$. Le vecteur aléatoire $(X_{n,1}, \dots, X_{n,n})$ suit la loi $P(X_{n,1} = x_1, \dots, X_{n,n} = x_n) = \dfrac{e^{-H_n(h,x)}}{Z_n(h)}$, avec $Z_n(h) = \sum_{y\in\Lambda_n} e^{-H_n(h,y)}$.

On pose $M_{n,h} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_{n,i}$, $m_n(h) = E(M_{n,h})$, $\psi_n(h) = \frac{1}{n}\ln Z_n(h)$, et m, ψ leurs limites simples (sous réserve d'existence) : la **magnétisation** et la **pression**.

I – Magnétisation spontanée

1. Justifier que la fonction ψ_n est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et que $\psi_n' = m_n$.

On admet que, lorsque ψ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$, $\psi' = m$ sur $\mathbb{R}_+^*$. On note $m_+ = \lim_{h\to 0^+} m(h)$ la magnétisation spontanée.

II – Le modèle d'Ising

On suppose $J_n = J_n^{(1)}$ (sous-partie A-IV). Convention : $x_{n+1} = x_1$ et $x_0 = x_n$.

1. Vérifier que $Z_n(h) = \displaystyle\sum_{x\in\Lambda_n}\prod_{i=1}^n e^{\beta x_i x_{i+1} + h x_i}$.
2. Montrer que, pour tous entiers $p, q \geqslant 2$, toute $M \in \mathcal{M}_q(\mathbb{R})$ et tout (i,j), le coefficient (i,j) de M^p est $\displaystyle\sum_{(k_2,\dots,k_p)\in[\![1,q]\!]^{p-1}} M(i,k_2)\Big(\prod_{r=2}^{p-1} M(k_r,k_{r+1})\Big)M(k_p,j)$, le produit valant 1 si $p = 2$.

On pose $A = \begin{pmatrix} e^{\beta-h} & e^{-\beta-h} \\ e^{-\beta+h} & e^{\beta+h}\end{pmatrix}$.

1. Montrer que $Z_n(h) = \operatorname{tr}(A^n)$.
2. Déterminer les valeurs propres de la matrice A.
3. Montrer que $\psi_n(h) \xrightarrow[n\to+\infty]{} \ln\left(e^\beta \operatorname{ch}(h) + \sqrt{e^{2\beta}\operatorname{ch}^2(h) - 2\operatorname{sh}(2\beta)}\right)$.
4. En déduire une expression de la fonction m et conclure que $m_+ = 0$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $Z_n(h)$ est une somme finie de 2^n exponentielles.
- $J_n^{(1)}(i,j) = 1$ si $j = i \pm 1$ (modulo n), 0 sinon.

Ce qu'on te demande. Calculer la pression du modèle d'Ising en dimension 1 grâce à une matrice 2×2, et montrer qu'il n'y a pas d'aimantation sans champ extérieur.

Corrigé

Question 18

Étape 1. Dérivabilité

*Le coup d'œil. Z_n est une somme **finie** d'exponentielles de fonctions affines de h, strictement positive.*

Ce que dit l'énoncé : $\psi_n(h) = \frac{1}{n}\ln Z_n(h)$ et $Z_n(h) = \sum_{y\in\Lambda_n} e^{-H_n(h,y)}$, somme sur les 2^n configurations : c'est une somme **finie**.

Pour chaque x fixé, $H_n(h,x)$ est de la forme $a - bh$ (avec a, b qui dépendent de x mais pas de h) : une fonction affine de h. Donc $h \mapsto e^{-H_n(h,x)}$ est dérivable. Z_n est une somme finie de telles fonctions, strictement positive : $\psi_n = \frac{1}{n}\ln Z_n$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+$.

Étape 2. Reconnaître une espérance

Le coup d'œil. Dériver $e^{-H_n(h,x)}$ fait descendre $\sum x_i$. Puis formule de transfert.

Dans H_n, le seul terme qui contient h est $-h\sum_i x_i$, donc $\frac{\partial}{\partial h}(-H_n(h,x)) = \sum_i x_i$. Et $(e^f)' = f'e^f$: $Z_n'(h) = \sum_x \Big(\sum_i x_i\Big) e^{-H_n(h,x)}$. Avec $(\ln Z)' = \frac{Z'}{Z}$:

$$\psi_n'(h) = \frac{1}{n}\frac{Z_n'(h)}{Z_n(h)} = \sum_{x\in\Lambda_n} \frac{1}{n}\Big(\sum_i x_i\Big)\frac{e^{-H_n(h,x)}}{Z_n(h)} = \sum_{x\in\Lambda_n} \frac{1}{n}\Big(\sum_i x_i\Big) P((X_{n,i})_i = x).$$

On reconnaît dans $\frac{e^{-H_n(h,x)}}{Z_n(h)}$ la probabilité de la configuration x. **Formule de transfert** : pour $Y = f(X)$ avec X à valeurs dans un ensemble fini, $E(f(X)) = \sum_x f(x)P(X = x)$. Avec $f(x) = \frac{1}{n}\sum x_i$:

$$\psi_n'(h) = E\Big(\frac{1}{n}\sum_i X_{n,i}\Big) = E(M_{n,h}) = m_n(h).$$

Question 19

Étape 1. Calculer la double somme

Le coup d'œil. Dans la ligne i de $J_n^{(1)}$, seuls les voisins $i \pm 1$ comptent.

On prend ici H_n avec $J_n = J_n^{(1)}$ (partie A-IV) : $J_n^{(1)}(i,j) = 1$ si $j = i \pm 1$ (en tournant), 0 sinon. La convention $x_{n+1} = x_1$, $x_0 = x_n$ exprime justement que le voisin de n est 1.

$\sum_{i,j} J_n^{(1)}(i,j) x_i x_j = \sum_{i=1}^n x_i(x_{i+1} + x_{i-1})$, avec la convention cyclique. En réindexant $i-1 \to i$ dans la seconde somme, $\sum_i x_i x_{i-1} = \sum_i x_{i+1} x_i$, donc

$$\sum_{i,j} J_n^{(1)}(i,j) x_i x_j = 2 \sum_{i=1}^n x_i x_{i+1}.$$

(Pour $n = 2$, $J_2^{(1)} = 2C_{2,1}$ et la formule reste vraie : $4x_1x_2$ des deux côtés.)

Étape 2. Transformer en produit

Le coup d'œil. L'exponentielle d'une somme est le produit des exponentielles.

On reporte dans H_n : le $-\frac{\beta}{2}$ et le 2 se simplifient. Donc $-H_n(h,x) = \beta \sum_i x_i x_{i+1} + h \sum_i x_i = \sum_{i=1}^n (\beta x_i x_{i+1} + h x_i)$, et

$$Z_n(h) = \sum_{x \in \Lambda_n} \prod_{i=1}^n e^{\beta x_i x_{i+1} + h x_i}.$$

Chaque facteur ne dépend que de deux particules voisines : c'est ce qui va permettre d'utiliser une matrice 2×2.

Question 20

Étape 1. Récurrence sur p

Le coup d'œil. $p = 2$: définition du produit matriciel. Puis $M^{p+1} = M^p M$.

$p = 2$ **:** $(M^2)(i,j) = \sum_{k_2} M(i,k_2) M(k_2,j)$: c'est la formule (produit vide égal à 1).

Hérédité : si la formule vaut au rang p,

$$(M^{p+1})(i,j) = \sum_{\ell=1}^q (M^p)(i,\ell) M(\ell,j) = \sum_{\ell} \sum_{k_2,\dots,k_p} M(i,k_2) \prod_{r=2}^{p-1} M(k_r,k_{r+1})\, M(k_p,\ell) M(\ell,j).$$

En renommant $\ell = k_{p+1}$, le facteur $M(k_p, k_{p+1})$ rejoint le produit (qui va maintenant jusqu'à $r = p$) : c'est la formule au rang $p+1$.

Lecture : $(M^p)(i,j)$ est une somme sur tous les **chemins** $i \to k_2 \to \dots \to k_p \to j$ du produit des coefficients rencontrés.

Question 21

Étape 1. Décoder la matrice A

Le coup d'œil. Indice 1 pour -1, indice 2 pour $+1$: chaque coefficient est un facteur $e^{\beta xy+hx}$ de Q19. Le labo le montre sur une configuration.

L'énoncé définit A sans dire d'où elle vient. L'idée : A est un tableau de tous les facteurs $e^{\beta xy+hx}$ de Q19, une ligne par valeur de x, une colonne par valeur de y. Associons à $k \in \{1,2\}$ le spin $x=(-1)^k$ (donc $1\mapsto -1$, $2\mapsto +1$). Alors $A(k,l)=e^{\beta xy+hx}$ avec $x=(-1)^k$, $y=(-1)^l$:

- $A(1,1)$: $x=y=-1$, $e^{\beta-h}$;
- $A(1,2)$: $x=-1$, $y=1$, $e^{-\beta-h}$;
- $A(2,1)$: $x=1$, $y=-1$, $e^{-\beta+h}$;
- $A(2,2)$: $x=y=1$, $e^{\beta+h}$.

Labo interactif : voir la version en ligne de ce corrigé.

Étape 2. La trace comme somme de chemins fermés

Le coup d'œil. Q20 avec $p=n$, $i=j=k_1$, puis on somme sur k_1 : chemins fermés.

Q20 ($p=n$, $q=2$) : $(A^n)(k_1,k_1)=\sum_{k_2,\dots,k_n} A(k_1,k_2)A(k_2,k_3)\cdots A(k_n,k_1)$. Donc

$$\operatorname{tr}(A^n)=\sum_{(k_1,\dots,k_n)\in\{1,2\}^n} A(k_1,k_2)\cdots A(k_{n-1},k_n)A(k_n,k_1).$$

La bijection $(k_1,\dots,k_n)\mapsto(x_1,\dots,x_n)=((-1)^{k_1},\dots,(-1)^{k_n})$ envoie $\{1,2\}^n$ sur Λ_n, et $A(k_i,k_{i+1})=e^{\beta x_i x_{i+1}+hx_i}$ (le dernier facteur $A(k_n,k_1)$ correspond à $x_{n+1}=x_1$). Avec Q19 :

$$\boxed{\operatorname{tr}(A^n)=\sum_{x\in\Lambda_n}\prod_{i=1}^{n} e^{\beta x_i x_{i+1}+hx_i}=Z_n(h).}$$

Question 22

Étape 1. Polynôme caractéristique

Le coup d'œil. En dimension 2 : $\chi_A=X^2-\operatorname{tr}(A)X+\det A$. Calculer trace et déterminant.

$\operatorname{tr} A = 2e^{\beta}\operatorname{ch} h$, $\det A = e^{\beta-h}e^{\beta+h}-e^{-\beta-h}e^{-\beta+h}=e^{2\beta}-e^{-2\beta}=2\operatorname{sh}(2\beta)$. Donc $\chi_A=X^2-2e^{\beta}\operatorname{ch}(h)X+2\operatorname{sh}(2\beta)$, de discriminant réduit

$$\delta=e^{2\beta}\operatorname{ch}^2 h-2\operatorname{sh}(2\beta)=e^{2\beta}(1+\operatorname{sh}^2 h)-e^{2\beta}+e^{-2\beta}=e^{2\beta}\operatorname{sh}^2 h+e^{-2\beta}>0.$$

$$\boxed{\mu_{\pm}=e^{\beta}\operatorname{ch} h\pm\sqrt{e^{2\beta}\operatorname{ch}^2 h-2\operatorname{sh}(2\beta)},\qquad \mu_+>\mu_-.}$$

Question 23

Étape 1. Trace de A^n

Le coup d'œil. Deux valeurs propres distinctes : A est diagonalisable et $\operatorname{tr}(A^n) = \mu_+^n + \mu_-^n$.

A a deux valeurs propres réelles distinctes : elle est diagonalisable, semblable à $\operatorname{diag}(\mu_+, \mu_-)$, et $Z_n(h) = \operatorname{tr}(A^n) = \mu_+^n + \mu_-^n$.

De plus $|\mu_-| < \mu_+$: $\mu_+ + \mu_- = 2e^\beta \operatorname{ch} h > 0$ et $\mu_+ - \mu_- > 0$ donnent $-\mu_+ < \mu_- < \mu_+$.

Étape 2. Passer à la limite

Le coup d'œil. Factoriser par μ_+^n dans le logarithme.

$$\psi_n(h) = \frac{1}{n} \ln\left(\mu_+^n \left(1 + \left(\frac{\mu_-}{\mu_+}\right)^n\right)\right) = \ln \mu_+ + \frac{1}{n} \ln\left(1 + \left(\frac{\mu_-}{\mu_+}\right)^n\right).$$

$\left(\frac{\mu_-}{\mu_+}\right)^n \to 0$, donc le dernier terme tend vers 0 :

$$\psi(h) = \ln\left(e^\beta \operatorname{ch} h + \sqrt{e^{2\beta} \operatorname{ch}^2 h - 2\operatorname{sh}(2\beta)}\right).$$

C'est la méthode de la **matrice de transfert** : seule la plus grande valeur propre compte à la limite.

Question 24

Étape 1. Dériver ψ

Le coup d'œil. Notons $R(h) = \sqrt{e^{2\beta} \operatorname{sh}^2 h + e^{-2\beta}}$ (c'est la même racine, par Q22). Alors $\psi = \ln(e^\beta \operatorname{ch} h + R)$.

L'énoncé admet que $m = \psi'$ dès que ψ est dérivable : il suffit de dériver la formule de Q23. On écrit $\psi(h) = \ln \mu(h)$ avec $\mu = e^\beta \operatorname{ch} h + R$, $R' = \frac{e^{2\beta} \operatorname{sh} h \operatorname{ch} h}{R}$. Donc

$$\mu' = e^\beta \operatorname{sh} h + \frac{e^{2\beta} \operatorname{sh} h \operatorname{ch} h}{R} = \frac{e^\beta \operatorname{sh} h}{R}(R + e^\beta \operatorname{ch} h) = \frac{e^\beta \operatorname{sh} h}{R}\,\mu.$$

ψ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $m = \psi' = \frac{\mu'}{\mu}$:

$$m(h) = \frac{e^\beta \operatorname{sh} h}{\sqrt{e^{2\beta} \operatorname{sh}^2 h + e^{-2\beta}}} = \frac{\operatorname{sh} h}{\sqrt{\operatorname{sh}^2 h + e^{-4\beta}}}.$$


Étape 2. Pas d'aimantation spontanée

Le coup d'œil. Faire $h \to 0^+$: le numérateur tend vers 0, pas le dénominateur.

m_+ est la limite de $m(h)$ quand $h \to 0^+$: l'aimantation qui reste quand on coupe le champ extérieur. Quand $h \to 0^+$, $\operatorname{sh} h \to 0$ et $\sqrt{\operatorname{sh}^2 h + e^{-4\beta}} \to e^{-2\beta} \neq 0$:

$$m_+ = 0 \quad \text{pour tout } \beta > 0.$$

Même à très basse température (β grand), l'aimantation disparaît avec le champ : en dimension 1, pas de ferromagnétisme spontané.



$m(h)$ pour trois valeurs de β : toutes les courbes partent de 0, de plus en plus raides quand β grandit.

Le piège

En Q21, se tromper dans la correspondance indices / spins : la ligne de A est indexée par x_i, la colonne par x_{i+1}, avec $1 \leftrightarrow -1$ et $2 \leftrightarrow +1$. Et ne pas oublier le dernier facteur $A(k_n, k_1)$, qui ferme le cercle.

La méthode

Une somme sur des configurations dont le poids est un produit de facteurs entre voisins s'écrit comme une trace de puissance de matrice (matrice de transfert). À la limite, seule la plus grande valeur propre compte.

Rappels de cours utilisés

- **Formule de transfert.** Pour X à valeurs dans un ensemble fini : $E(f(X)) = \sum_x f(x)\, P(X = x)$.
- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.
- **Matrices semblables.** Si $P^{-1}MP = D$ est diagonale, alors $P^{-1}M^kP = D^k$, $P^{-1}M^{-1}P = D^{-1}$, et $\operatorname{tr}(M^k) = \operatorname{tr}(D^k) = \sum \lambda_i^k$. Deux matrices semblables ont même spectre (avec multiplicités).