CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

# Résoudre $M^2 + M = A$ pour une matrice $2 \times 2$

## Énoncé

Soit $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

1. Diagonaliser $A$.
2. Soit $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ telle que $M^2 + M = A$. Montrer que $\mathrm{Sp}(M) \subset \{1, 2, -2, -3\}$ et que $M$ est diagonalisable.
3. Résoudre l'équation $M^2 + M = A$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $A$ est $2 \times 2$ : $\chi_A = X^2 - \mathrm{tr}(A)X + \det A$.

**Ce qu'on te demande.** Trouver toutes les matrices $M$ avec $M^2 + M = A$, et les écrire explicitement.

## Corrigé

### Q1 · Polynôme caractéristique

$$\chi_A = \begin{vmatrix} X-5 & -3 \\ -1 & X-3 \end{vmatrix}$$

$$= (X-5)(X-3) - (-3)(-1)$$

$$= X^2 - 8X + 15 - 3 = X^2 - 8X + 12.$$

Discriminant : $\Delta = 64 - 48 = 16 = 4^2$, racines $\frac{8 \pm 4}{2}$, soit $6$ et $2$ :

$$\chi_A = (X-2)(X-6).$$

Deux valeurs propres distinctes en dimension $2$ : $A$ est diagonalisable.

### Q1 · Vecteurs propres

**Pour** $2$ : $A-2I_2=\begin{pmatrix}3&3\\1&1\end{pmatrix}$. Le système $\begin{cases}3x+3y=0\\x+y=0\end{cases}$ se réduit à $y=-x$ :

$$E_2(A)=\operatorname{Vect}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}.$$

**Pour** $6$ : $A-6I_2=\begin{pmatrix}-1&3\\1&-3\end{pmatrix}$. Le système se réduit à $x=3y$ :

$$E_6(A)=\operatorname{Vect}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}.$$

Contrôle : $A\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5-3\\1-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\-2\end{pmatrix}$ et $A\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}15+3\\3+3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}18\\6\end{pmatrix}=6\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$ .

### Q1 · P, D et P⁻¹

$$P=\begin{pmatrix}1&3\\-1&1\end{pmatrix},\qquad D=\begin{pmatrix}2&0\\0&6\end{pmatrix},\qquad \det P=1\cdot 1-3\cdot(-1)$$

$$=4,\qquad P^{-1}=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}1&-3\\1&1\end{pmatrix}.$$

$$A=PDP^{-1}=\begin{pmatrix}1&3\\-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&0\\0&6\end{pmatrix}\frac{1}{4}\begin{pmatrix}1&-3\\1&1\end{pmatrix}.$$

Vérification : $PD=\begin{pmatrix}2&18\\-2&6\end{pmatrix}$, puis $\frac{1}{4}\begin{pmatrix}2&18\\-2&6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-3\\1&1\end{pmatrix}=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}20&12\\4&12\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5&3\\1&3\end{pmatrix}$ .

### Q2 · Un annulateur de M

Par Cayley-Hamilton, $(A-2I_2)(A-6I_2)=0$. Avec $A=M^2+M$ :

$$(M^2+M-2I_2)(M^2+M-6I_2)=0.$$

Donc $Q=(X^2+X-2)(X^2+X-6)$ annule $M$. On factorise : $X^2+X-2$ a pour racines $1$ et $-2$ (somme $-1$, produit $-2$), et $X^2+X-6$ a pour racines $2$ et $-3$ (somme $-1$, produit $-6$) :

$$Q=(X-1)(X+2)(X-2)(X+3).$$

Les valeurs propres de $M$ sont parmi les racines de $Q$, et $Q$ est scindé à racines simples :

$$\operatorname{Sp}(M)\subset\{1,-2,2,-3\},\qquad M \text{ diagonalisable.}$$

### Q3 · Se ramener à D

On pose $M' = P^{-1}MP$, soit $M = PM'P^{-1}$. Alors $M^2 = PM'^2P^{-1}$ et

$$M^2 + M = A \iff P(M'^2 + M')P^{-1} = PDP^{-1}$$

$$\iff M'^2 + M' = D.$$

$M'$ commute avec $M'^2 + M'$, donc avec $D$ : $M'D = M'^3 + M'^2 = DM'$.

### Q3 · M′ est diagonale

$$M'D = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a & 6b \\ 2c & 6d \end{pmatrix},$$

$$DM' = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a & 2b \\ 6c & 6d \end{pmatrix}.$$

Donc $6b = 2b$ et $2c = 6c$, soit $b = c = 0$ : $M' = \operatorname{diag}(a, d)$. L'équation devient

$$\begin{pmatrix} a^2 + a & 0 \\ 0 & d^2 + d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} a^2 + a - 2 = 0 \\ d^2 + d - 6 = 0 \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} a \in \{1, -2\} \\ d \in \{2, -3\}. \end{cases}$$

Réciproquement, ces $M'$ vérifient bien $M'^2 + M' = D$.

### Q3 · Les quatre solutions

$$P\operatorname{diag}(a, d)P^{-1} = \begin{pmatrix} a & 3d \\ -a & d \end{pmatrix}\frac{1}{4}\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{4}\begin{pmatrix} a + 3d & -3a + 3d \\ -a + d & 3a + d \end{pmatrix}.$$

- $(a, d) = (1, 2)$ : $M_1 = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$.
- $(a, d) = (1, -3)$ : $M_2 = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} -8 & -12 \\ -4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.
- $(a, d) = (-2, 2)$ : $M_3 = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 4 & 12 \\ 4 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$.

- $(a,d)=(-2,-3)$ : $M_4=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}-11 & -3\\ -1 & -9\end{pmatrix}$.

Contrôle sur $M_3$ : $M_3^2=\begin{pmatrix}1+3 & 3-3\\ 1-1 & 3+1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4 & 0\\ 0 & 4\end{pmatrix}$, et $M_3^2+M_3=\begin{pmatrix}5 & 3\\ 1 & 3\end{pmatrix}=A$ . Sur $M_2$ : $M_2^2=\begin{pmatrix}4+3 & 6+0\\ 2+0 & 3+0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7 & 6\\ 2 & 3\end{pmatrix}$, et $M_2^2+M_2=\begin{pmatrix}5 & 3\\ 1 & 3\end{pmatrix}$ .

$$M^2+M=A \iff M\in\{M_1,M_2,M_3,M_4\}.$$

**Le piège**

Chercher $M=\begin{pmatrix}x & y\\ z & t\end{pmatrix}$ et résoudre un système de 4 équations non linéaires : très long. Le changement de base ramène tout à des équations du second degré sur la diagonale.

**La méthode**

Équation polynomiale $Q(M)=A$ avec $A$ diagonalisable à valeurs propres simples : $M$ commute avec $A$, donc est diagonale dans la même base. On se ramène à $Q(\lambda)=\mu$ sur chaque coefficient.

## Rappels de cours utilisés

- **n valeurs propres distinctes.**

$$\dim E=n,\ \operatorname{Card}\operatorname{Sp}(u)=n \implies u \text{ diagonalisable}, \quad \forall\lambda,\ \dim E_\lambda=1.$$

- **Théorème de Cayley-Hamilton.**

$$\chi_A(A)=0, \qquad \pi_A \mid \chi_A.$$

- **Polynôme annulateur et diagonalisation.**

$$u \text{ diagonalisable} \iff \exists P \text{ scindé à racines simples},\ P(u)=0.$$

$$P \text{ à racines simples} \iff P\wedge P'=1.$$

- **Commuter avec une matrice diagonale.**

$$D=\operatorname{diag}(d_1,\dots,d_n),\ d_i \text{ distincts} : \qquad MD=DM \iff M \text{ diagonale},$$

$$(MD)_{ij}=m_{ij}d_j, \qquad (DM)_{ij}=d_i m_{ij}.$$