CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

# Quotients d'une partie non majorée

## Énoncé

Soit $A \subset \mathbb{R}_+$ une partie non majorée et $B = \left\{\dfrac{a}{n},\ a \in A,\ n \in \mathbb{N}^*\right\}$.

1. Soient $0 \leqslant \alpha < \beta$. Montrer qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}^*$ tel que, pour $n \geqslant n_0$, les intervalles $I_n = [n\alpha, n\beta]$ et $I_{n+1}$ se chevauchent.
2. En déduire que $B$ rencontre $[\alpha, \beta]$, puis que $B$ est dense dans $\mathbb{R}_+$.
3. Exemples : $A = \{2^k,\ k \in \mathbb{N}\}$, $A = \{\text{nombres premiers}\}$.

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $A$ non majorée : pour tout réel $M$, il existe $a \in A$ avec $a \geqslant M$.

**Ce qu'on te demande.** Trouver $a \in A$ et $n \geqslant 1$ avec $\alpha \leqslant \frac{a}{n} \leqslant \beta$.

## Corrigé

### 1. Traduire le but

Pour $n \geqslant 1$, on multiplie l'encadrement par $n > 0$ :

$$\frac{a}{n} \in [\alpha, \beta] \iff \alpha \leqslant \frac{a}{n} \leqslant \beta \iff n\alpha \leqslant a \leqslant n\beta.$$

$\frac{a}{n} \in [\alpha, \beta] \iff a \in I_n = [n\alpha, n\beta]$. Il s'agit donc de trouver un $a \in A$ dans l'un des intervalles $I_n$.
Exemple : $[\alpha, \beta] = [1; 1{,}1]$, $n = 10$ : $I_{10} = [10, 11]$ ; si $a = 10{,}5 \in A$, alors $\frac{a}{10} = 1{,}05 \in [1; 1{,}1]$.

## 2. Les intervalles finissent par se chevaucher

$(n+1)\alpha \leqslant n\beta \iff n(\beta-\alpha) \geqslant \alpha \iff n \geqslant \dfrac{\alpha}{\beta-\alpha}$. On prend $n_0 = \left\lfloor \dfrac{\alpha}{\beta-\alpha} \right\rfloor + 1$. Pour $n \geqslant n_0$, le début de $I_{n+1}$ est dans $I_n$ : $I_n \cup I_{n+1} = [n\alpha, (n+1)\beta]$.




Exemple $\alpha = 1$, $\beta = 1{,}6$ : $I_1 = [1;1{,}6]$ et $I_2 = [2;3{,}2]$ laissent un trou, puis à partir de $n = 2$ chaque intervalle chevauche le suivant (car $n \times 0{,}6 \geqslant 1$).

## 3. Une demi-droite recouverte

**Récurrence sur** $N \geqslant n_0$ : pour $N = n_0$, $I_{n_0} = [n_0\alpha, n_0\beta]$. Si $I_{n_0} \cup \cdots \cup I_N = [n_0\alpha, N\beta]$, on ajoute $I_{N+1} = [(N+1)\alpha, (N+1)\beta]$. Ces deux intervalles se chevauchent (c'est l'étape précédente : $(N+1)\alpha \leqslant N\beta$), donc leur réunion est l'intervalle $[n_0\alpha, (N+1)\beta]$. Ainsi $I_{n_0} \cup \cdots \cup I_N = [n_0\alpha, N\beta]$ pour tout $N \geqslant n_0$. Comme $N\beta \to +\infty$ (si $\beta > 0$, ce qui est le cas car $\beta > \alpha \geqslant 0$) :

$$\bigcup_{n \geqslant n_0} I_n = [n_0\alpha, +\infty[.$$

$A$ n'est pas majorée, donc il existe $a \in A$ avec $a \geqslant n_0\alpha$. Alors $a \in I_n$ pour un certain $n \geqslant n_0$, et $\dfrac{a}{n} \in [\alpha, \beta]$.

## 4. La densité

Soit $x \geqslant 0$ et $\varepsilon > 0$. On applique la première partie de la question à l'intervalle $[\alpha, \beta] = [x, x+\varepsilon]$ (on a bien $0 \leqslant \alpha < \beta$) : il existe $b \in B$ avec $x \leqslant b \leqslant x + \varepsilon$, donc $|b - x| \leqslant \varepsilon$.

Tout réel positif est approché d'aussi près qu'on veut par des éléments de $B$ :

$$B = \left\{\frac{a}{n}\right\} \text{ est dense dans } \mathbb{R}_+.$$

## 5. Deux exemples

- $\{2^k\}$ n'est pas majorée : les nombres $\dfrac{2^k}{n}$ sont denses dans $\mathbb{R}_+$.
- Il y a une infinité de nombres premiers (Euclide), donc ils ne sont pas majorés : les $\dfrac{p}{n}$ ($p$ premier) sont denses dans $\mathbb{R}_+$.

**Contre-exemple :** si $A = [0,1]$ (majorée), alors $B = [0,1]$, qui n'est pas dense dans $\mathbb{R}_+$.

**Le piège**

Croire que les $I_n$ se chevauchent dès $n = 1$ : il peut y avoir des trous au début (voir la figure). Seule la suite de la liste est sans trou.

**La méthode**

Pour $\alpha \leqslant \frac{a}{n} \leqslant \beta$ : multiplier par $n$ et étudier la réunion des intervalles $[n\alpha, n\beta]$.

## Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.
- **Partie dense.** $A$ est dense dans l'intervalle $I$ si tout point de $I$ est approché d'aussi près qu'on veut par des éléments de $A$ :

$$\forall x \in I,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists a \in A, \quad |x - a| \leqslant \varepsilon.$$

De façon équivalente : tout intervalle ouvert non vide contenu dans $I$ rencontre $A$, ou encore tout $x \in I$ est limite d'une suite d'éléments de $A$.

**Exemple :** $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$. **Contre-exemple :** $\mathbb{Z}$ ne l'est pas : aucun entier n'est à moins de 0,4 de $\frac{1}{2}$.