CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Limite de x·cos(e^x) / (x^2 + 1) en +∞

Énoncé

Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x\cos\left(e^x\right)}{x^2+1}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Un cosinus, qui oscille entre -1 et 1.
- Une fraction $\dfrac{x}{x^2+1}$.

Ce qu'on te demande. Trouver la limite, alors que $\cos(e^x)$ n'en a pas.

Corrigé

1. Le problème

Le coup d'œil. $\cos(e^x)$ a-t-il une limite ? Est-il borné ?

On ne peut pas utiliser les règles sur les produits : $\cos(e^x)$ n'a pas de limite en $+\infty$. En revanche, il est borné.

2. Séparer les deux morceaux

Le coup d'œil. Sépare le quotient en (fraction sans cosinus) × (cosinus).

$$\frac{x\cos\left(e^x\right)}{x^2+1} = \underbrace{\frac{x}{x^2+1}}_{\text{tend vers } 0\,?} \times \underbrace{\cos\left(e^x\right)}_{\text{borné}}.$$

3. La fraction tend vers 0

Le coup d'œil. Dans $\frac{x}{x^2+1}$, mets x^2 en facteur au dénominateur.

On factorise par x^2 au dénominateur :

$$\frac{x}{x^2+1} = \frac{x}{x^2\left(1+\frac{1}{x^2}\right)} = \frac{1}{x}\cdot\frac{1}{1+\frac{1}{x^2}} \longrightarrow 0\times 1 = 0.$$

4. Justifier par un encadrement

Le coup d'œil. Majore la valeur absolue en utilisant $|\cos| \leqslant 1$.

Pour $x > 0$, comme $|\cos(e^x)| \leqslant 1$:

$$\left|\frac{x\cos(e^x)}{x^2+1}\right| \leqslant \frac{x}{x^2+1}.$$

Le majorant tend vers 0, donc l'expression tend vers 0.

5. Conclusion

Le coup d'œil. Tout est prêt : conclus.

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x\cos(e^x)}{x^2+1} = 0.$$

Le piège

Chercher la limite de $\cos(e^x)$: elle n'existe pas. Il suffit qu'il soit borné.

La méthode

Une fonction bornée multipliée par une fonction qui tend vers 0 tend vers 0. On le justifie par $|fg| \leqslant M|f|$.

Rappels de cours utilisés

- **Limites et opérations.** Si $f \to \ell$ et $g \to \ell'$, alors $f+g \to \ell+\ell'$ et $fg \to \ell\ell'$. Avec des limites infinies : $(+\infty) \times \ell = +\infty$ si $\ell > 0$, et $-\infty$ si $\ell < 0$.
- **Borné fois tend vers zéro.** Si g est bornée au voisinage de a et si $f \to 0$ en a, alors $fg \to 0$ en a. Justification : $|fg| \leqslant M|f|$.
- **Théorème d'encadrement.** Si $g \leqslant f \leqslant h$ au voisinage de a et si g et h tendent vers le même réel ℓ, alors f tend vers ℓ.