CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

Idéaux maximaux

Énoncé

Soit A un anneau commutatif. Un idéal $I \neq A$ est **maximal** si les seuls idéaux contenant I sont I et A.

1. Montrer que I est maximal si et seulement si, pour tout $a \notin I$, $I + aA = A$.
2. Montrer que tout idéal maximal est premier.
3. Déterminer les idéaux maximaux de $\mathbb{Z}$.
4. Soit $\varphi : \mathbb{Z}[X] \to \mathbb{C}$, $P \mapsto P(i)$. Montrer que $\ker \varphi = (X^2+1)\mathbb{Z}[X]$ et en déduire que cet idéal est premier. Montrer qu'il n'est pas maximal, en considérant $(X^2+1)\mathbb{Z}[X] + 2\mathbb{Z}[X]$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $I + aA = \{x + ab : x \in I,\ b \in A\}$ est le plus petit idéal contenant I et a.

Ce qu'on te demande. Relier maximal et premier, avec des exemples dans $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}[X]$.

Corrigé

1. Une caractérisation

- $\Rightarrow$: supposons I maximal et $a \notin I$. $I + aA$ est un idéal (somme de deux idéaux), qui contient I et aussi a ; il contient donc strictement I. Par maximalité, $I + aA = A$.
- $\Leftarrow$: soit J un idéal avec $I \subsetneq J$. On prend $a \in J \setminus I$. Par hypothèse $A = I + aA$; or $I \subset J$ et $aA \subset J$ (idéal contenant a), donc $A \subset J$, c'est-à-dire $J = A$. I est maximal.

2. Maximal implique premier

Rappel : I est premier si $I \neq A$ et $(xy \in I \Rightarrow x \in I$ ou $y \in I)$.

Soit $xy \in I$ avec $x \notin I$; montrons $y \in I$. Par Q1, $I + xA = A$, donc $1 \in I + xA$: $1 = i + xb$ avec $i \in I$, $b \in A$. On multiplie par y :

$$y = iy + (xy)b.$$

$iy \in I$ (car $i \in I$ et I est un idéal), et $(xy)b \in I$ (car $xy \in I$). Donc $y \in I$.

$$I \text{ maximal} \implies I \text{ premier.}$$

3. Dans $\mathbb{Z}$

$n\mathbb{Z}$ ($n \geqslant 2$) est maximal si et seulement si ses seuls « sur-idéaux » sont lui-même et $\mathbb{Z}$, c'est-à-dire si n n'a pas d'autre diviseur positif que 1 et n : n premier. ($\{0\}$ n'est pas maximal : $\{0\} \subsetneq 2\mathbb{Z}$.)

$$\text{Idéaux maximaux de } \mathbb{Z} : p\mathbb{Z},\ p \text{ premier.}$$

4. Le noyau de P ▮ P(i)

$(X^2+1)\mathbb{Z}[X] \subset \ker\varphi$ car $i^2+1=0$. Réciproquement, $P = (X^2+1)Q + c + dX$; si $P(i)=0$ alors $c+di=0$, donc $c=d=0$. Ainsi $\ker\varphi = (X^2+1)\mathbb{Z}[X]$, et comme $\mathbb{C}$ est intègre, cet idéal est premier.

5. Pas maximal

$J = (X^2+1)\mathbb{Z}[X] + 2\mathbb{Z}[X]$ contient 2, qui n'est pas multiple de X^2+1 : $J \supsetneq (X^2+1)$. Et $J \neq \mathbb{Z}[X]$: sinon $1 = 2V(i)$ dans $\mathbb{Z}[i]$, impossible. Donc (X^2+1) est premier mais pas maximal.

$$\text{premier} \not\Rightarrow \text{maximal.}$$

Le piège

Croire que premier et maximal coïncident partout : c'est vrai dans $\mathbb{Z}$ et $K[X]$ (pour les idéaux non nuls), faux dans $\mathbb{Z}[X]$.

La méthode

Maximal : pour tout $a \notin I$, $1 \in I + aA$. On l'utilise en écrivant $1 = i + ab$.

Rappels de cours utilisés

- **Idéal d'un anneau commutatif. Définition** : $I \subset A$ idéal si

$$\forall x,y \in I,\ x-y \in I, \qquad \forall a \in A,\ \forall x \in I,\ ax \in I.$$

$$I \cap A^\times \neq \emptyset \implies I = A, \qquad (a,b) = aA + bA.$$

- **Idéal premier. Définition** ($I \neq A$) :

$$I \text{ premier} \iff (xy \in I \Rightarrow x \in I \text{ ou } y \in I).$$

$$\{0\} \text{ premier} \iff A \text{ intègre}, \qquad \text{premiers non nuls de } \mathbb{Z} = \{p\mathbb{Z},\ p \text{ premier}\}.$$

- **Noyau d'un morphisme d'anneaux.** $\varphi : A \to B$ morphisme d'anneaux :

$$\ker \varphi \text{ idéal de } A.$$

$$B \text{ intègre } \implies (\varphi(xy) = 0 \Rightarrow \varphi(x) = 0 \text{ ou } \varphi(y) = 0) \implies \ker \varphi \text{ premier.}$$