CORRIGÉ · EXERCICE · COMMANDO X-ENS MP

Dans un espace normé, la boule fermée est l'adhérence de la boule ouverte

Énoncé

Soit E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel normé. Montrer que

$$\overline{B(0,1)} = B_f(0,1).$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- E est un espace vectoriel normé : on peut multiplier un vecteur par un réel.
- On sait déjà que $\overline{B(0,1)} \subset B_f(0,1)$.

Ce qu'on te demande. Montrer l'inclusion réciproque : tout x avec $\|x\| \leqslant 1$ est adhérent à $B(0,1)$.

Corrigé

1. Ce qu'il reste à montrer

L'inclusion $\overline{B(0,1)} \subset B_f(0,1)$ a été démontrée dans le premier exercice. Il reste $B_f(0,1) \subset \overline{B(0,1)}$.

2. L'outil

On utilise le critère d'adhérence : soit x avec $\|x\| \leqslant 1$ et $\varepsilon > 0$, on cherche $y \in B(0,1)$ tel que $\|x - y\| < \varepsilon$.

3. Le cas facile

Si $\|x\| < 1$, alors $x \in B(0,1)$ et $y = x$ convient.

4. Le cas du bord

Supposons $\|x\| = 1$. On recule vers le centre : on pose $t = \min\left(1, \frac{\varepsilon}{2}\right) \in]0,1]$ et $y = (1-t)x$.

5. y est dans la boule ouverte

Par homogénéité de la norme, et comme $1 - t \geqslant 0$:

$$\|y\| = (1-t)\|x\| = 1 - t < 1.$$

6. y est proche de x

$$\|x-y\| = \|tx\| = t\,\|x\| = t \leqslant \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Donc $x \in \overline{B(0,1)}$.

7. Conclusion

Tout point de $B_f(0,1)$ est adhérent à $B(0,1)$. Avec l'autre inclusion :

$$\overline{B(0,1)} = B_f(0,1).$$

Le piège

Oublier que ce résultat utilise la structure vectorielle (le point $(1-t)x$) : il est faux dans un espace métrique quelconque.

La méthode

Pour montrer qu'un point du bord est adhérent, approche-le par des points intérieurs construits explicitement, ici sur le segment vers le centre.

Rappels de cours utilisés

- **Adhérence.** $\overline{A}$ est le plus petit fermé contenant A : si F est fermé et $A \subset F$, alors $\overline{A} \subset F$. On a les équivalences

  $$x \in \overline{A} \iff \forall \varepsilon > 0,\ B(x,\varepsilon) \cap A \neq \emptyset \iff d(x,A) = 0.$$

  Si F est fermé, $\overline{F} = F$.

- **Norme.** Une norme sur un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E est une application $x \mapsto \|x\|$ à valeurs dans $\mathbb{R}_+$ telle que : $\|x\| = 0 \iff x = 0$; $\|\lambda x\| = |\lambda|\,\|x\|$; $\|x+y\| \leqslant \|x\| + \|y\|$. Elle définit la distance $d(x,y) = \|x-y\|$.