CORRIGÉ · EXERCICE · COMMANDO X-ENS MP

Localement fermé : la condition nécessaire

Énoncé

On reprend la définition : A est localement fermé si tout $x \in A$ a un voisinage V tel que $V \cap A$ soit un fermé de V.

Montrer que si A est localement fermé, alors il existe un ouvert Ω tel que $A = \Omega \cap \overline{A}$. En particulier, A est l'intersection d'un ouvert et d'un fermé.

On pourra utiliser le résultat : si W est ouvert, alors $W \cap \overline{A} \subset \overline{W \cap A}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Pour chaque $x \in A$: un voisinage V_x et un fermé G_x de E avec $V_x \cap A = G_x \cap V_x$.

Ce qu'on te demande. Construire un ouvert Ω et prouver la double inclusion $A = \Omega \cap \overline{A}$.

Corrigé

1. Traduire l'hypothèse

Pour chaque $x \in A$, il existe un voisinage V_x de x et un fermé G_x de E tels que

$$V_x \cap A = G_x \cap V_x.$$

2. Passer à des ouverts

On pose $W_x = \mathring{V_x}$: c'est un ouvert qui contient x, et $W_x \subset V_x$. En intersectant l'égalité précédente avec W_x :

$$W_x \cap A = W_x \cap G_x. \qquad (*)$$

3. Le candidat Ω

On pose $\Omega = \bigcup_{x \in A} W_x$. C'est une réunion d'ouverts, donc un ouvert. Chaque $x \in A$ est dans W_x, donc $A \subset \Omega$.

4. Première inclusion

On a $A \subset \Omega$ et $A \subset \overline{A}$, donc $A \subset \Omega \cap \overline{A}$.

5. Inclusion réciproque : se placer dans un W

Soit $z \in \Omega \cap \overline{A}$. Comme $z \in \Omega$, il existe $y \in A$ tel que $z \in W_y$. On note $W = W_y$ et $G = G_y$.

6. Utiliser le résultat sur l'adhérence

W est ouvert et $z \in W \cap \overline{A}$. D'après le résultat rappelé :

$$z \in \overline{W \cap A} = \overline{W \cap G}.$$

7. z est dans G

$W \cap G \subset G$ et G est fermé, donc $\overline{W \cap G} \subset G$. Ainsi $z \in G$.

8. z est dans A

On a $z \in W$ et $z \in G$, donc par $(*)$: $z \in W \cap G = W \cap A \subset A$.

9. Conclusion

Les deux inclusions donnent $A = \Omega \cap \overline{A}$: A est l'intersection de l'ouvert Ω et du fermé $\overline{A}$.

Le piège

Travailler directement avec les voisinages V_x : leur réunion n'est pas forcément ouverte. Il faut passer à leurs intérieurs.

La méthode

Pour recoller des informations locales en une information globale : rends chaque morceau ouvert, puis prends la réunion.

Rappels de cours utilisés

- **Topologie induite.** Pour $V \subset E$ muni de la distance restreinte : les ouverts de V sont les $\Omega \cap V$ et les fermés de V sont les $G \cap V$, avec Ω ouvert et G fermé de E.
- **Voisinage.** V est un voisinage de x s'il contient un ouvert contenant x, par exemple une boule $B(x, \rho)$. Un ouvert qui contient x est un voisinage de x. L'intérieur $\mathring{V}$ d'un voisinage de x est un ouvert qui contient x.
- **Ouvert et fermé.** Ω est ouvert si pour tout $x \in \Omega$, il existe $\rho > 0$ avec $B(x, \rho) \subset \Omega$. F est fermé si son complémentaire $E \setminus F$ est ouvert.
- **Ouvert et adhérence.** Si Ω est ouvert et $B \subset E$: $\Omega \cap \overline{B} \subset \overline{\Omega \cap B}$.
- **Adhérence.** $\overline{A}$ est le plus petit fermé contenant A : si F est fermé et $A \subset F$, alors $\overline{A} \subset F$. On a les équivalences

$$x \in \overline{A} \iff \forall \varepsilon > 0,\ B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset \iff d(x, A) = 0.$$

Si F est fermé, $\overline{F} = F$.