CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES MP

Un encadrement de la fonction π

Énoncé

Notations. $\lfloor x \rfloor$ est la partie entière de x. Si p est premier et $n \in \mathbb{N}^*$, $v_p(n)$ est la valuation p-adique de n : le plus grand entier k tel que p^k divise n. Pour $x \geqslant 1$, $\pi(x)$ est le nombre de nombres premiers inférieurs ou égaux à x.

Le but de cette partie est d'établir l'encadrement :

$$\forall x \in [3, +\infty[, \qquad \frac{\ln(2)\, x}{6 \ln(x)} \leqslant \pi(x) \leqslant 4 \frac{x}{\ln(x)}.$$

I – Calculs préliminaires

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\displaystyle\prod_{\substack{n+2 \leqslant p \leqslant 2n+1 \\ p \text{ premier}}} p \leqslant \binom{2n+1}{n} \leqslant 4^n$.

2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\displaystyle\prod_{\substack{p \leqslant n \\ p \text{ premier}}} p < 4^n$. On pourra procéder par récurrence et discuter suivant la parité de n.

3. En déduire que, pour tout réel $x \geqslant 1$, $\displaystyle\prod_{\substack{p \leqslant x \\ p \text{ premier}}} p < 4^x$.

4. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\dfrac{4^n}{2n} \leqslant \binom{2n}{n} < 4^n$.

5. Soit p premier. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_p(n!) = \displaystyle\sum_{k=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$.

6. En déduire que, pour tous $n \in \mathbb{N}^*$, $k \in \mathbb{N}$ et p premier : si p^k divise $\binom{2n}{n}$, alors $p^k \leqslant 2n$.

II – Majoration de π(x)

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Justifier que $\displaystyle\prod_{\substack{p \leqslant n \\ p \text{ premier}}} p \geqslant \prod_{\substack{\sqrt{n} < p \leqslant n \\ p \text{ premier}}} p$.

2. En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $n^{(\pi(n) - \pi(\sqrt{n}))/2} < 4^n$.

3. Soit $n \geqslant 2$ entier. Justifier que $\pi(\sqrt{n}) \leqslant \sqrt{n} < \dfrac{n}{\ln(n)}$, puis en déduire que $\pi(n) \leqslant 4 \dfrac{\ln(n)}{n}$. On pourra remarquer que $2 > \ln(4)$.

4. Soit $x \geqslant 3$. En utilisant la croissance de $t \mapsto \dfrac{t}{\ln(t)}$ sur $[e, +\infty[$, montrer que $\pi(x) \leqslant 4\,\dfrac{x}{\ln(x)}$.

III – Minoration de π(x)

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que $\binom{2n}{n} \leqslant (2n)^{\pi(2n)}$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Vérifier que $\dfrac{2n\ln(2)}{\ln(2n)} - 1 \geqslant \dfrac{n\ln(2)}{\ln(2n)}$, puis en déduire que $\pi(2n) \geqslant n\,\dfrac{\ln(2)}{\ln(2n)}$.

3. Soit $x \geqslant 3$. Montrer que $\pi(x) \geqslant \dfrac{\ln(2)\,x}{6\ln(x)}$. On pourra poser $n = \lfloor x/2 \rfloor$ et utiliser Q12.

On admet dans la suite le théorème des nombres premiers : $\pi(x) \underset{x\to+\infty}{\sim} \dfrac{x}{\ln(x)}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\pi(x)$ compte les nombres premiers $\leqslant x$: $\pi(10) = 4$ $(2, 3, 5, 7)$.
- La formule du binôme et les coefficients binomiaux.
- $v_p(n)$: l'exposant de p dans n. Exemple : $v_2(12) = 2$ car $12 = 2^2 \times 3$.

Ce qu'on te demande. Encadrer $\pi(x)$ entre deux multiples de $\frac{x}{\ln x}$, en contrôlant des produits de nombres premiers grâce aux coefficients binomiaux.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Majorer le coefficient central

Le coup d'œil. Les deux termes du milieu de la ligne $2n+1$ sont égaux, et la somme de toute la ligne vaut 2^{2n+1}.

Par le binôme : $\sum_{k=0}^{2n+1}\binom{2n+1}{k} = 2^{2n+1} = 2\times 4^n$. Tous les termes sont positifs, et deux d'entre eux valent $\binom{2n+1}{n}$. Donc

$$2\binom{2n+1}{n} \leqslant 2\times 4^n, \qquad \text{soit} \qquad \binom{2n+1}{n} \leqslant 4^n.$$

Exemple $n = 2$: $\binom{5}{2} = 10 \leqslant 16$.

Étape 2. Chaque premier de l'intervalle divise le coefficient

Le coup d'œil. Multiplier le coefficient par $n!$ fait apparaître le produit des entiers de $n+2$ à $2n+1$.

Soit p premier avec $n+2 \leqslant p \leqslant 2n+1$. On a $n!\binom{2n+1}{n} = (n+2)(n+3)\cdots(2n+1)$, et p est l'un de ces facteurs : p divise $n!\binom{2n+1}{n}$.

Mais p ne divise pas $n!$: tous les facteurs $1, 2, \dots, n$ sont plus petits que p, et un premier qui divise un produit divise l'un des facteurs. Par le lemme d'Euclide, p divise $\binom{2n+1}{n}$.

Étape 3. Le produit divise, donc il est plus petit

Le coup d'œil. Des nombres premiers distincts qui divisent tous un entier : leur produit le divise aussi.

Les premiers de $[\![n+2, 2n+1]\!]$ sont distincts et divisent tous $\binom{2n+1}{n}$, donc leur produit le divise. Un diviseur d'un entier $\geqslant 1$ est plus petit que lui :

$$\prod_{\substack{n+2 \leqslant p \leqslant 2n+1 \\ p \text{ premier}}} p \leqslant \binom{2n+1}{n} \leqslant 4^n.$$

S'il n'y a aucun premier dans l'intervalle, le produit vide vaut 1 et l'inégalité reste vraie.

Question 2

Étape 1. Mettre en place une récurrence forte

*Le coup d'œil. Pour passer au rang $n+1$, on va utiliser un rang proche de $\frac{n}{2}$: c'est une récurrence **forte**. On note Π_n le produit des premiers $\leqslant n$.*

Montrons $\mathcal{P}(n)$: « $\Pi_n < 4^n$ » pour tout $n \geqslant 1$.

Initialisation. $\Pi_1 = 1 < 4$ (produit vide) et $\Pi_2 = 2 < 16$.

Hérédité. Soit $n \geqslant 2$ tel que $\mathcal{P}(1), \dots, \mathcal{P}(n)$ soient vraies. On montre $\mathcal{P}(n+1)$ en distinguant la parité de $n+1$.

Étape 2. Cas n + 1 pair

Le coup d'œil. Un nombre pair $\geqslant 4$ n'est pas premier.

Si $n+1$ est pair, $n+1 \geqslant 4$ n'est pas premier, donc les premiers $\leqslant n+1$ sont ceux $\leqslant n$:

$$\Pi_{n+1} = \Pi_n < 4^n < 4^{n+1}.$$

Étape 3. Cas n + 1 impair : couper le produit en deux

Le coup d'œil. Écrire $n+1 = 2m+1$ et séparer les premiers $\leqslant m+1$ de ceux entre $m+2$ et $2m+1$: la première moitié relève de l'hypothèse de récurrence, la seconde de Q1.

Si $n+1 = 2m+1$ avec $m \geqslant 1$: $\Pi_{2m+1} = \Pi_{m+1} \times \prod_{m+2 \leqslant p \leqslant 2m+1} p$.

- $m+1 \leqslant 2m = n$, donc l'hypothèse de récurrence donne $\Pi_{m+1} < 4^{m+1}$.
- Q1 (avec m à la place de n) donne $\prod_{m+2 \leqslant p \leqslant 2m+1} p \leqslant 4^m$.

Donc $\Pi_{n+1} < 4^{m+1} \cdot 4^m = 4^{2m+1} = 4^{n+1}$.

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \qquad \prod_{\substack{p \leqslant n \\ p \text{ premier}}} p < 4^n.$$

Exemple : $\Pi_{10} = 210 < 4^{10} \approx 10^6$. La borne est large mais suffira.

Question 3

Étape 1. Se ramener à un entier

Le coup d'œil. Les nombres premiers sont des entiers : $p \leqslant x \iff p \leqslant \lfloor x \rfloor$.

Soit $x \geqslant 1$; alors $\lfloor x \rfloor \geqslant 1$. Comme un premier p est entier, $p \leqslant x \iff p \leqslant \lfloor x \rfloor$. Avec Q2 et $\lfloor x \rfloor \leqslant x$:

$$\prod_{\substack{p \leqslant x \\ p \text{ premier}}} p = \Pi_{\lfloor x \rfloor} < 4^{\lfloor x \rfloor} \leqslant 4^x.$$

Question 4

Étape 1. La majoration

Le coup d'œil. Le coefficient central est un terme de la somme $\sum_k \binom{2n}{k} = 4^n$, et il y en a d'autres, strictement positifs.

$4^n = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k}$. Comme $n \geqslant 1$, la somme contient aussi $\binom{2n}{0} = 1 > 0$, donc $\binom{2n}{n} < 4^n$.

Étape 2. La minoration : le plus grand terme

Le coup d'œil. Une somme de N termes est au plus N fois le plus grand terme. Ici le plus grand est $\binom{2n}{n}$; on regroupe les deux termes extrêmes $(1+1)$ pour n'avoir que $2n$ termes.

La ligne $2n$ a $2n+1$ termes. On regroupe $\binom{2n}{0} + \binom{2n}{2n} = 2 \leqslant \binom{2n}{n}$ (car $n \geqslant 1$). Il reste $2n$ « paquets », chacun $\leqslant \binom{2n}{n}$:

$$4^n = 2 + \sum_{k=1}^{2n-1} \binom{2n}{k} \leqslant 2n \binom{2n}{n}.$$

$$\frac{4^n}{2n} \leqslant \binom{2n}{n} < 4^n.$$

Exemple $n = 3$: $\frac{64}{6} \approx 10{,}7 \leqslant 20 < 64$.

Question 5

Étape 1. Écrire la valuation comme un comptage

Le coup d'œil. $v_p(n!) = \sum_{i=1}^{n} v_p(i)$, et $v_p(i)$ est le nombre de puissances p^k $(k \geqslant 1)$ qui divisent i.

Comme $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$: $v_p(n!) = \sum_{i=1}^{n} v_p(i)$ (pour $n = 0$, les deux membres de Q5 sont nuls).

Pour $i \geqslant 1$, p^k divise i si et seulement si $k \leqslant v_p(i)$. Donc $v_p(i) = \operatorname{card}\{k \geqslant 1 : p^k \mid i\} = \sum_{k \geqslant 1} \mathbf{1}_{p^k \mid i}$.

Exemple : $v_2(12) = 2$ car $2 \mid 12$, $4 \mid 12$, $8 \nmid 12$.

Étape 2. Échanger les sommes

Le coup d'œil. On intervertit : pour chaque k, on compte les $i \leqslant n$ multiples de p^k.

Toutes les sommes sont finies ($\mathbf{1}_{p^k \mid i} = 0$ dès que $p^k > n$), on peut les intervertir :

$$v_p(n!) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{k \geqslant 1} \mathbf{1}_{p^k \mid i} = \sum_{k \geqslant 1} \operatorname{card}\{i \leqslant n : p^k \mid i\} = \sum_{k \geqslant 1} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor .$$

$$\boxed{v_p(n!) = \sum_{k=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor \quad \text{(formule de Legendre).}}$$

La somme est finie : ses termes sont nuls dès que $p^k > n$. Exemple : $v_2(10!) = 5 + 2 + 1 = 8$.

Question 6

Étape 1. La valuation du coefficient central

Le coup d'œil. $\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{n!\,n!}$ et la valuation transforme produits et quotients en sommes et différences.

$v_p((2n)!) = v_p(\binom{2n}{n}) + 2v_p(n!)$, donc avec Q5 :

$$v_p\binom{2n}{n} = \sum_{i \geqslant 1} c_i, \qquad c_i = \left\lfloor \frac{2n}{p^i} \right\rfloor - 2\left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor .$$

Étape 2. Chaque terme vaut 0 ou 1

Le coup d'œil. Avec $y = \frac{n}{p^i}$, on a $c_i = \lfloor 2y \rfloor - 2\lfloor y \rfloor \in \{0, 1\}$.

Posons $y = \frac{n}{p^i}$ et $m = \lfloor y \rfloor$: $m \leqslant y < m + 1$, donc $2m \leqslant 2y < 2m + 2$, donc $\lfloor 2y \rfloor \in \{2m, 2m + 1\}$. Ainsi $c_i \in \{0, 1\}$.

De plus, si $p^i > 2n$, les deux parties entières sont nulles : $c_i = 0$.

Étape 3. Compter les termes non nuls

Le coup d'œil. Seuls les i tels que $p^i \leqslant 2n$ comptent, et chacun apporte au plus 1.

Soit j le plus grand entier tel que $p^j \leqslant 2n$. D'après l'étape précédente, $v_p(\binom{2n}{n}) \leqslant \operatorname{card}\{1, \dots, j\} = j$, donc $p^{v_p\binom{2n}{n}} \leqslant p^j \leqslant 2n$.

Si p^k divise $\binom{2n}{n}$, alors $k \leqslant v_p(\binom{2n}{n})$, donc

$$p^k \leqslant p^{v_p\binom{2n}{n}} \leqslant 2n.$$

Exemple : $\binom{10}{5} = 252 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7$, et $4, 9, 7 \leqslant 10$.

Question 7

Étape 1. Moins de facteurs, tous $\geqslant 1$

Le coup d'œil. Le second produit porte sur une partie des premiers du premier produit, et les facteurs retirés valent au moins 2.

$\{p \text{ premier} : \sqrt{n} < p \leqslant n\} \subset \{p \text{ premier} : p \leqslant n\}$. Le produit de gauche est celui de droite multiplié par les premiers $\leqslant \sqrt{n}$, qui sont tous $\geqslant 2 > 1$:

$$\prod_{p \leqslant n} p \geqslant \prod_{\sqrt{n} < p \leqslant n} p.$$

Question 8

Étape 1. Minorer le produit

Le coup d'œil. Combien de facteurs, et quelle taille minimale ? Il y a $\pi(n) - \pi(\sqrt{n})$ premiers dans $]\sqrt{n}, n]$, chacun plus grand que $\sqrt{n}$.

Le nombre de premiers dans $]\sqrt{n}, n]$ est $\pi(n) - \pi(\sqrt{n})$, et chacun est $> \sqrt{n} = n^{1/2}$:

$$\prod_{\sqrt{n} < p \leqslant n} p \geqslant (n^{1/2})^{\pi(n) - \pi(\sqrt{n})} = n^{(\pi(n) - \pi(\sqrt{n}))/2}.$$

Étape 2. Majorer avec Q7 et Q2

Le coup d'œil. Enchaîner les inégalités.

Avec Q7 puis Q2 :

$$n^{(\pi(n) - \pi(\sqrt{n}))/2} \leqslant \prod_{\sqrt{n} < p \leqslant n} p \leqslant \prod_{p \leqslant n} p < 4^n.$$

Question 9

Étape 1. $\pi(\sqrt{n}) \leqslant \sqrt{n}$

Le coup d'œil. Les premiers $\leqslant \sqrt{n}$ sont parmi les entiers $1, 2, \ldots, \lfloor \sqrt{n} \rfloor$.

$\{p \text{ premier} : p \leqslant \sqrt{n}\} \subset \{1, \ldots, \lfloor \sqrt{n} \rfloor\}$, donc $\pi(\sqrt{n}) \leqslant \lfloor \sqrt{n} \rfloor \leqslant \sqrt{n}$.

Étape 2. $\sqrt{n} < n / \ln n$

Le coup d'œil. En divisant par $\sqrt{n}$, cela revient à $\ln n < \sqrt{n}$. On étudie $h(t) = \sqrt{t} - \ln t$: c'est là que sert $2 > \ln 4$.

Pour $n \geqslant 2$, $\ln n > 0$ et $\sqrt{n} < \frac{n}{\ln n} \iff \ln n < \sqrt{n}$.

Soit $h(t) = \sqrt{t} - \ln t$ sur $]0, +\infty[$: $h'(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}} - \frac{1}{t} = \frac{\sqrt{t}-2}{2t}$, négatif sur $]0, 4]$, positif ensuite. Le minimum vaut $h(4) = 2 - \ln 4 > 0$. Donc $\ln t < \sqrt{t}$ pour tout $t > 0$.

$$\pi(\sqrt{n}) \leqslant \sqrt{n} < \frac{n}{\ln n}.$$

Étape 3. Majorer π(n) (et une coquille du sujet)

Le coup d'œil. L'inégalité demandée contient une coquille : on montre $\pi(n) \leqslant 4\frac{n}{\ln n}$. On prend le logarithme dans Q8.

$\frac{\ln n}{n} \to 0$ alors que $\pi(n) \geqslant 1$: l'inégalité écrite est fausse pour n grand. On établit la version voulue (celle qu'utilise Q10).

Le logarithme de Q8 donne $\frac{\pi(n)-\pi(\sqrt{n})}{2} \ln n < n \ln 4$, donc

$$\pi(n) < 2 \ln 4 \cdot \frac{n}{\ln n} + \pi(\sqrt{n}).$$

Avec la première partie, $\pi(\sqrt{n}) < \frac{n}{\ln n}$, donc

$$\pi(n) < (1 + 2 \ln 4) \frac{n}{\ln n}.$$

Or $\ln 4 \approx 1{,}386$, donc $1 + 2 \ln 4 \approx 3{,}77 < 4$:


$$\forall n \geqslant 2, \qquad \pi(n) \leqslant 4 \frac{n}{\ln n}.$$

Question 10

Étape 1. La croissance de t / ln t

Le coup d'œil. Dériver $g(t) = \frac{t}{\ln t}$.

$g'(t) = \frac{\ln t - 1}{(\ln t)^2} \geqslant 0$ pour $t \geqslant e$: g est croissante sur $[e, +\infty[$, donc sur $[3, +\infty[$.



$t \mapsto \frac{t}{\ln t}$ décroît jusqu'en e, puis croît : son minimum vaut e.

Étape 2. Passer de x à sa partie entière

Le coup d'œil. $\pi(x) = \pi(\lfloor x \rfloor)$, et Q9 s'applique à l'entier $\lfloor x \rfloor$.

Soit $x \geqslant 3$ et $m = \lfloor x \rfloor \geqslant 3$. Les premiers étant entiers, $\pi(x) = \pi(m)$. Avec Q9, puis la croissance de g sur $[3, +\infty[$ et $m \leqslant x$:

$$\pi(x) = \pi(m) \leqslant 4\,\frac{m}{\ln m} \leqslant 4\,\frac{x}{\ln x}.$$

Question 11

Étape 1. Décomposer le coefficient

Le coup d'œil. Seuls des premiers $\leqslant 2n$ apparaissent dans $\binom{2n}{n}$, il y en a au plus $\pi(2n)$.

Un premier qui divise $\binom{2n}{n}$ divise $(2n)! = 1 \cdot 2 \cdots (2n)$, donc l'un des facteurs : il est $\leqslant 2n$. D'où $\binom{2n}{n} = \prod_{p \leqslant 2n} p^{v_p}$, avec $v_p = v_p\binom{2n}{n}$, produit de $\pi(2n)$ facteurs.

Étape 2. Chaque facteur est au plus 2n

Le coup d'œil. Q6 avec $k = v_p$.

p^{v_p} divise $\binom{2n}{n}$, donc par Q6, $p^{v_p} \leqslant 2n$. Le produit de $\pi(2n)$ facteurs $\leqslant 2n$:

$$\binom{2n}{n} \leqslant (2n)^{\pi(2n)}.$$

Exemple $n = 5$: $252 \leqslant 10^4$ ($\pi(10) = 4$).

Question 12

Étape 1. Vérifier l'inégalité

Le coup d'œil. Multiplier par $\ln(2n) > 0$ *: on tombe sur* $2^n \geqslant 2n$.

Comme $\ln(2n) > 0$, l'inégalité équivaut à $2n\ln 2 - \ln(2n) \geqslant n\ln 2$, soit $n\ln 2 \geqslant \ln(2n)$, soit $2^n \geqslant 2n$.

Cela se montre par récurrence : vrai pour $n = 1$ ($2 \geqslant 2$), et si $2^n \geqslant 2n$ alors $2^{n+1} \geqslant 4n \geqslant 2n + 2$.

Étape 2. Prendre le logarithme

Le coup d'œil. Combiner Q4 (minoration de $\binom{2n}{n}$*) et Q11 (majoration), puis passer au logarithme.*

Q4 et Q11 : $\frac{4^n}{2n} \leqslant \binom{2n}{n} \leqslant (2n)^{\pi(2n)}$. Le logarithme donne $2n\ln 2 - \ln(2n) \leqslant \pi(2n)\ln(2n)$, puis

$$\pi(2n) \geqslant \frac{2n\ln 2}{\ln(2n)} - 1 \geqslant \frac{n\ln 2}{\ln(2n)}.$$

$$\boxed{\pi(2n) \geqslant n\,\frac{\ln 2}{\ln(2n)}.}$$

Question 13

Étape 1. Choisir n = ⌊x/2⌋

Le coup d'œil. Avec $n = \lfloor x/2 \rfloor$ *:* $2n \leqslant x$ *et* $n > \frac{x}{2} - 1$*. Comme* π *est croissante,* $\pi(x) \geqslant \pi(2n)$.

Soit $x \geqslant 3$ et $n = \lfloor x/2 \rfloor \geqslant 1$. On a $\frac{x}{2} - 1 < n \leqslant \frac{x}{2}$, donc $2n \leqslant x$, $\pi(x) \geqslant \pi(2n)$ et $\ln(2n) \leqslant \ln x$. Avec Q12 :

$$\pi(x) \geqslant \frac{n\ln 2}{\ln(2n)} \geqslant \frac{n\ln 2}{\ln x} > \Big(\frac{x}{2} - 1\Big)\frac{\ln 2}{\ln x} = \frac{(x-2)\ln 2}{2\ln x}.$$

Étape 2. Conclure

Le coup d'œil. Il reste à comparer $\frac{x-2}{2}$ *et* $\frac{x}{6}$.

$\frac{x-2}{2} \geqslant \frac{x}{6} \iff 3x-6 \geqslant x \iff x \geqslant 3$: vrai. Donc

$$\forall x \geqslant 3, \qquad \frac{\ln(2)\, x}{6 \ln x} \leqslant \pi(x) \leqslant 4\, \frac{x}{\ln x}.$$

Ordre de grandeur : pour $x = 1000$, l'encadrement donne $16 \leqslant \pi(1000) \leqslant 579$, et en vrai $\pi(1000) = 168$, proche de $\frac{1000}{\ln 1000} \approx 145$.

Le piège

Oublier que les premiers sont des entiers : c'est ce qui permet de remplacer x par $\lfloor x \rfloor$ partout. En Q9, ne pas chercher à prouver l'inégalité telle qu'elle est écrite : elle contient une coquille.

La méthode

Pour contrôler des nombres premiers, on les fait diviser un coefficient binomial bien choisi, puis on encadre ce coefficient avec la formule du binôme.

Rappels de cours utilisés

- **Binôme de Newton et symétrie.**

$$\sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} = (1+1)^m = 2^m, \qquad \binom{m}{k} = \binom{m}{m-k}.$$

Tous les termes sont des entiers $\geqslant 1$. Le coefficient central $\binom{2n}{n}$ est le plus grand de la ligne $2n$.

- **Lemme d'Euclide.** Si un nombre premier p divise un produit ab, alors p divise a ou p divise b.

Conséquence : si des nombres premiers **distincts** $p_1, \dots, p_m$ divisent tous N, alors leur produit $p_1 \cdots p_m$ divise N (ils sont premiers entre eux deux à deux).

- **Récurrence forte.** Si $P(1)$ est vraie et si, pour tout n, « $P(1), \dots, P(n)$ vraies » entraîne « $P(n+1)$ vraie », alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geqslant 1$.

Utile quand $P(n+1)$ se déduit d'un rang bien plus petit, comme $P(\frac{n}{2})$.

- **Partie entière.**

$$\lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z}, \qquad x - 1 < \lfloor x \rfloor \leqslant x.$$

Pour $m \in \mathbb{N}^*$ et $n \in \mathbb{N}$, le nombre de multiples de m dans $\{1, \dots, n\}$ vaut $\lfloor \frac{n}{m} \rfloor$.

- **Valuation p-adique.** $v_p(n)$ est l'exposant de p dans la décomposition de n en facteurs premiers : $n = \prod_p p^{v_p(n)}$.

$$v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b), \qquad p^k \mid n \iff k \leqslant v_p(n).$$

- **Étude de fonction.** Pour comparer deux fonctions, on étudie leur différence h : on calcule h', on en déduit les variations de h, puis son minimum. Si ce minimum est > 0, on a $h > 0$ partout.