CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Applications linéaires continues

Énoncé

Soient E, F deux espaces vectoriels normés réels.

1. Soit $f : E \to F$ linéaire. Montrer l'équivalence des propriétés : (P1) f est continue sur E ; (P2) f est continue en 0_E ; (P3) il existe $k > 0$ tel que $\|f(x)\|_F \leqslant k\|x\|_E$ pour tout x.
2. Sur $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ muni de $\| \ \|_\infty$, on pose $\psi(f) = \displaystyle\int_0^1 t\, f(t)\, dt$. Montrer que ψ est linéaire continue.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f linéaire.

Ce qu'on te demande. La caractérisation de la continuité des applications linéaires, puis un exemple.

Corrigé

1. P1 $\Rightarrow$ P2

Le coup d'œil. Continue partout, donc en particulier en 0.

Si f est continue en tout point de E, elle l'est en particulier en 0_E.

2. P2 $\Rightarrow$ P3

Le coup d'œil. La continuité en 0 avec $\varepsilon = 1$ donne : petits vecteurs $\Rightarrow$ petites images. Par homogénéité, on ramène tout vecteur à un petit vecteur.

Avec $\varepsilon = 1$: il existe $\eta > 0$ tel que $\|y\| \leqslant \eta \Rightarrow \|f(y)\| \leqslant 1$ (car $f(0) = 0$). Pour $x \neq 0$, on pose $y = \frac{\eta}{\|x\|} x$:

$$\|f(x)\| = \frac{\|x\|}{\eta}\|f(y)\| \leqslant \frac{1}{\eta}\|x\|.$$

(P3) est vraie avec $k = \frac{1}{\eta}$ (et c'est évident pour $x = 0$).

3. P3 ⇒ P1

Le coup d'œil. (P3) dit que f est lipschitzienne, grâce à la linéarité.

$\|f(x) - f(y)\| \leqslant k\|x - y\|$: f est lipschitzienne, donc continue sur E.

4. Exemple

Le coup d'œil. Linéarité de l'intégrale, puis majoration de $|tf(t)|$ par $t\|f\|_\infty$.

ψ est linéaire par linéarité de l'intégrale. Et

$$|\psi(f)| \leqslant \int_0^1 t\,|f(t)|\,dt \leqslant \|f\|_\infty \int_0^1 t\,dt = \frac{1}{2}\|f\|_\infty.$$

(P3) est vérifiée avec $k = \frac{1}{2}$: ψ est continue. (Avec $f = 1$, on a égalité : $\frac{1}{2}$ est la meilleure constante.)

Le piège

Oublier que $f(0) = 0$ (linéarité) dans le passage de (P2) à (P3).

La méthode

Continuité d'une application linéaire : chercher une majoration $\|f(x)\| \leqslant k\|x\|$.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une application linéaire.** Pour $u : E \to F$ linéaire, il y a équivalence entre : u continue sur E ; u continue en 0 ;

  $$\exists k \geqslant 0,\ \forall x \in E,\quad \|u(x)\|_F \leqslant k\,\|x\|_E.$$

  En dimension finie (au départ), toute application linéaire est continue.