CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

# Une inégalité symétrique

## Énoncé

Soient $a, b > 0$ et $n \in \mathbb{N}$. Montrer que

$$\left(1+\frac{a}{b}\right)^n + \left(1+\frac{b}{a}\right)^n \geqslant 2^{n+1}.$$

Cas d'égalité ?

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Les deux termes sont positifs, et ils jouent des rôles symétriques.

**Ce qu'on te demande.** Minorer une somme de deux puissances.

## Corrigé

### Inégalité arithmético-géométrique

**Inégalité arithmético-géométrique** à deux termes : pour $p, q \geqslant 0$, on part d'un carré, toujours positif :

$$p+q-2\sqrt{pq} = (\sqrt{p})^2 - 2\sqrt{p}\sqrt{q} + (\sqrt{q})^2 = (\sqrt{p}-\sqrt{q})^2 \geqslant 0,$$

donc $p+q \geqslant 2\sqrt{pq}$, avec égalité si et seulement si $p=q$.

On pose $u = 1+\frac{a}{b} > 0$, $v = 1+\frac{b}{a} > 0$, et on applique avec $p=u^n$, $q=v^n$ :

$$< spandata-k = "amgm" > u^n + v^n \geqslant 2\sqrt{u^n v^n} = 2(uv)^{n/2} < /span > .$$

### Minorer le produit

On développe : $uv = 1+\frac{b}{a}+\frac{a}{b}+1 = 2+\frac{a}{b}+\frac{b}{a}$. Avec $y = \frac{a}{b} > 0$ : $y+\frac{1}{y}-2 = \frac{(y-1)^2}{y} \geqslant 0$, donc $uv \geqslant 4$. Donc $u^n + v^n \geqslant 2 \cdot 4^{n/2} = 2^{n+1}$.

$$\boxed{\left(1+\tfrac{a}{b}\right)^n + \left(1+\tfrac{b}{a}\right)^n \geqslant 2^{n+1}.}$$

Égalité pour $n \geqslant 1 \iff u = v$ et $uv = 4 \iff a = b$ (pour $n = 0$, toujours $2 = 2$).

**Le piège**

Développer par le binôme : c'est possible mais très long. L'inégalité arithmético-géométrique va droit au but.

**La méthode**

Somme symétrique de deux termes : minorer par $2\sqrt{\text{produit}}$, le produit se simplifie souvent.

## Rappels de cours utilisés

- **Inégalité arithmético-géométrique (deux termes).**

$$u, v \geqslant 0 \implies u + v \geqslant 2\sqrt{uv}, \qquad y > 0 \implies y + \frac{1}{y} \geqslant 2.$$

Car $(\sqrt{u} - \sqrt{v})^2 \geqslant 0$. Égalité si et seulement si $u = v$.