CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

L'identité d'Hermite

Énoncé

Soit $n \geqslant 1$ un entier. Pour $x \in \mathbb{R}$, on pose

$$g(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor x + \frac{k}{n} \right\rfloor - \lfloor nx \rfloor.$$

1. Montrer que $g\left(x + \dfrac{1}{n}\right) = g(x)$ pour tout réel x.
2. Calculer g sur $\left[0, \dfrac{1}{n}\right[$.
3. En déduire que pour tout réel x : $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor x + \frac{k}{n} \right\rfloor = \lfloor nx \rfloor$.
4. Écrire le cas $n = 2$, puis calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor \frac{m+k}{n} \right\rfloor$ pour $m \in \mathbb{Z}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $n \geqslant 1$ fixé, x réel quelconque.

Ce qu'on te demande. Montrer que g est nulle partout, en utilisant une périodicité.

Corrigé

Décaler x de 1/n

$$g\left(x + \tfrac{1}{n}\right) = \sum_{k=0}^{n-1} \left\lfloor x + \frac{k+1}{n} \right\rfloor - \lfloor nx + 1 \rfloor.$$

Avec $j = k + 1$, la somme devient $\displaystyle\sum_{j=1}^{n} \left\lfloor x + \frac{j}{n} \right\rfloor$, et $\lfloor nx + 1 \rfloor = \lfloor nx \rfloor + 1$.

Comparer les deux sommes

$$\sum_{j=1}^{n}\left\lfloor x+\frac{j}{n}\right\rfloor=\sum_{j=0}^{n-1}\left\lfloor x+\frac{j}{n}\right\rfloor+\lfloor x+1\rfloor-\lfloor x\rfloor=\sum_{j=0}^{n-1}\left\lfloor x+\frac{j}{n}\right\rfloor+1.$$

Donc

$$g\left(x+\tfrac{1}{n}\right)=\sum_{j=0}^{n-1}\left\lfloor x+\frac{j}{n}\right\rfloor+1-\lfloor nx\rfloor-1=g(x).$$

Sur [0, 1/n[

Soit $0\leqslant x<\frac{1}{n}$ et $k\in\{0,\dots,n-1\}$. On encadre $x+\frac{k}{n}$:

- minoration : $x\geqslant 0$ et $\frac{k}{n}\geqslant 0$, donc $x+\frac{k}{n}\geqslant 0$;
- majoration : $x<\frac{1}{n}$ et $\frac{k}{n}\leqslant\frac{n-1}{n}$, donc $x+\frac{k}{n}<\frac{1}{n}+\frac{n-1}{n}=1$.

Un nombre de $[0,1[$ a pour partie entière 0 : $\left\lfloor x+\frac{k}{n}\right\rfloor=0$ pour chaque k. De même, en multipliant $0\leqslant x<\frac{1}{n}$ par n : $0\leqslant nx<1$, donc $\lfloor nx\rfloor=0$.

$$g(x)=\underbrace{0+\cdots+0}_{n\text{ termes}}-0=0\quad\text{sur}\quad\left[0,\tfrac{1}{n}\right[.$$

Conclure par périodicité

Soit $x\in\mathbb{R}$, $p=\lfloor nx\rfloor$ et $x_0=x-\frac{p}{n}$. Comme $p\leqslant nx<p+1$, on a $0\leqslant nx_0<1$, donc $x_0\in\left[0,\frac{1}{n}\right[$. Par périodicité :

$$g(x)=g\left(x_0+\tfrac{p}{n}\right)=g(x_0)=0.$$

$$\forall x\in\mathbb{R},\qquad\sum_{k=0}^{n-1}\left\lfloor x+\frac{k}{n}\right\rfloor=\lfloor nx\rfloor.$$



g est $\frac{1}{n}$-périodique : ses valeurs sur $\left[0,\frac{1}{n}\right[$ (en rouge) se recopient sur chaque intervalle $\left[\frac{p}{n},\frac{p+1}{n}\right[$.

Cas n = 2 et application

$n=2$: $\lfloor x\rfloor+\lfloor x+\frac{1}{2}\rfloor=\lfloor 2x\rfloor$. Vérification : $x=0{,}7$ donne $0+1=1=\lfloor 1{,}4\rfloor$.

Application : avec $x=\frac{m}{n}$, $\left\lfloor\frac{m+k}{n}\right\rfloor=\left\lfloor x+\frac{k}{n}\right\rfloor$, donc

$$\sum_{k=0}^{n-1}\left\lfloor\frac{m+k}{n}\right\rfloor=\lfloor m\rfloor=m.$$

Exemple : $m=7$, $n=3$: $\lfloor 7/3\rfloor+\lfloor 8/3\rfloor+\lfloor 9/3\rfloor=2+2+3=7$.

Le piège

Oublier que la périodicité marche aussi vers les x négatifs : il faut $g(x-\frac{1}{n})=g(x)$, qui découle de la question 1 appliquée en $x-\frac{1}{n}$.

La méthode

Pour une identité avec des parties entières : étudier la différence des deux membres, montrer qu'elle est périodique, et la calculer sur une seule période.

Rappels de cours utilisés

- **Caractériser une partie entière.**

$$\lfloor y\rfloor=m \iff m\in\mathbb{Z}\ \wedge\ m\leqslant y<m+1.$$

$$N\in\mathbb{Z},\ N\leqslant y \implies N\leqslant\lfloor y\rfloor.$$

- $3\leqslant\pi<4\Rightarrow\lfloor\pi\rfloor=3$;
- $\lfloor -0{,}5\rfloor=-1$.