CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

Le groupe de Prüfer

Énoncé

Soit p premier et $\mathbb{U}_{p^k}$ le groupe des racines p^k-ièmes de l'unité. On pose $G_p = \bigcup_{k\geqslant 0} \mathbb{U}_{p^k}$ (les complexes z tels que $z^{p^k} = 1$ pour un certain k).

1. Montrer que $\mathbb{U}_{p^k} \subset \mathbb{U}_{p^{k+1}}$, et que G_p est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.
2. Soit $z \in G_p$ d'ordre p^m. Montrer que $\langle z\rangle = \mathbb{U}_{p^m}$.
3. Soit H un sous-groupe de G_p, $H \neq G_p$. Montrer que les ordres des éléments de H sont bornés, puis que $H = \mathbb{U}_{p^m}$ pour un certain m.
4. Montrer que G_p n'est engendré par aucune partie finie.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathbb{U}_{p^k}$ est cyclique d'ordre p^k, engendré par $e^{2i\pi/p^k}$.

Ce qu'on te demande. Décrire tous les sous-groupes de G_p.

Corrigé

1. Une réunion croissante

$\mathbb{U}_{p^k} \subset \mathbb{U}_{p^{k+1}}$ par le calcul ci-dessus. Pour $x, y \in G_p$: $x \in \mathbb{U}_{p^k}$, $y \in \mathbb{U}_{p^l}$, et avec $m = \max(k, l)$ les deux sont dans le groupe $\mathbb{U}_{p^m}$, donc $xy^{-1} \in \mathbb{U}_{p^m} \subset G_p$. Et $1 \in G_p$.

2. Les sous-groupes monogènes

z est d'ordre p^m, donc $z^{p^m} = 1$: $z \in \mathbb{U}_{p^m}$, et toutes ses puissances aussi. Donc $\langle z\rangle \subset \mathbb{U}_{p^m}$.

Comptage : le sous-groupe engendré par z a autant d'éléments que l'ordre de z, soit p^m ; et $\mathbb{U}_{p^m}$ a exactement p^m éléments (les racines p^m-ièmes de l'unité). Une inclusion entre deux ensembles finis de même cardinal est une égalité :

$$< spandata - k = "cyc" > \langle z\rangle = \mathbb{U}_{p^m} < /span > .$$

3. Les ordres dans H sont bornés


Les ordres des éléments de H sont des puissances de p. S'ils n'étaient pas bornés, pour tout k il y aurait $z \in H$ d'ordre p^m avec $m \geqslant k$, et $\mathbb{U}_{p^k} \subset \mathbb{U}_{p^m} = \langle z \rangle \subset H$. Donc $G_p = \bigcup_k \mathbb{U}_{p^k} \subset H$: contradiction.

4. H est l'un des $\mathbb{U}_{p^m}$

Soit p^m le plus grand ordre d'un élément de H, atteint en z. Alors $\mathbb{U}_{p^m} = \langle z \rangle \subset H$. Inversement, tout $w \in H$ a un ordre $p^{m'}$ avec $m' \leqslant m$, donc $w^{p^m} = 1$ et $w \in \mathbb{U}_{p^m}$.

$$H \subsetneq G_p \implies H = \mathbb{U}_{p^m} \text{ pour un } m \in \mathbb{N}.$$

Les sous-groupes de G_p forment une chaîne : $\{1\} \subset \mathbb{U}_p \subset \mathbb{U}_{p^2} \subset \cdots \subset G_p$.



Pour $p = 2$: $\mathbb{U}_2 \subset \mathbb{U}_4 \subset \mathbb{U}_8 \subset \ldots$ Chaque étape ajoute les racines carrées des points précédents.

5. Pas de famille génératrice finie

Soit $A \subset G_p$ finie. Chaque $a \in A$ est dans un $\mathbb{U}_{p^{n_a}}$; avec $n = \max n_a$, $A \subset \mathbb{U}_{p^n}$, donc $\langle A \rangle \subset \mathbb{U}_{p^n} \neq G_p$ (car $e^{2i\pi/p^{n+1}} \notin \mathbb{U}_{p^n}$). G_p n'est pas de type fini.

Le piège

Oublier de justifier que $\mathbb{U}_{p^m} \subset H$: c'est le fait que $\mathbb{U}_{p^m}$ est **cyclique**, engendré par n'importe quel élément d'ordre p^m.

La méthode

Sous-groupes d'une réunion croissante de groupes cycliques : raisonner sur l'ordre maximal des éléments.

Rappels de cours utilisés

- **Sous-groupe : caractérisation.**

$$H \leqslant G \iff \Big(e \in H \text{ et } \forall x, y \in H,\ xy^{-1} \in H\Big).$$

$$H_1 \subset H_2 \subset \cdots \text{ sous-groupes} \implies \bigcup_k H_k \leqslant G.$$

- **Ordre d'un élément. Définition** :

$$\text{ordre}(x) = m = \min\{k \geqslant 1 : x^k = e\}.$$

$$x^k = e \iff m \mid k, \qquad d \mid m \Rightarrow \text{ordre}\,(x^d) = \frac{m}{d}.$$

Groupe fini :

$$\text{ordre}(x) \mid |G|.$$

- **Raisonnement par l'absurde.**

$$\neg P \implies \text{contradiction} \qquad \text{donc} \qquad P.$$