CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Quotients d'une partie non majorée

Énoncé

Soit $A \subset \mathbb{R}_+$ une partie non majorée et $B = \left\{\dfrac{a}{n},\ a \in A,\ n \in \mathbb{N}^*\right\}$.

1. Soient $0 \leqslant \alpha < \beta$. Montrer qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}^*$ tel que, pour $n \geqslant n_0$, les intervalles $I_n = [n\alpha, n\beta]$ et I_{n+1} se chevauchent.
2. En déduire que B rencontre $[\alpha, \beta]$, puis que B est dense dans $\mathbb{R}_+$.
3. Exemples : $A = \{2^k,\ k \in \mathbb{N}\}$, $A = \{\text{nombres premiers}\}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- A non majorée : pour tout réel M, il existe $a \in A$ avec $a \geqslant M$.

Ce qu'on te demande. Trouver $a \in A$ et $n \geqslant 1$ avec $\alpha \leqslant \frac{a}{n} \leqslant \beta$.

Corrigé

1. Traduire le but


Le coup d'œil. Le quotient $\frac{a}{n}$ est gênant ; on multiplie par n pour avoir une condition sur a seul : a doit tomber dans I_n.

Pour $n \geqslant 1$: $\dfrac{a}{n} \in [\alpha, \beta] \iff a \in I_n = [n\alpha, n\beta]$. Il s'agit donc de trouver un $a \in A$ dans l'un des I_n.

2. Les intervalles finissent par se chevaucher

Le coup d'œil. I_n a pour longueur $n(\beta-\alpha)$, qui grandit. Les débuts avancent de α à chaque cran. Dès que la longueur dépasse α, deux intervalles consécutifs se touchent.

$(n+1)\alpha \leqslant n\beta \iff n(\beta-\alpha) \geqslant \alpha \iff n \geqslant \dfrac{\alpha}{\beta-\alpha}$. On prend $n_0 = \left\lfloor \dfrac{\alpha}{\beta-\alpha} \right\rfloor + 1$. Pour $n \geqslant n_0$, le début de I_{n+1} est dans I_n : $I_n \cup I_{n+1} = [n\alpha, (n+1)\beta]$.



Exemple $\alpha = 1$, $\beta = 1{,}6$: $I_1 = [1;1{,}6]$ et $I_2 = [2;3{,}2]$ laissent un trou, puis à partir de $n = 2$ chaque intervalle chevauche le suivant (car $n \times 0{,}6 \geqslant 1$).

3. Une demi-droite recouverte

Le coup d'œil. De proche en proche, les I_n ($n \geqslant n_0$) recouvrent $[n_0\alpha, +\infty[$. Comme A n'est pas majorée, elle a un élément dans cette demi-droite.

Par récurrence, $I_{n_0} \cup \cdots \cup I_N = [n_0\alpha, N\beta]$ pour tout $N \geqslant n_0$. Comme $N\beta \to +\infty$ (si $\beta > 0$, ce qui est le cas car $\beta > \alpha \geqslant 0$) :

$$\bigcup_{n \geqslant n_0} I_n = [n_0\alpha, +\infty[.$$

A n'est pas majorée, donc il existe $a \in A$ avec $a \geqslant n_0\alpha$. Alors $a \in I_n$ pour un certain $n \geqslant n_0$, et $\dfrac{a}{n} \in [\alpha, \beta]$.

4. La densité

Le coup d'œil. Rencontrer tout intervalle $[\alpha, \beta]$ avec $\alpha < \beta$ dans $\mathbb{R}_+$, c'est exactement être dense dans $\mathbb{R}_+$.

Soit $x \geqslant 0$ et $\varepsilon > 0$. Avec $\alpha = x$, $\beta = x + \varepsilon$, on trouve $b \in B$ avec $x \leqslant b \leqslant x + \varepsilon$.

$$B = \left\{\frac{a}{n}\right\} \text{ est dense dans } \mathbb{R}_+.$$

5. Deux exemples

Le coup d'œil. Il suffit de vérifier que chaque A est non majorée.

- $\{2^k\}$ n'est pas majorée : les nombres $\dfrac{2^k}{n}$ sont denses dans $\mathbb{R}_+$.
- Il y a une infinité de nombres premiers (Euclide), donc ils ne sont pas majorés : les $\dfrac{p}{n}$ (p premier) sont denses dans $\mathbb{R}_+$.

Contre-exemple : si $A = [0,1]$ (majorée), alors $B = [0,1]$, qui n'est pas dense dans $\mathbb{R}_+$.

Le piège

Croire que les I_n se chevauchent dès $n = 1$: il peut y avoir des trous au début (voir la figure). Seule la suite de la liste est sans trou.

La méthode

Pour $\alpha \leqslant \frac{a}{n} \leqslant \beta$: multiplier par n et étudier la réunion des intervalles $[n\alpha, n\beta]$.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.
- **Partie dense.** A est dense dans l'intervalle I si tout point de I est approché d'aussi près qu'on veut par des éléments de A :

$$\forall x \in I,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists a \in A, \quad |x - a| \leqslant \varepsilon.$$

De façon équivalente : tout intervalle ouvert non vide contenu dans I rencontre A, ou encore tout $x \in I$ est limite d'une suite d'éléments de A.

Exemple : $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$. **Contre-exemple :** $\mathbb{Z}$ ne l'est pas : aucun entier n'est à moins de 0,4 de $\frac{1}{2}$.