CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Un couple binomial-géométrique

Énoncé

On admet que pour $q \in \mathbb{N}$ et $x \in]-1,1[$, $\sum_{k \geqslant q} \binom{k}{q} x^{k-q} = \dfrac{1}{(1-x)^{q+1}}$. Soit $p \in]0,1[$ et (X,Y) à valeurs dans $\mathbb{N}^2$ avec

$$P(X=k, Y=n) = \binom{n}{k}\left(\frac{1}{3}\right)^k\left(\frac{2}{3}\right)^{n-k} p(1-p)^n \text{ si } k \leqslant n, \quad 0 \text{ sinon.}$$

1. Vérifier qu'il s'agit d'une loi de probabilité.
2. (a) Déterminer la loi de Y.
   (b) Montrer que $1+Y$ suit une loi géométrique.
   (c) Donner $E(Y)$.
3. Déterminer la loi de X.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Sachant $Y=n$, $X \sim \mathcal{B}(n, \frac{1}{3})$.

Ce qu'on te demande. Marginales d'un couple hiérarchique.

Corrigé

1. Somme totale

Le coup d'œil. À n fixé, la somme en k est un binôme égal à 1.

$$\sum_n \sum_{k \leqslant n} (\dots) = \sum_n p(1-p)^n \left(\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\right)^n = \sum_n p(1-p)^n = 1.$$

Les termes sont positifs : c'est une loi.

2. Loi de Y

Le coup d'œil. Même calcul, à n fixé.

$P(Y=n)=p(1-p)^n$, donc $P(1+Y=m)=p(1-p)^{m-1}$: $1+Y\sim\mathcal{G}(p)$, et

$$E(Y)=\frac{1}{p}-1=\frac{1-p}{p}.$$

3. Loi de X

Le coup d'œil. On somme sur $n\geqslant k$ et on utilise la formule admise.

$$P(X=k)=p\Big(\frac{1-p}{3}\Big)^k\sum_{n\geqslant k}\binom{n}{k}\Big(\frac{2(1-p)}{3}\Big)^{n-k}=p\Big(\frac{1-p}{3}\Big)^k\Big(\frac{3}{1+2p}\Big)^{k+1}.$$

Avec x, $1-x=\frac{1+2p}{3}$.

$$P(X=k)=\frac{3p}{1+2p}\Big(\frac{1-p}{1+2p}\Big)^k\ :\ 1+X\sim\mathcal{G}\Big(\frac{3p}{1+2p}\Big).$$

Le piège

Sommer sur $n\geqslant 0$ au lieu de $n\geqslant k$.

La méthode

Couple hiérarchique : sommer d'abord sur la variable « interne » (binôme), puis utiliser la série dérivée de la géométrique.

Rappels de cours utilisés

- **Loi géométrique.**

$$X\sim\mathcal{G}(p):P(X=k)=p(1-p)^{k-1}\ (k\geqslant 1),\quad P(X>n)=(1-p)^n,\quad E(X)=\frac{1}{p},\quad V(X)=\frac{1-p}{p^2}.$$

- **Lois marginales.**

$$P(X=x)=\sum_y P(X=x,Y=y),\qquad P(Y=y)=\sum_x P(X=x,Y=y).$$