CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP

Sous-groupes de $\mathbb{R}$: discrets ou denses

Énoncé

Soit G un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$ non réduit à $\{0\}$, et $a = \inf(G \cap]0, +\infty[)$.

1. Justifier l'existence de a.
2. On suppose $a > 0$. Montrer que $a \in G$, puis que $G = a\mathbb{Z}$.
3. On suppose $a = 0$. Montrer que G est dense dans $\mathbb{R}$.
4. Montrer que $\mathbb{Z} + \sqrt{2}\,\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{R}$.
5. Montrer que $\{\cos n,\ n \in \mathbb{Z}\}$ est dense dans $[-1, 1]$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- G stable par différence, contient un $x \neq 0$.

Ce qu'on te demande. Une alternative : soit G est l'ensemble des multiples d'un plus petit élément positif, soit G est partout.

Corrigé

Existence de a

G n'est pas réduit à $\{0\}$: soit $x \in G$, $x \neq 0$. Comme G est un groupe, l'opposé $-x$ est aussi dans G, et l'un des deux nombres x, $-x$ est strictement positif.

Donc $G^+ = G \cap]0, +\infty[$ est non vide ; il est minoré par 0. **Propriété de la borne inférieure** : toute partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$ a une borne inférieure. Donc $a = \inf G^+$ existe, et $a \geqslant 0$.

a est dans G

Supposons $a > 0$, et par l'absurde $a \notin G$. **Caractérisation de la borne inférieure** : pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un élément de G^+ dans $[a, a + \varepsilon[$.

- Avec $\varepsilon = a$: il existe $y \in G^+$ avec $a \leqslant y < 2a$; et $y \neq a$ (car $a \notin G$), donc $a < y$.
- Avec $\varepsilon = y - a > 0$: il existe $x \in G^+$ avec $a \leqslant x < y$, et de même $a < x$.

Alors $y - x \in G$ (groupe : stable par différence), et

$$0 < y - x < 2a - a = a.$$

Donc $y - x \in G^+$ et $y - x < a = \inf G^+$: contradiction. Donc $a \in G$.

G = a$\mathbb{Z}$

$a \in G$ donne $ka \in G$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$: $a\mathbb{Z} \subset G$. Soit $x \in G$, $k = \lfloor x/a \rfloor$ et $r = x - ka$. Alors $r \in G$ et $0 \leqslant r < a$. Si $r > 0$, $r \in G^+$ et $r < a$: impossible. Donc $r = 0$ et $x = ka$.

$$a > 0 \implies G = a\mathbb{Z}.$$

Cas a = 0 : G est dense

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon > 0$. Comme $\inf G^+ = 0$ et $\varepsilon > 0$, ε n'est pas un minorant de G^+ : il existe $g \in G$ avec $0 < g < \varepsilon$.

Les multiples kg ($k \in \mathbb{Z}$) sont dans G et forment une grille de pas $g < \varepsilon$. On prend $k = \lfloor x/g \rfloor$: $k \leqslant \frac{x}{g} < k + 1$, donc en multipliant par $g > 0$, $kg \leqslant x < kg + g$, soit

$$0 \leqslant x - kg < g < \varepsilon.$$

$$a = 0 \implies G \text{ est dense dans } \mathbb{R}.$$



$a > 0$: $G = a\mathbb{Z}$.



$a = 0$: G est dense.

$\mathbb{Z} + \sqrt{2}\,\mathbb{Z}$

$G = \{p + q\sqrt{2}\}$ contient 0 et est stable par différence : c'est un sous-groupe, non nul. Si on avait $G = a\mathbb{Z}$ avec $a > 0$: $1 = ma$ et $\sqrt{2} = m'a$ avec $m, m' \in \mathbb{Z}$, $m \neq 0$, donc $\sqrt{2} = \dfrac{m'}{m} \in \mathbb{Q}$: impossible. Donc $a = 0$ et G est dense.

Densité de cos n

$H = \mathbb{Z} + 2\pi\mathbb{Z}$ est un sous-groupe ; s'il valait $a\mathbb{Z}$, on aurait $2\pi = \frac{m'}{m} \in \mathbb{Q}$, faux car π est irrationnel. Donc H est dense. Soit $c \in [-1, 1]$, $\theta = \arccos c$ et $\varepsilon > 0$: il existe $n, k \in \mathbb{Z}$ avec $|n + 2k\pi - \theta| < \varepsilon$. Alors

$$|\cos n - c| = |\cos(n + 2k\pi) - \cos\theta| \leqslant |n + 2k\pi - \theta| < \varepsilon.$$

$$\{\cos n,\ n \in \mathbb{Z}\} \text{ est dense dans } [-1, 1].$$

Le piège

Affirmer $a \in G$ sans démonstration : une borne inférieure n'est pas toujours atteinte. C'est la structure de groupe qui force $a \in G$ quand $a > 0$.

La méthode

Sous-groupe de $\mathbb{R}$: regarder la borne inférieure de ses éléments positifs. Strictement positive : $G = a\mathbb{Z}$; nulle : G dense.

Rappels de cours utilisés

- **Borne inférieure.**

$$X \subset \mathbb{R},\ X \neq \emptyset,\ X \text{ minorée} \implies \inf X \text{ existe.}$$

$$a = \inf X \iff \begin{cases} \forall x \in X,\ a \leqslant x, \\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists x \in X,\ x < a + \varepsilon. \end{cases}$$

$$\inf\,]0, 1] = 0 \notin\,]0, 1].$$

- **Sous-groupe.**

$$G \leqslant (\mathbb{R}, +) \iff 0 \in G \ \wedge\ \forall x, y \in G,\ x - y \in G.$$

$$\implies x + y \in G, \quad kx \in G\ (k \in \mathbb{Z}).$$

  - **Exemples** : $\mathbb{Z}$, $3\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{Z} + \sqrt{2}\,\mathbb{Z}$;
  - **Contre-exemple** : $\mathbb{N}$, car $-1 \notin \mathbb{N}$.

- **Raisonnement par l'absurde.**

$$\neg P \implies \text{contradiction} \qquad \text{donc} \qquad P.$$

- **Caractériser une partie entière.**

$$\lfloor y \rfloor = m \iff m \in \mathbb{Z} \ \wedge \ m \leqslant y < m+1.$$

$$N \in \mathbb{Z},\ N \leqslant y \implies N \leqslant \lfloor y \rfloor.$$

  - $3 \leqslant \pi < 4 \Rightarrow \lfloor \pi \rfloor = 3$;
  - $\lfloor -0{,}5 \rfloor = -1$.

- **Les multiples d'un petit nombre.** $0 < \delta \leqslant \varepsilon$, $x \in \mathbb{R}$, $k = \lfloor x/\delta \rfloor$:

$$k\delta \leqslant x < (k+1)\delta \implies 0 \leqslant x - k\delta < \delta \leqslant \varepsilon.$$

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \exists k \in \mathbb{Z},\quad |x - k\delta| < \varepsilon.$$

- **Partie dense.**

$$\begin{aligned} A \text{ dense dans } I &\iff \forall x \in I,\ \forall \varepsilon > 0,\ \exists a \in A,\ |x-a| \leqslant \varepsilon \\ &\iff \forall x \in I,\ \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}},\ a_n \to x. \end{aligned}$$

$\mathbb{Q}$ dense dans $\mathbb{R}$; $\mathbb{Z}$ non : $\forall k \in \mathbb{Z}$, $|k - \frac{1}{2}| \geqslant \frac{1}{2}$.

- **Sinus et cosinus sont 1-lipschitziennes.**

$$|\sin'| = |\cos| \leqslant 1, \qquad |\cos'| = |\sin| \leqslant 1.$$

$$\forall a, b \in \mathbb{R},\quad |\sin a - \sin b| \leqslant |a-b|, \qquad |\cos a - \cos b| \leqslant |a-b|.$$