CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Le théorème de Cantor

Énoncé

Soit E un ensemble et $f : E \to \mathcal{P}(E)$.

1. On pose $D = \{x \in E : x \notin f(x)\}$. Montrer que D n'a pas d'antécédent par f.
2. En déduire qu'aucune application de E dans $\mathcal{P}(E)$ n'est surjective.
3. Illustrer avec $E = \{1, 2, 3\}$ et $f(1) = \{1, 2\}$, $f(2) = \emptyset$, $f(3) = \{1, 3\}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f(x)$ est une partie de E : on peut se demander si $x \in f(x)$.

Ce qu'on te demande. Montrer qu'il y a « plus » de parties que d'éléments.

Corrigé

1. L'argument diagonal

Le coup d'œil. D diffère de $f(x)$ au moins par l'élément x.

Supposons $D = f(a)$. $a \in D \iff a \notin f(a) \iff a \notin D$: absurde. Donc D n'est l'image d'aucun élément.

2. Pas de surjection

Le coup d'œil. $D \in \mathcal{P}(E)$ n'est pas atteint.

Aucune application $E \to \mathcal{P}(E)$ n'est surjective.

Pour E fini, c'est cohérent avec $2^n > n$; pour $E = \mathbb{N}$, $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ n'est pas dénombrable.

3. Un exemple

Le coup d'œil. On teste chaque x : est-il dans sa propre image ?

$1 \in f(1)$, $2 \notin f(2)$, $3 \in f(3)$: $D = \{2\}$, qui n'est en effet ni $\{1,2\}$, ni $\emptyset$, ni $\{1,3\}$.

Le piège

Croire que l'argument ne marche que pour E infini : il est valable pour tout ensemble, même vide ($\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$).

La méthode

Argument diagonal : construire un objet qui diffère de chaque $f(x)$ « à l'endroit x ».

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.