CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Deux fonctions qui commutent se rencontrent

Énoncé

Soit $f, g : [a,b] \to [a,b]$ continues vérifiant $f \circ g = g \circ f$. Montrer qu'il existe $x_0 \in [a,b]$ tel que $f(x_0) = g(x_0)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f et g continues de $[a,b]$ dans $[a,b]$.
- $f(g(x)) = g(f(x))$ pour tout x.

Ce qu'on te demande. Trouver un point où f et g sont égales.

Corrigé

1. Par l'absurde

Supposons que $g - f$ ne s'annule jamais. Étant continue sur l'intervalle $[a,b]$, elle garde un signe constant. Quitte à échanger f et g, on suppose $g - f > 0$.

2. Un point fixe de f

f envoie $[a,b]$ dans $[a,b]$ et est continue : elle a un point fixe x, c'est-à-dire $f(x) = x$.

3. g envoie les points fixes de f sur des points fixes de f

Si $f(x) = x$, alors $f(g(x)) = g(f(x)) = g(x)$: $g(x)$ est aussi un point fixe de f. De plus $g(x) > f(x) = x$.

4. La suite des itérés

On pose $u_0 = x$ et $u_{n+1} = g(u_n)$. Par l'étape précédente, chaque u_n est un point fixe de f et $u_{n+1} > u_n$. La suite est croissante et à valeurs dans $[a,b]$: elle converge vers $\ell \in [a,b]$.

5. La contradiction

En passant à la limite dans $f(u_n) = u_n$ et $u_{n+1} = g(u_n)$, par continuité de f et g : $f(\ell) = \ell$ et $g(\ell) = \ell$. Donc $g(\ell) - f(\ell) = 0$, ce qui contredit $g - f > 0$.

Le piège

Chercher directement x_0 : on ne sait rien construire. L'absurde donne une information de signe très utile.

La méthode

Quand $f \circ g = g \circ f$, g envoie les points fixes de f sur des points fixes de f : itérer g est souvent la clé.

Rappels de cours utilisés

- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.
- **Théorème des valeurs intermédiaires.** Si f est continue sur un intervalle I et si $a, b \in I$, alors f prend toutes les valeurs comprises entre $f(a)$ et $f(b)$. En particulier, si $f(a)$ et $f(b)$ sont de signes opposés, f s'annule entre a et b.
- **Raisonnement par récurrence.** Si $P(n_0)$ est vraie et si, pour tout $n \geq n_0$, $P(n) \Rightarrow P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.
- **Théorème de la limite monotone.** Une suite réelle croissante et majorée converge. Une suite croissante non majorée tend vers $+\infty$.
- **Limite d'une suite récurrente.** Si $u_{n+1} = f(u_n)$, si (u_n) converge vers ℓ et si f est continue en ℓ, alors $\ell = f(\ell)$.